



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.





600030820J

E. 90. 8. 4.



E. BIBL. RADCL.

~~5/15~~ ~~4/14~~ ~~8/14~~ ~~5/14~~

~~43. 11. 15.~~

C

189974 e 1/4





600030820J

B. 90. E. 4.



E. BIBL. RADCL.


~~5~~
~~4~~
~~5~~
~~4~~
43.0.15.

C

189974 e. 1/4







B e i t r ä g e
zur
Nat u r g e s c h i c h t e
von
B r a s i l i e n,
von
Maximilian, Prinzen
z u W i e d.

III. B a n d.
Z w e i t e A b t h e i l u n g.

M i t e i n e r T a f e l A b b i l d u n g e n.

W e i m a r,
im Verlage des Gr. H. S. priv. Landes-Industrie-Comptoirs.
1 8 3 1.

92-100-1000

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

6. *Chlorophyll a*

I n h a l t

zum dritten Bände der Beiträge.

	Seite
Einleitung.	3
Ord. I. Raptatores, Illig. Fam. I. Vulturidae, Leach.	55
Gen. 1. <i>Catharthes, Illig.</i>	55
1. <i>C. Papa, Illig.</i>	56
2. — <i>foetens, Illig.</i>	58
3. — <i>Aura, Illig.</i>	64
Fam. II. Falconidae, Leach.	69
Gen. 2. <i>Falco, Linn.</i>	69
1. <i>F. Haliaëtus, Linn.</i>	73
2. — <i>ornatus, Daud.</i>	78
3. — <i>Tyrannus.</i>	84
4. — <i>guianensis, Daud.</i>	90
5. — <i>hemidactylus, Temm.</i>	97
6. — <i>magnirostris, Linn.</i>	102
7. — <i>pileatus.</i>	107
8. — <i>Nisus, Linn.</i>	111
9. — <i>Sparverius, Linn.</i>	116
10. — <i>aurantius, Lath.</i>	120
11. — <i>rufifrons.</i>	123
12. — <i>plumbens, Linn.</i>	126
13. — <i>bidentatus, Lath.</i>	132
14. — <i>diodon, Temm.</i>	133
15. — <i>Yetapa.</i>	141

	Seite
16. <i>F. palliatus</i> .	148
17. — <i>nudicollis</i> , Daud.	153
18. — <i>degener</i> , Illig.	162
19. — <i>uncinatus</i> , Illig.	172
20. — <i>vitticaudus</i> .	178
21. — <i>hamatus</i> , Illig.	182
22. — <i>albifrons</i> .	187
23. — <i>brasiliensis</i> , Linn.	190
24. — <i>Urubitinga</i> , Linn.	196
25. — <i>skotopterus</i> .	204
26. — <i>striolatus</i> , Temm.	209
27. — <i>Busarellus</i> , Daud.	213
28. — <i>rutilans</i> , Licht.	218
29. — <i>palustris</i> .	224
Fam. III. <i>Strigidae</i> Leach.	231
Gen. 3. <i>Strix</i> , Linn.	231
1. <i>S. ferruginea</i> .	234
2. — <i>passerinoides</i> , Temm.	239
3. — <i>minutissima</i> .	242
4. — <i>curricularia</i> , Linn., Gmel.	248
5. — <i>perlata</i> , Licht.	253
6. — <i>pulsatrix</i> .	258
7. — <i>Nacurutu</i> , Vieill.	274
8. — <i>maculata</i> .	281
9. — <i>brasiliensis</i> , Linn., Gmel.	286
Ord. II. <i>Insessores</i> , Vig.	290
Sect. 1. <i>Hiantes</i> , Illig. — Fam. IV. <i>Caprimulgidae</i> , Vig.	292
Gen. 4. <i>Caprimulgus</i> , Linn.	293
1. <i>C. grandis</i> , Linn.	295
2. — <i>aethereus</i> .	303
3. — <i>leucopterus</i> .	311
4. — <i>guianensis</i> , Linn.	318
5. — <i>diurnus</i> .	326
6. — <i>semitorquatus</i> , Linn.	330
7. — <i>brasilianus</i> , Linn.	337
Fam. V. <i>Hirundinidae</i> , Vig.	341
Gen. 5. <i>Cypselus</i> , Illig.	342
1. <i>C. collaris</i> , Temm.	344
?2. — <i>pelasgius</i> .	347
?3. — <i>acutus</i> .	351

Inhalt.

	Seite
Gen. 6. <i>Hirundo</i> , Linn.	353
1. <i>H. chalybea</i> , Linn.	354
2. — <i>pascuum</i> .	360
3. — <i>leucoptera</i> , Linn.	362
4. — <i>iugularis</i> .	365
5. — <i>minuta</i> .	369
6. — <i>melanoleuca</i> .	371
Sect. 2. <i>Sericati</i> , Illig. — Fam. VI. <i>Pipridae</i> , Vig.	375
Gen. 7. <i>Casmarynchos</i> , Temm.	376
1. <i>C. nudicollis</i> , Temm.	377
Gen. 8. <i>Procnias</i> , Hoffm.	385
1. <i>P. ventralis</i> , Illig.	385
Gen. 9. <i>Ampelis</i> , Linn.	390
1. <i>A. Cotinga</i> , Linn.	391
2. — <i>purpurea</i> , Licht.	397
3. — <i>melanocéphala</i>	401
Gen. 10. <i>Coracina</i> , Vieill.	405
1. <i>C. scutata</i> , Temm.	406
Gen. 11. <i>Pipra</i> , Linn.	412
1. <i>P. longicauda</i> , Vieill.	413
2. — <i>pareta</i> , Linn.	418
3. — <i>erythrocephala</i> , Linn.	422
4. — <i>leucocapilla</i> , Linn.	427
5. — <i>strigilata</i> .	430
6. — <i>Mamacus</i> , Linn.	432
Sect. 3. <i>Passerini</i> , Illig. — Fam. VII. <i>Tangaridae</i> , Boi.	438
Gen. 12. <i>Euphonia</i> , Licht.	439
1. <i>E. violacea</i> , Licht.	439
2. — <i>musica</i> .	443
3. — <i>rufiventris</i> .	447
Gen. 13. <i>Tanagra</i> , Linn.	450
1. <i>T. cyanomelas</i> .	453
2. — <i>rubricollis</i> , Temm.	456
3. — <i>Tatao</i> , Linn.	459
4. — <i>citrinella</i> , Temm.	464
5. — <i>flava</i> , Linn.	467
6. — <i>Gyrolo</i> , Linn.	471
7. — <i>cristata</i> , Linn.	474
8. — <i>brasiliensis</i> , Linn.	477
9. — <i>Archiepiscopus</i> , Desm.	481

	Seite
10. <i>Tanagra Sayaca</i> , Linn.	484
11. — <i>palmarum</i> .	489
12. — <i>fasciata</i> , Licht.	493
13. — <i>flammiceps</i> .	497
14. — <i>capistrata</i> .	500
15. — <i>melanopsis</i> , Lath.	504
16. — <i>silens</i> , Lath.	507
17. — <i>brasilia</i> , Linn.	511
18. — <i>superciliaris</i> .	518
19. — <i>mississippiensis</i> , Linn.	521
20. — <i>magna</i> , Linn.	525
21. — <i>bonariensis</i> , Linn.	530
22. — <i>nigerrima</i> , Linn.	534
23. — <i>auricapilla</i> .	538
24. — <i>caerulescens</i> .	541
Gen. 14. <i>Bethylus</i> , Cuv.	544
1. <i>B. picatus</i> .	545
Fam. VIII. <i>Fringillidae</i> , Boie.	549
Gen. 15. <i>Fringilla</i> , Linn.	549
1. <i>F. Gnatho</i> , Licht.	552
2. — <i>viridis</i> .	555
3. — <i>jugularis</i> .	558
4. — <i>Brissonii</i> , Licht.	561
5. — <i>crassirostris</i> .	564
6. — <i>torrida</i> .	567
7. — <i>atricapilla</i> .	569
8. — <i>leucopogon</i> .	572
9. — <i>lineola</i> .	574
10. — <i>melanocephala</i> .	577
11. — <i>plumbea</i> .	579
12. — <i>rufirostris</i> .	581
13. — <i>falcirostris</i> .	584
14. — <i>pyrrhomelas</i> .	586
15. — <i>minuta</i> .	591
16. — <i>dominicana</i> .	594
17. — <i>splendens</i> , Vieill.	597
18. — <i>Manimbe</i> , Licht.	600
19. — <i>pileata</i> .	605
20. — <i>ornata</i> .	610
21. — <i>brasiliensis</i> .	614
22. — <i>magellanica</i> , Linn.	620

	Seite
23. <i>Fringilla matutina</i> , Licht.	623
24. — <i>fuliginosa</i> .	623
Fam. IX. <i>Alaudidae</i>, Boi.	631
Gen. 16. <i>Anthus</i> , Bechst.	631
1. <i>A. Chii</i> , Licht.	631
2. — <i>poecilopterus</i> .	633
Sect. 4. <i>Canori</i>, Illig. — Fam. X. <i>Merulidae</i>, Vig.	637
Gen. 17. <i>Turdus</i> , Linn.	637
1. <i>T. rufiventris</i> , Illig.	639
2. — <i>carbonarius</i> , —	643
3. — <i>crotopezus</i> , —	646
4. — <i>ferrugineus</i> .	649
Gen. 18. <i>Mimus</i> , Briss.	652
1. <i>M. lividus</i> .	653
2. — <i>saturninus</i> .	658
3. — <i>brasilensis</i> .	662
Gen. 19. <i>Opetiorynchus</i> , Temm.	665
1. <i>O. rufus</i> .	667
2. — <i>ruficaudus</i> .	671
3. — <i>turdinus</i> .	673
4. — <i>rectirostris</i> .	679
Fam. XI. <i>Sylviidae</i>, Vig.	682
Gen. 20. <i>Synallaxis</i> , Vieill.	683
1. <i>S. cinereus</i> .	685
2. — <i>pallidus</i> .	690
3. — <i>caudacutus</i> .	692
4. — <i>torquatus</i> .	697
Gen. 21. <i>Sylvia</i> , Lath.	700
1. <i>S. canicapilla</i> .	701
2. — <i>venusta</i> , Temm.	705
3. — <i>speciosa</i> .	708
4. — <i>leucogastra</i> ,	710
5. — <i>caerulescens</i> .	713
6. — <i>poicilotis</i> .	715
7. — <i>thoracica</i> .	717
8. — <i>flaveola</i> .	719
Gen. 22. <i>Hylophilus</i> , Temm.	721
1. <i>H. cinerascens</i> .	723
2. — <i>ruficeps</i> .	725
3. — <i>Guira</i> .	729

	Seite
4. <i>Hyloph. caeruleus</i> .	731
5. — <i>cyanoleucus</i> .	734
6. — <i>melanoxanthus</i> .	736
Gen. 23. <i>Thryothorus</i> , Vieill.	739
1. <i>T. platensis</i> .	742
2. — <i>striolatus</i> .	743
3. — <i>Gladiator</i> .	751
4. — <i>Coraya</i> , Vieill.	754
Gen. 24. <i>Coereba</i> , Briss.	758
1. <i>C. cyanea</i> , Vieill.	761
2. — <i>caerulea</i> , —	766
3. — <i>Spiza</i> .	771
4. — <i>flaveola</i> .	774
Sect. 5. <i>Dentirostres</i> , Illig. — Fam. XII. <i>Muscicapidae</i> , Vig.	778
Gen. 25. <i>Entomophagus</i> .	781
1. <i>E. mystaceus</i> .	782
Gen. 26. <i>Muscicapa</i> , Linn.	783
1. <i>M. rivularis</i> .	789
2. — <i>chrysochloris</i> .	793
3. — <i>agilis</i> .	795
4. — <i>brevirostris</i> .	799
5. — <i>virescens</i> .	802
6. — <i>plumbea</i> .	806
7. — <i>sibilatrix</i> .	810
8. — <i>squamata</i> .	814
9. — <i>turdina</i> .	817
10. — <i>comata</i> , Licht.	819
11. — <i>leucocephala</i> .	822
12. — <i>caesia</i> .	826
13. — <i>aurifrons</i> .	829
14. — <i>brevipes</i> .	831
15. — <i>Tyrannus</i> , Linn.	834
16. — <i>Pitangua</i> , Licht.	838
17. — <i>cayennensis</i> Linn.	846
18. — <i>Miles</i> , Licht.	850
19. — <i>cinerea</i> , Linn.	853
20. — <i>ferox</i> , Linn.	855
21. — <i>velata</i> , Licht.	859
22. — <i>polyglotta</i> , Licht.	862
23. — <i>rustica</i> , Licht.	866

Inhalt.

ix

	Seite
24. <i>Musc. uropygiata</i> .	868
25. — <i>trivirgata</i> .	871
<i>Anhang zum Geschlecht Muscicapa.</i>	874
1. <i>M. Alektor</i> .	874
2. — <i>psalura</i> , Temm.	877
3. — <i>coronata</i> , Linn.	880
Gen. 27. <i>Tyrannus</i> , Briss.	885
1. <i>T. furcatus</i>	884
2. — <i>audax</i> , Vieill.	889
Gen. 28. <i>Muscipeta</i> , Vieill.	893
1. <i>M. Asilus</i> .	894
2. — <i>incarnescens</i> .	898
3. — <i>strigilata</i> ,	900
4. — <i>fuscata</i> .	902
5. — <i>splendens</i> .	906
6. — <i>marginata</i> .	909
7. — <i>aurantia</i> .	911
8. — <i>nigriceps</i> .	914
9. — <i>oitrina</i> .	917
10. — <i>ruficauda</i> .	920
11. — <i>modesta</i> .	923
12. — <i>Monacha</i> .	925
13. — <i>flaviventris</i> .	929
14. — <i>platyryncha</i> .	932
15. — <i>barbata</i> .	934
16. — <i>chrysoceps</i> .	940
<i>Unbestimmte Arten.</i>	944
1. <i>M. regia</i> .	944
Gen. 29. <i>Euscarthmus</i> .	945
1. <i>E. meloryphus</i> .	947
2. — <i>nidipendulus</i> .	950
3. — <i>superciliaris</i> .	953
4. — <i>cinereicollis</i> .	955
5. — <i>orbitatus</i> .	958
Gen. 30. <i>Todus</i> , Linn.	961
1. <i>T. melanocephalus</i> , Spix.	962
2. — <i>poliocephalus</i> .	964
Gen. 31. <i>Platyrynchos</i> , Desm.	967
1. <i>P. olivaceus</i> , Temm.	969
2. — <i>nuchalis</i> .	971
3. — <i>leucoryphus</i> .	974

	Seite
4. <i>Platyr. rupestris.</i>	977
Fam. XIII. <i>Laniadae, Vig.</i>	981
Gen. 33. <i>Scaphorynchus.</i>	982
1. <i>S. sulphuratus.</i>	983
Gen. 32. <i>Thamnophilus, Vieill.</i>	988
1. <i>T. stagurus.</i>	990
2. — <i>doliatus.</i>	995
3. — <i>scalaris.</i>	999
4. — <i>tristatus.</i>	1002
5. — <i>nigricans.</i>	1006
6. — <i>palliat.</i>	1010
7. — <i>strictothorax.</i>	1013
8. — <i>guianensis.</i>	1016
9. — <i>guttatus, Spix.</i>	1019
Fam. XIV. <i>Myiotheridae, Boi.</i>	1024
Gen. 34. <i>Myioturdus, Boi.</i>	1025
1. <i>M. Rex.</i>	1027
2. — <i>ochroleucus.</i>	1032
3. — <i>marginatus.</i>	1035
4. — <i>Tetema.</i>	1038
5. — <i>perspicillatus.</i>	1042
Gen. 35. <i>Myiagrus, Boi.</i>	1045
1. <i>M. lineatus.</i>	1046
Gen. 36. <i>Myiothera, Illig.</i>	1049
1. <i>M. rhynolopha.</i>	1051
2. — <i>ardesiaca, Licht.</i>	1055
3. — <i>Domicella.</i>	1058
4. — <i>ruficauda.</i>	1060
5. — <i>strigilata.</i>	1064
6. — <i>fuliginosa, Illig.</i>	1067
7. — <i>squamata, Licht.</i>	1070
8. — <i>superciliaris, Licht.</i>	1072
9. — <i>leucophrys, Licht.</i>	1075
10. — <i>pileata, Licht.</i>	1078
11. — <i>plumbea.</i>	1080
12. — <i>scapularis, Licht.</i>	1083
13. — <i>variegata, Licht.</i>	1086
14. — <i>maculata.</i>	1088
15. — <i>indigotica, Licht.</i>	1091
16. — <i>cinerea.</i>	1093

	Seite
17. <i>Myioth. rufa.</i>	1095
18. — <i>poliocephala</i>	1098
19. — <i>calcarata.</i>	1101
Sect. 6. <i>Scandentes.</i> — Fam. XV. <i>Certhiadae, Vig.</i>	1103
Gen. 37. <i>Tinactor.</i>	1104
1. <i>T. fuscus.</i>	1106
Gen. 38. <i>Dryocopus.</i>	1111
1. <i>D. turdinus.</i>	1112
Gen. 39. <i>Dendrocolaptes, Herrm.</i>	1116
1. <i>D. guttatus, Licht.</i>	1120
? 2. — <i>obsoletus.</i>	1125
3. — <i>tenuirostris, Licht.</i>	1127
4. — <i>rafus.</i>	1130
5. — <i>Picus, Herrm.</i>	1134
Gen. 40. <i>Xiphorynchus, Swains.</i>	1139
1. <i>X. trochilirostris.</i>	1140
Gen. 41. <i>Sittasomus, Swains.</i>	1145
1. <i>S. olivaceus.</i>	1146
Gen. 42. <i>Glyphorynchus.</i>	1149
1. <i>G. ruficaudus.</i>	1150
Gen. 43. <i>Xenops Illig.</i>	1153
1. <i>X. genibarbis.</i>	1155
? 2. — <i>rutilans.</i>	1159
Fam. XVI. <i>Anabatidae.</i>	1162
Gen. 44. <i>Anabates, Temm.</i>	1163
1. <i>A. ferruginolentus.</i>	1168
2. — <i>leucophthalmus.</i>	1172
3. — <i>erythrophthalmus.</i>	1177
4. — <i>striolatus Temm.</i>	1182
5. — <i>atricapillus.</i>	1187
6. — <i>rufifrons.</i>	1191
Sect. 7. <i>Gregarii, Illig.</i> — Fam. XVII. <i>Oriolidae, Boi.</i>	1197
Gen. 45. <i>Icterus, Briss.</i>	1198
1. <i>I. Jamacaii, Daud.</i>	1199
2. — <i>cayanensis, Daud.</i>	1204
3. — <i>unicolor, Licht.</i>	1208
? 4. — <i>violaceus.</i>	1212
5. — <i>atro-olivaceus.</i>	1216
Unbestimmte Arten.	1218
Gen. 46. <i>Cassicus, Vieill.</i>	1219

	Seite
1. <i>C. cristatus</i> , Licht.	1220
2. — <i>haemorrhous</i> , Licht.	1230
3. — <i>persicus</i> , Licht.	1234
4. — <i>niger</i> , Licht.	1241
Unbestimmte Arten.	1245
? <i>Cassicus leucurus</i> .	1245
Fam. XVIII. <i>Corvidae</i> , Leach.	1246
Gen. 47. <i>Corvus</i> , Linn.	1246
1. <i>C. cyanopogon</i> .	1247
2. — <i>cristatellus</i> , Temm.	1251
Seet. 8. <i>Serrati</i> . — Fam. XIX. <i>Momotidae</i> .	1256
Gen. 48. <i>Prionites</i> , Illig.	1257
1. <i>P. ruficapillus</i> , Illig.	1257
Nachträge und Berichtigungen.	1263
1. 11	
2. 11	
3. 11	
4. 11	
5. 11	
6. 11	
7. 11	
8. 11	
9. 11	
10. 11	
11. 11	
12. 11	
13. 11	
14. 11	
15. 11	
16. 11	
17. 11	
18. 11	
19. 11	
20. 11	
21. 11	
22. 11	
23. 11	
24. 11	
25. 11	
26. 11	
27. 11	
28. 11	
29. 11	
30. 11	
31. 11	
32. 11	
33. 11	
34. 11	
35. 11	
36. 11	
37. 11	
38. 11	
39. 11	
40. 11	
41. 11	
42. 11	
43. 11	
44. 11	
45. 11	
46. 11	
47. 11	
48. 11	
49. 11	
50. 11	
51. 11	
52. 11	
53. 11	
54. 11	
55. 11	
56. 11	
57. 11	
58. 11	
59. 11	
60. 11	
61. 11	
62. 11	
63. 11	
64. 11	
65. 11	
66. 11	
67. 11	
68. 11	
69. 11	
70. 11	
71. 11	
72. 11	
73. 11	
74. 11	
75. 11	
76. 11	
77. 11	
78. 11	
79. 11	
80. 11	
81. 11	
82. 11	
83. 11	
84. 11	
85. 11	
86. 11	
87. 11	
88. 11	
89. 11	
90. 11	
91. 11	
92. 11	
93. 11	
94. 11	
95. 11	
96. 11	
97. 11	
98. 11	
99. 11	
100. 11	

Druckfehler

zu der

1sten Abtheilung des 5ten Bandes der Beiträge.

-
- S. 41. Z. 15. lies statt „*Labiah*“ — „*Sabiah*“.
 — 41. Z. 17. — — „*Pintasilva*“ — „*Pintasilvo*“.
 — 54. Z. 6. — — „*Boin*“ — „*Boie*“.
 — 82. Z. 13. hier ist das Zeichen *) angebracht, die Note selbst aber unten vergessen. Hierin sollte gesagt werden, daß die Schwungfedern des Vogels noch nicht ausgewachsen waren, die Breite also zu gering angegeben ist.
 — 89. — 4. streiche das , hinter dem Worte „*dafs*.“
 — 116. — 14. — — — — „*d'Azara*“, und setze es hinter das Wort „*Cresserelle*“.
 — 131. — 7. lies statt „*Tab. VIII. 6*“ — „*Tab. VIII. b*“.
 — 141. — 8. von unten, lies statt „*à queue en oiseaux*“ — „*à queue en ciseaux*“.
 — 191. — 8. von unten, streiche das , hinter dem Worte „*sechseckiger*“.
 — 203. — 2. von unten, fehlt der . hinter dem Worte „*sind*“.
 — 204. — 19. — — setze statt „(*Tab. I. 6*)“ — „(*Tab. I. b*)“
 — 254. — 4. von unten, setze statt „*Fersen und Firste*“ — „*Fersen und Füfse*“.
 — 294. — 11. von unten, setze statt „*Noctibo*“ — „*Noitibo*“.
 — 295. — 8. — — — — „*magnitudinae*“ — „*magnitudine*“.
 — 371. — 4. von unten, setze statt „*leuca*“ — „*leuca*“.
 — 390. — 2. streiche das ; — und setze dafür em ,
 — 390. — 11. — — , hinter dem Worte „*Geschlechtes*“.
 — 449. — 3. setze statt „*violettnem*“ — „*violettem*“.
 — 454. — 8. — — „*tirnrand*“ — „*Stirnrand*“.
 — 493. — 11. — — „*den Rücken*“ — „*dem Rücken*“.
 — 497. — 10. — — „*Tanagra, Temm*“ — „*Tangara Ori- flamme, Temm*“.
 — 530. — 5. lies statt „*Milloi*“ — „*Vieillot*“.
 — 547. — 1. — — „*Tafel*“ — „*Tafeln*“.
 — 547. — 2. setze hinter das Wort „*ist*“ ein ;
 — 574. — 7. von unten, lies statt „*obern*“ — „*obere*“.
 — 587. — 3. lies statt „*Bourreuil*“ — „*Bouvreuril*“ — und statt „*noiroux*“ — „*noiroux*“.
 — 591. — 2. lies statt „*purrho*“ — „*pyrrho*“.
-

Druckfehler

der

2ten Abtheilung des 3ten Bandes der Beiträge.

- S. 639. Z. 4. setze statt „*weislich graubraun*“ — „*weislich, graubraun*“.
- 639. — 8 und 9. streiche die Zeichen * vor den Wörtern „*Sabiah*“ und „*La gride*“.
- 650. erste Zeile, setze statt „*hornartig*“ — „*hornartig*“.
- 657. Z. 3. setze statt „*Lophora*“ — „*Sophora*“.
- 658. — 11. streiche das , hinter dem Worte „*Hauptzügen*“.
- 667. — 2. setze statt „*einer Zahnes*“ — „*eines Zahnes*“.
- 668. erste Zeile, streiche das , hinter dem Worte „*d'Azara*“ und setze es hinter das Wort „*Fournier*“.
- 729. Z. 10. setze statt „*Guira-gacu*“ — „*Guira-guacu*“.
- 746. — 6. streiche das , hinter dem Worte „*getüpfelte*“.
- 747. — 7. von unten, setze statt „*überlaufen*“ — „*überlaufen*“.
- 748. — 10. — — — „*Louisiana*“ — „*Louisiane*“.
- 753. — 2. — — — „*Myothera*“ — „*Myioth. ra*“.
- 754. — 6 und 9. derselbe Fehler.
- 761. — 17. setze statt „*Galerie d'ois*“ — „*Galerie des. ois*“.
- 766. — 13 und 14. streiche das , hinter den Wörtern „*eine*“ und „*gerathene*“.
- 806. Man verbinde die Zeilen 11 und 12. mit e'inander.
- 834. Z. 7. von unten, setze statt „*le petits*“ — „*les petits*“.
- 838. — 4. streiche das , hinter dem Worte „*Tyrannus*“.
- 843. — 14. — — — „*sulphuratus*“.
- 843. — 18. setze statt „*wenn gleich*“ — „*während*“.
- 883. In der Note streiche das , hinter „*Lesson*“.
- 962. Z. 9. setze statt „*zugerandeten*“ — „*zugerundeten*“.
- 992. — 8. streiche das , hinter „*Vorder*“ und setze dafür einen —
- 1012. — 2. streiche das Wort „*dern*“.
- 1207. — 13. lies statt „*Itapemirin*“ — „*Itapemirim*“.
- 1207. — 2. von unten, streiche das , hinter dem Worte „*so*“.
- 1213. — 12. streiche das , hinter dem Worte „*Vorderzehen*“.
- 1226. — 7. setze statt „*velho*“ — „*velha*“.
- 1263. — 13. lies statt „*Agate*“ — „*Agama*“.
- 1263. — 4. und 7. von unten, setze statt „*Fetus*“ — „*Tetus*“.
- 1264. — 4. streiche das , hinter dem Worte „*passende*“.
- 1267. — 9. von unten, setze statt „*Gilo*“ — „*Gigo*“.

Sect. 4. C a n o r i.

S ä n g e r.

Fam. X. Merulidae, Vigors.

Drosselartige Vögel.

Die Vögel dieser Familie sind meistens durch ihren abwechselnden flötenden Gesang bekannt, einige haben auch nur laute sonderbare Stimmen. In der Gestalt des Schnabels und des Körpers haben sie große Aehnlichkeit mit unsern Drosseln (*Turdus*). —

Gen. 17. T u r d u s, Linn.

D r o s s e l.

Das Geschlecht der Drosseln ist in allen Theilen unserer Erde sehr weit verbreitet, es bewohnt alle Zonen und Climate. Ueberall tragen diese angenehmen Sänger vorzüglich viel zur Belebung der Gebüsche und Wälder durch

ihren lauten, vollen, flötenden Gesang bei, und in allen Welttheilen haben sie etwa gleiche Lebensart und Eigenheiten. Das wiedererwachende Frühjahr kündigt in der arctischen Zone, in lichten Birkenwäldern, *Turdus iliacus* durch seinen Gesang an; im mittlern Europa die Amsel (*Turdus merula*), die Singdrossel (*Turdus musicus*) u. a., in unsern noch unbelaubten Buchenwäldern, wo sie schon im Februar und März von der Spitze eines Baumes oder Strauches in der angenehmen Abendluft ihre abwechselnden Töne hören lassen; und in Brasilien singt *Turdus rufiventris* im dunkeln Schatten der Cocos- und anderer hoher Bäume auf eine ähnliche Art oft während des ganzen Jahres. Das Gefieder der Drosseln ist meist einfach gefärbt, sie bewohnen die Wälder, nähren sich von Insecten, kleinen Gewürmen, Beeren und andern Baumfrüchten, erbauen ein großes halbkugelförmiges Nest, welches sie an der innern Fläche zum Theil mit Letten auskleiden, und haben ein schmackhaftes Fleisch. Auch Brasilien besitzt aus diesem Geschlechte seine besten Sänger, welche zahlreich an Individuen die Zierde der dortigen Gebüsche ausmachen.

1. *T. rufiventris*, Illig.

Die rostbäuchige Drossel.

Die Obertheile graulich - olivenbraun; Kehle weißlich graubraun gestreift; Brust graugelb; Bauch und Steiße rostroth.

Turdus rufiventris, Vieill.

— *rufiventris*, Spix Av. Tom. I. Tab. 68.

* *Sabia* im östlichen Brasilien.

* *La grive rousse et noirâtre d'Azara Voy. Vol. III pag. 208.*

Meine Reise nach Bras. B. I. pag. 63, 278.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt unserer Drosseln, Größe einer Amsel, Schnabel stark; Dillenkante ziemlich aufsteigend; Kinnwinkel etwa ein Dritttheil der Länge des Unterkiefers, mit kurzen, borstig endenden Federchen besetzt; über dem ziemlich kleinen, etwas von den Federchen bedeckten Nasenloche stehen Borsten, so wie über dem Mundwinkel, die letzteren sind zum Theil vier Linien lang; das Auge ist lebhaft und groß; die Flügel reichen kaum bis zum ersten Dritttheile des Schwanzes, die dritte und vierte Schwungfeder sind die längsten; Schwanz stark und nur höchst sanft abgerundet, in der Ruhe in der Mitte etwas ausgerandet; Beine stark, die Ferse sehr glatt getäfelt, mit fünf bis sechs dermaußen verwachsenen Tafeln belegt, dala

man öfters ihre Gränzen nicht erkennen kann, und alsdann also der Lauf gestiefelt ist; Zehenrücken getäfelt. —

Färbung: Schnabel oben über dunkelbraun, Unterkiefer und Oberkieferrand orangefarben; Iris graubraun; Beine fleischbraun; alle Obertheile des Vogels haben eine fahl olivengraubraune Farbe, an Schwanz und Flügeln am dunkelsten; innere Fahne der Schwung- und Schwanzfedern dunkelgraubraun; Kehle weißlich mit graubraunen Längsstrichen; Brust fahl gelblich - olivengrau; Unterbrust, Bauch, Seiten, After und Steils lebhaft rostroth, die untern Schwanzdeckfedern ein wenig blässer.

Ausmessung: Länge 11" — Breite 13" 3"
— L. d. Schn. 8" — Höhe d. Schn. $2\frac{6}{7}$ " —
Breite d. Schn. $2\frac{2}{5}$ " — L. d. Flügels 4" $4\frac{2}{3}$ "
— L. d. Schwanzes etwa 4" — Höhe d. Ferse
1" 2" — L. d. Mittelzehe 9" — L. d. äußeren
Z. $5\frac{1}{4}$ " — L. d. inneren Z. $5\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinterzehe $4\frac{1}{6}$ " — L. d. Mittelnagels 3" — L. d. äußeren N. 2" — L. d. inneren N. $2\frac{1}{4}$ " — L. d. Hinternagels $3\frac{1}{2}$ ". —

Weibchen: In allen Farben blässer als das Männchen, übrigens nicht verschieden. Die Kehle ist mehr rein weiß, und weniger ge-

strichelt, der Unterleib blässer rostroth, auch die Obertheile blässer.

Junger Vogel: Alle Farben sind verleschen und weniger rein, Kehle gänzlich weißlich, der Unterleib hellrostgelb, und bei eben aus dem Neste kommenden Vögeln bemerkt man wenig rostgelbe Federn am Unterleibe.

Dieser angenehme Sänger bewohnt, gleich unsern Drosseln, alle brasilianischen, von mir besuchten Wälder, und kommt auch in weniger aneinanderhängenden Gebüsch vor. Sein Gesang ist laut, vollstimmig, flötend und von angenehmer Abwechslung, jedoch vielleicht weniger verschiedenartig modulirt, als der unserer europäischen Singdrossel (*Turdus musicus*). Auf der Spitze eines Waldbaumes oder im Schattendunkel verflochtener Waldzweige sitzend, ist er eine der größten Zierden jener majestätischen Wälder, und in den Cocoshainen oder Cocospflanzungen habe ich ihn häufig im Schatten jener hohen, im Winde wogenden, erhabenen Gewächse unmittelbar bei den Wohnungen der Menschen, besonders Abends und Morgens in der Kühlung seinen Gesang anstimmen gehört, welches uns eine angenehme Unterhaltung verschaffte. Durch seinen neubelebten Gesang verkündet er in der

Paarzeit das übrigens kaum zu unterscheidende Frühjahr. Die Lockstimme dieser Drossel gleicht der des Haushuhnes, glock! glock! glock! glock! In der Abendkühlung beobachtet man unseren Vogel gewöhnlich auf der Spitze eines Baums oder Strauchs, und auch in dieser Hinsicht gleicht er vollkommen seinen Geschlechtsverwandten in Europa. Seine Nahrung besteht, wie bei diesen, in Insecten, Würmern und Beeren oder Früchten, die ersteren sucht er auch häufig, wie unsere Amseln und Drosseln, auf dem Boden im Schatten der Gebüsche, und zwischen dem trockenen Laube, wo er eben so geschickt umherläuft. Das Nest dieser Drossel gleicht vollkommen dem des *Turdus musicus*. Es steht in der Gabel eines Astes, oft am Stamme angelehnt, ist geräumig, halbkugelförmig, innerlich mit Letten ausgekleidet, und man findet darin zwei schön blaugrüne, zuweilen schwärzlich punctirte Eier. Die jungen Vögel nimmt man aus und erzieht sie, wo sie alsdann, gleich unsern Singdrosseln, recht angenehm singen. Kann man diese Vögel in hinlänglicher Anzahl fangen oder erlegen, so ist ihr Fleisch eine angenehme Speise. In den von mir bereis'ten Gegenden nennt man diese,

so wie alle Drosselarten, *Sabiahi*. Spix sagt, man nenne ihn bei Rio de Janeiro *Sabiahi da Praya*, allein dies ist ein Irrthum; denn der *Sabiahi da Praya* wird später beschrieben werden. Die Spix'sche Abbildung stellt Unterhals und Brust gestrichelt vor, welches mir nie vorgekommen ist, indem an meinen Exemplaren bloß die Kehle eine solche Zeichnung hat. Azara endlich scheint in seiner rothbraun und schwärzlichen Drossel von unserem Vogel zu reden, er giebt aber die Farben einiger Theile nicht richtig an.

Turdus carbonarius, Illig.

Die Drossel mit schwarzen Extremitäten.

D. Kopf, Hals, Brust, Flügel und Schwanz schwarz; Rücken und Bauch aschgrau; Schnabel, Beine und Augenlid hoch-orangengelb.

Turdus flavipes, Spix Av. T. I. Tab. 67. Fig. 2.

Visillot.

Sabiahi im östlichen Brasilien.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Größe von *Turdus musicus*. Schnabel kurz, dick, stark gewölbt; Dillenkaute vor der Spitze stark aufsteigend; Kinnwinkel etwa halb so lang, als der Unterkiefer, an seiner Spitzen-

hülfe beinahe nackt, und nur, so wie der Mundwinkel, von der Nase am Zügel hin mit feinen schwarzen Bartborsten besetzt, welche etwa zwei und eine halbe Linie lang sind; Nasenloch eiförmig geöffnet, die Nasenfedern treten bis zu demselben vor; Zunge an der Spitze mit einem sehr kleinen Ausschnitte versehen; Auge lebhaft, mäfsig groß; Rand der Augenlider nackt; Flügel stark und zugespitzt, erreichen beinahe die Mitte des Schwanzes, die zweite, dritte und vierte Schwungfeder sind die längsten und einander ziemlich gleich; Schwanz stark, gebildet wie an unsern Drosseln; Ferse ziemlich hoch, glatt gestiefelt, nur an ihrem unteren Theile bemerkt man die Gränze von ein Paar Tafeln, gerade wie an No. 1.; Laufsohle gestiefelt; Zehenrücken gestäfelt; Hinternagel ein wenig bogig gekrümmt.

Färbung: Iris granbraun; Schnabel, Beine, Rand der Augenlider, so wie der Rachen lebhaft orangengelb; Kopf, Hals, Brust, Flügel und Schwanz kohlschwarz; Ober- und Unterrücken, so wie die übrigen Untertheile sind aschgrau, am Bauche blässer als auf dem Rücken; Steihsfedern grau mit etwas weißlichen Spitzen.

Ausmessung: Länge 7" 11'" — Breite 12"

6''' — Länge d. Schnabels $6\frac{1}{2}$ ''' — Höhe d. Schn. $2\frac{1}{2}$ ''' — Br. d. Schn. $2\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Flügels 4'' 3''' — L. d. Schwanzes etwa 3'' — Höhe d. Ferse 11''' — L. d. Mittelzehe 8''' — L. d. äußeren Z. $5\frac{1}{4}$ ''' — L. d. inneren Z. 5''' — L. d. Hinterzehe 4''' — L. d. Mittelnagels 3''' — L. d. äußeren N. $2\frac{1}{2}$ ''' — L. d. inneren N. 2''' — L. d. Hinternagels $3\frac{1}{4}$ ''' —

Weibchen: Schnabel dunkelbraun; Beine fleischbraun; alle Obertheile dunkel-olivengrün, die unteren heller gelblich-olivengrün.

Junges Männchen: Zu Anfange wahrscheinlich gefärbt wie das Weibchen; nachher hat es das vollkommene Gefieder, aber die Spitzen der großen Flügeldeckfedern sind zum Theil rothbraun gerandet.

Diese Drossel scheint über den größten Theil von Brasilien verbreitet, sie kommt südlich bei *Rio de Janeiro* und *Cabo Frio* vor. Sie hat die Lebensart der übrigen Geschlechtsverwandten, und auch einen ziemlich guten Gesang.

Dr. v. Spix bildet das Männchen auf seiner 67sten Tafel Fig. 2. ab, allein in allen Farben zu blaß, besonders ist dies bei den gelbgefärbten Theilen der Fall. Der Name *Sabia*h-

Und, welchen v. Spix als bei uns gebräuchlich angiebt, ist mir nie vorgekommen.

3. *T. crotopezus*, Müg.

Die Drossel mit gefleckter Kehle.

D. Obertheile olivenbraun, Kopf dunkler; Schwanz aschgrau überlaufen; Kehle und Unterhals weiß, die erstere schwarzbraun gefleckt; Brust bräunlich-olivengrau; Seiten olivenbraun; Bauch weiß.

La grive blanche et noyâtée d'Asara, Vol. III. p. 210.

? *Turdus albicollis*, Vieill.

Turdus albiventer, Spix Av. T. I. pag. 70. Tab. 69.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Größe und Gestalt etwa von No. 1.; Schnabel mittelmäßig stark, hoch, sehr zusammengedrückt, die Tomienränder stark eingezogen; Kinnwinkel beinahe halb so lang als der Schnabel, mäßig zugespitzt, kurz befiedert; Bartborsten am Mundwinkel schwach; Rand des Augenlides nackt; Flügel mäßig lang, erreichen beinahe die Hälfte des Schwanzes, die dritte und vierte Feder sind die längsten; Schwanz, wie bei den übrigen Arten, nur sehr wenig abgestuft und in der Mitte ausgerandet; Tafeln der Ferse an ihren zwei Dritttheilen zu einem glatten Stiefel, d. h. in eine große Platte ver-

6''' — Länge d. Schnabels $6\frac{1}{2}$ ''' — Höhe d. Schn. $2\frac{1}{2}$ ''' — Br. d. Schn. $2\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Flügels 4'' 3''' — L. d. Schwanzes etwa 3'' — Höhe d. Ferse 11''' — L. d. Mittelzehe 8''' — L. d. äußeren Z. $5\frac{1}{4}$ ''' — L. d. inneren Z. 5''' — L. d. Hinterzehe 4''' — L. d. Mittelnagels 3''' — L. d. äußeren N. $2\frac{1}{2}$ ''' — L. d. inneren N. 2''' — L. d. Hinternagels $3\frac{1}{2}$ ''' —

Weibchen: Schnabel dunkelbraun; Beine fleischbraun; alle Obertheile dunkel-olivengrün, die unteren heller gelblich-olivengrün.

Junges Männchen: Zu Anfange wahrscheinlich gefärbt wie das Weibchen; nachher hat es das vollkommene Gefieder, aber die Spitzen der großen Flügeldeckfedern sind zum Theil rothbraun gerandet.

Diese Drossel scheint über den größten Theil von Brasilien verbreitet, sie kommt südlich bei *Rio de Janeiro* und *Cabo Frio* vor. Sie hat die Lebensart der übrigen Geschlechtsverwandten, und auch einen ziemlich guten Gesang.

Dr. v. Spix bildet das Männchen auf seiner 67sten Tafel Fig. 2. ab, allein in allen Farben zu blaß, besonders ist dies bei den gelbgefärbten Theilen der Fall. Der Name *Sabia*h-

Außern N. $2\frac{1}{2}'''$ — L. d. innern N. $2\frac{1}{7}'''$ — L. d. Hinternagels $3\frac{1}{2}'''$. —

Weibchen: Dem Männchen vollkommen ähnlich, allein die Kehle ist weniger dunkel, oder mehr weiß, weil sie nicht so dicht gefleckt ist, auch scheint der Oberkopf weniger dunkel, der Unterleib nicht so rein weiß als am Männchen, sondern mehr graulich und gelblich überlaufen.

Junger Vogel: Obertheile etwas heller olivenbraun, überall, besonders an Rücken und Flügeldeckfedern, mit einzelnen rostrothen, an der Spitze der Feder in ein breites Fleckchen endigenden Schaftstrichen bezeichnet, wie bei unserer jungen Amsel (*Turdus Merula*) im Sommer; der Schwanz hat schon den aschgrauen Anflug; Kehle, Unterhals, Brust und Oberbauch mit hellgelb-bräunlichen, schwärzlich-braun spitzwinklich gerandeten Federn bedeckt oder gewellt; Unterbauch weiß, mit einzelnen, kaum bemerkbaren kleinen Fleckchen; Steiß gänzlich weiß. —

Diese Drossel lebt in den geschlossenen brasilianischen Urwäldern, und hat die Eigenheiten und Manieren der übrigen Arten. Ihren Gesang habe ich nicht beobachtet.

Dr. v. Spix bildet diese Species unter der

Benennung des *Turdus albiventer* ab, und hat sie in den Provinzen *Minas* und *Pará* beobachtet, sie scheint also über ganz Brasilien und den größten Theil von Südamerica verbreitet, da *Azara* ihrer wahrscheinlich für *Paraguay* gedenkt. *Spix's* Abbildung ist ziemlich deutlich, doch könnte mancher Zug an ihr getadelt werden. *Turdus albicollis Spixii* scheint mir auch hierher zu gehören.

4. *T. ferrugineus*.

Die rostfarbige Drossel.

Dr. Obertheile olivenbraun, stark rostfarben überlaufen, eben so die Vorderfahne der Schwungfedern; Untertheile blässer; Aftergegend weiß; Kehle weißlichgelb, verloschen dunkler gestrichelt.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Schnabel auf der Firste nach der Spitze hin stark gewölbt, ziemlich stark zusammengedrückt; Dillenkante mälsig aufsteigend; Nasenhaut ziemlich vertieft, die Federn treten bis zu dem elliptischen Nasenloche vor; Kinnwinkel beinahe halb so lang als der Unterkiefer, mälsig zugespitzt, mit kurzen, zum Theil in feine Borsten endigenden Federn bedeckt; Mundwinkel mit beinahe drei Linien langen Bartbor-

sten besetzt; Zunge hornartig; die Spitze ein wenig gespalten oder gefrans't; Flügel ziemlich kurz, sie erreichen nicht die Mitte des Schwanzes, die vierte Schwungfeder ist die längste; Schwanz stark, beinahe gleich, in der Mitte kaum merklich ausgerandet; Lauf glatt gestieft, nur an seinem unteren Theile sind einige wenige Tafeln zu unterscheiden; Zehenrücken getäfelt; Hinternagel der größte von allen. An dem Kopfe dieses Vogels stehen zwischen den übrigen überall einzelne feine Federkiele, länger als die übrigen, welche nur an ihrer Spitze ein kleines Bärtchen tragen.

Färbung: Iris schön dunkelbraun; Beine sehr blaß bleifarben; Schnabel bräunlich-horngrau, seine Ränder blässer; alle Obertheile des Vogels sind rostbraun oder olivenbraun, rostfarben überlaufen, nach dem Lichte matt oder hochglänzend; Schwungfedern schwärzlich-graubraun, ihre Vorderfahne lebhaft rostbraun; Schwanzfedern dunkelgraubraun, ihr äußerer Rand rostfarben; Untertheile blässer gelblich-olivenbraun, zwischen den Schenkeln und am After weißlich; Steiß blaßröthlich-braun; Kehle weißlich-gelb, oft mehr weißlich, mit verloschen graubraunen Längsstrichen; innere Flügeldeckfedern schön hellrostroth.

Weibchen: Die Kehle ist weniger stark gestrichelt, der Bauch nur sehr wenig weiß, der Steiß ist dunkler braun gefärbt, und seine Federn haben fahl gelb-röthliche Spitzen, übrigens ist kein Unterschied zwischen beiden Geschlechtern.

Ausmessung: Länge 9" 5''' — Breite 13" 7''' — L. d. Schn. 8''' — Höhe d. Schn. 3''' — Br. d. Schn. 3''' — L. d. Flügels 4" 3''' — L. d. Schwanzes über 3" 6''' — Höhe d. Ferse 1" 2''' — L. d. Mittelzehe 9''' — L. d. äußeren Z. 5¼''' — L. d. inneren Z. 5''' — L. d. Hinterzehe 5''' — L. d. Mittelnagels 3''' — L. d. Hinternagels 3½''' —

Diese Drossel ist in allen von mir bereis'ten Gegenden nicht selten, ich habe sie besonders häufig am *Espirito Santo* gefunden, und sie bewohnt nicht bloß die großen Wälder, sondern auch einzeln zerstreute Gebüsche. Einen bedeutenden Gesang habe ich von ihr nicht gehört. Ihr Nest erbaut sie in einem dichten Buschbaume, und setzt es auf eine Astgabel oder auf einen dicken Ast. Es gleicht vollkommen dem Neste von *Turdus Merula*, ist von kleinen Wurzeln, selbst von einigen grünen Pflanzenstängeln ziemlich geräumig gebaut, und inwendig mit dürren Würzelchen und klei-

nen zarten Reischen ausgefüttert. Im Monate December fand ich in einem solchen Neste dreilängliche, schön grüne, besonders am stumpfen Ende, und auch durchaus leberbraun gefleckte Eier.

Gen. 18. *M i m u s*, Briss.

Spottdrossel.

Ich habe es hier versucht, die Drosseln mit langem sehr beweglichen abgestuften Schwanze, mit kurzen Flügeln und hohen Fersen von den eigentlichen Drosseln (*Turdus*, *Grives*) zu trennen, da diese bis jetzt mit den letzteren gewöhnlich vereinigten Vögel viele charakteristische Züge tragen, welche zu einer Trennung zu berechtigen scheinen. Ihr Schnabel ist in der Hauptsache gebildet wie bei *Turdus*, allein gewöhnlich mehr gekrümmt und zusammengedrückt, und auch in der Lebensart unterscheiden sie sich. — Die brasilianischen Arten leben nicht in den Wäldern, sondern die eine an der Seeküste auf den Gesträuchen, die andere in den offenen *Campos Geraës* der inneren Gegenden, und die dritte in dem die Flüsse einfassenden Rohre und Schilfe. Sie haben einen lauten abwechselnden Gesang, sind leb-

hafte muntere Vögel, nähren sich von Insecten, vielleicht auch von Beeren und Früchten, und fliegen nur kurz und wenig anhaltend, laufen und hüpfen aber sehr gut. *Azara* benennt sie *Calandria*. Mehrere Arten dieses Geschlechtes leben in Nordamerica, andere in den verschiedenen Welttheilen. Eine gewisse Anzahl americanischer hierher gehöriger Vögel kommen mit dem wahren nordamericanischen *polyglottus*, in Hinsicht der Färbung in den Hauptzügen, beinahe gänzlich überein, auch könnte man sie, aus diesem Gesichtspuncte betrachtet, in mehrere Unterabtheilungen bringen. In die erstere derselben würden die wahren Spottdrosseln zu stehen kommen, *Turdus polyglottus*, *Orpheus*, *lividus*, *saturninus* (der *Calandria* des *Azara*) u. s. w.

1. *M. lividus*.

Die Küsten - Spottdrossel.

S. Obertheile aschgrau, Untertheile und ein Strich über den Augen weiß; Schwung- und Schwanzfedern bräunlich-schwarz, die letzteren mit weißen Spitzen; durch das Auge zieht ein verloschen dunkler Strich.

Turdus lividus, Licht.

Turdus Orpheus, Spiz Tab. 71: Fig. 2.

Meine Reise nach Bras. B. I. p. 106.

Sabiah da praya im östlichen Brasilien.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt schlank, Schwanz lang, die Flügel kurz, Ferse hoch. Der Schnabel ist messerförmig, gewölbt, stark zusammengedrückt, der Tomienrand des Oberkiefers in der Mitte eingezogen; Kuppe des Oberkiefers über die des untern etwas herabgebogen und mit einem kleinen Ausschnitte versehen; Unterkiefer ziemlich gerade, seine Dillenkante nicht merklich aufsteigend; Kinnwinkel etwas mehr als ein Dritttheil der Unterkieferlänge, sparsam befiedert, die Federchen in Borsten endigend; Nasenloch an der Spitze der Nasenfedern in der Mitte der ziemlich vertieften Nasenhaut; Zügel über dem Mundwinkel mit etwa drei Linien langen Bartborsten besetzt; Auge lebhaft, der Rand des Augenlides mit kleinen Federchen besetzt; Flügel kurz, erreichen kaum ein Dritttheil des Schwanzes, ihre vierte Feder scheint ein wenig länger als die dritte. Schwanz stark, lang, abgestuft, äußerste Federn acht bis neun Linien kürzer als die mittleren, im Affecte ausgebreitet und alsdann stark abgerundet, wie an *Lanius excubitor*, dem der schlanke Vogel auch in der Farbe gleicht. Beine stark und hoch;

Ferse mit sechs glatten Tafeln belegt, die Fer-
sensohle gestieft und scharfkantig zusammen-
gedrückt; Hinternagel bedeutend größer als
der mittlere; Zehenrücken getäfelt.

Färbung: Iris lebhaft rothbraun; Schna-
bel und Füße schwarz; Obertheile des Vogels
aschgrau, die unteren weiß; Stirn schmutzig
weißlich; Scheitel auf grauem Grunde mit
schwärzlichen Längsfleckchen bezeichnet; Flüt-
gel und Schwanz schwarzbraun, die Flügeldeck-
federn haben weißliche Rändchen, eben so die
Schwungfedern, deren mittlere breit sind, und
stark abgestumpfte Spitzen haben; vier mittlere
Schwanzfedern ungefleckt, die übrigen mit star-
ken weißen Spitzen; Seiten des Leibes und der
Schenkel mit feinen schwärzlichen Längstri-
chen bezeichnet, die an der Seite des Afters
zu breitem Flecken werden, auch an der Seite
der Kehle stehen öfters kleine dunkle Fleck-
chen.

Ausmessung: Länge 9" 5⁴⁰ — L. d.
Schnabels 7¹/₂" — Höhe d. Schn. 2²/₃" — Br.
d. Schn. 2¹/₂" — L. d. Flügels 4" 2²/₃" — L.
d. Schwanzes über 4" 6" — Höhe d. Ferse 1"
2" — L. d. Mittelzehe 9" — L. d. äußeren
Z. 6" — L. d. inneren Z. 5¹/₂" — L. d. Hin-
terzehe 5¹/₂" — L. d. Mittelnagels 3" — L. d.

äußeren N. $2\frac{1}{2}'''$ — L. d. inneren N. $2\frac{2}{5}'''$ —
L. d. Hinternagels $4'''$. —

Weibchen: Von dem Männchen nicht bedeutend verschieden.

Junge Vögel haben die Farben weniger rein und mehr gefleckt, Rücken verloschen graubraun mit weißlichen Federrändchen, die Flügel schwärzlich-graubraun, und ihnen fehlen die weißlichen Ränder der alten Vögel, am Bauche bemerkt man schwarzbräunliche Längsstriche und die Iris ist nicht rothbraun, sondern graubraun, die weißen Schwanzfederspitzen sind wenig bemerkbar, und die Schwanzfedern selbst sehr abgenutzt.

Dieser Vogel steht in Gestalt, Farbe und Lebensart etwa zwischen unsern Drosseln und dem *Lanius excubitor* in der Mitte. Er lebt bloß an den Seeküsten und ist mir weiter in das Land hinein nie vorgekommen. Gewöhnlich sieht man ihn auf der Spitze eines Strauches hochgestreckt sitzen, wo er seinen lauten, schön-abwechselnden Gesang hören läßt. An jenen sandigen, im Sommer erhitzen Küsten ist dieser Vogel in allen von mir bereisten Gegenden sehr gemein und gewiß einer der besten Sänger jenes Landes. Er lebt paarweise in jenen Niederungen hinter der flachen oder mit

Dünen versehenen Küste, wo dichte Gebüsche, gefüllt mit *Cactus*, *Bromelia*, *Passiflora*, *Eugenia*, *Myrthus*, *Coccoloba*, *Lophora*, niederen Palmen und anderen Gesträuchen, vom Winde an einem höheren Wuchse verhindert, ihm einen vortrefflichen Schlupfwinkel gewähren, in welchem er auch nistet. Ich habe das Nest nie gefunden. Man sieht ihn häufig auf dem Sandboden seine Nahrung suchen, wobei er geschickt läuft und hüpf, sie besteht in Insecten und wahrscheinlich Beeren. Wegen der Schönheit seines Gesanges hält man diesen Vogel gerne in den Zimmern, und die Brasilianer nennen ihn nach seinem Aufenthalte *Sabiah da praya* (Drossel des Seestrandes).

Viel Aehnlichkeit hat die eben beschriebene Art mit *Viellot's Turdus gilvus*, scheint aber dennoch eine verschiedene Species zu bilden. *Spix* giebt eine deutliche, aber schlecht gestellte Figur unsers Vogels, siehe die obere Figur, die untere scheint mir zu der nachfolgenden Species zu gehören. Nach ihm wird er am Rio S. Francisco, *Sabiah branco* oder *do campo* genannt, welches letztere wahrscheinlich auf die nachfolgende Art geht. — *Lichtenstein's Turdus lividus* scheint identisch mit dem hier von mir beschriebenen Vogel. In

der Beschreibung meiner Reise ist diese Species für *Turdus Orpheus*, Linn. ausgegeben, welches aber ungegründet scheint. —

2. *M. saturninus*.

Die Spottedrossel des *Campo Geral*.

S. Obertheile graubraun; ein Streifen über den Augen und die Untertheile schmutzigweiß; bei dem jungen Vogel Unterhals und Brust mit länglichen Drosselflecken bezeichnet; Schwanz und Schwungfedern dunkel graubraun, die ersteren, die mittleren ausgenommen, mit starken weißen Spitzen; durch das Auge ein dunkler Streifen.

Turdus saturninus, Licht.

Turdus Orpheus Mas, *Spix Av. T. I. Tab. 71. Fig. 1*,
Calandria proprement dit d'Azara, Voyag. Vol. III.
p. 441.

Turdus Thenca, Vieill.

? — — *Mol.*

Sabiah do Sertão in manchen Gegenden von Brasilien.

Beschreibung des weiblichen Vogels: Gestalt und Grölse der vorhergehenden Art. Schnabel scheinbar an der Spitze etwas weniger stark hinabgewölbt, Bartborsten etwas stärker als an No. 1., nur vier Linien lang; Zunge schmal, hornartig, an der Spitze ein wenig gefranst; Verhältnisse des Körpers wie an No. 1., die vierte Schwungfeder ist die längste; Fersen-

rücken mit sechs bis sieben glatten Tafeln belegt, Fersensohle gestieft und scharfkantig zusammengedrückt; Mittelzehe viel länger als die Nebenzehen.

Färbung: Obertheile schmutzig graubraun, an den Federrändern oft etwas blässer; Schwung- und Schwanzfedern dunkler graubraun, die ersteren, so wie die großen Flügeldeckfedern mit schmalen helleren Rändchen; Schwanzfedern, die mittleren ausgenommen, mit starken weißen Spitzen; von der Nase zieht über dem Auge hin ein schmutzig weißlicher Strich, ein dunkles Feld liegt durch das Auge bis auf das Ohr hin; Untertheile schmutzig weißlich, an der Brust fahl graubräunlich angeflogen, in den Seiten dunkler; Seiten des Unterleibes mit länglichen dunkel graubraunen Streifen, eben so ist der Steiß gefleckt; Schnabel am Oberkiefer schwärzlich-braun, am Unterkiefer röthlich-horngrau; Iris citrongelb; Beine auf ihrem Rücken schwärzlich-braun, an der Sohle graulich-gelb. —

Ausmessung: Länge 10^{''} — Breite 12^{''} 9^{'''}
— L. d. Schnabels 8¹/₂^{'''} — Höhe d. Schn. 2³/₄^{'''} —
Br. d. Schn. 2³/₄^{'''} — L. d. Flügels 4^{''} — L. d. Schwanzes beinahe 4^{''} — Höhe d. Ferse 1^{''} 2^{'''}
— L. d. Mittelzehe 9¹/₂^{'''} — L. d. äußeren Z.

5 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. inneren Z. 5''' — L. d. Hinterzehe 5 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelnagels 3 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äußeren N. 2 $\frac{2}{5}$ ''' — L. d. inneren N. 2 $\frac{1}{5}$ ''' — L. d. hinteren N. 4 $\frac{1}{4}$. —

Junger weiblicher Vogel: Gleicht in jeder Hinsicht dem vorhergehenden, allein alle seine Federn sind mehr hellgerandet, besonders an den Deck- und Schwungfedern sehr stark weißlich; Brust und Unterhals haben, auf gelblichweißem Grunde, viele dunkelgraubraune, etwas dreieckige Drosselfleckchen; die Federn des Hinterkopfs sind stark weißlich eingefärbt oder gestrichelt.

Männchen: Ich habe den männlichen Vogel nicht erhalten, jedoch Dr. v. Spix bildet einen solchen ab, der aber wegen seiner Brüstflecken, wie es scheint, jung war.

Diese Species hat mit der vorhergehenden so viel Aehnlichkeit, daß man auf den ersten Blick beide für identisch halten könnte, und alsdann würde *saturninus* der junge Vogel von *lividus* seyn; allein schon der Aufenthalt zeigte mir, daß beide Arten verschieden seyen, indem ich No. 1. bloß an der Seeküste, die zuletzt beschriebene aber im *Campo Geral* des inneren Brasilien beobachtet habe. Spix scheint sie zu verwechseln, und das Männchen der ei-

nen Art mit dem Weibchen der andern zu vereinigen, beide aber, wie es mir scheint, mit Unrecht für *Turdus Orpheus* zu halten, ein Irrthum, welchen ich früher, in der Beschreibung meiner Reise nach Brasilien, ebenfalls beging. *Azara* redet bloß von *Mimus saturninus*, unter der Benennung *Calandria*, die mir in Brasilien nicht vorgekommen ist. *Molina's* *Turdus Thenca* scheint ebenfalls hierher zu gehören.

Der *Sabiah do Sertao*, so nennt man ihn in einigen Gegenden von Brasilien, lebt auf Bäumen und Sträuchern, und man sieht ihn gewöhnlich auf einem erhabenen Orte sitzen. Ich habe ihn in der Gegend von *Valo* an den Grenzen der Provinzen *Minas* und *Bahia* gefunden, doch nur ein Paar Exemplare erhalten, kann deshalb auch nichts über seine Lebensart sagen, die übrigens mit der des *Sabiah da praya* (*Mimus lividus*) übereinstimmen soll. Er soll einen angenehm abwechselnden Gesang besitzen. *Molina* erzählt von seinem *Turdus Thenca*, daß er ein künstliches Nest baue, womit die Beschreibung des *Azara* über diesen Gegenstand doch nicht ganz übereinzustimmen scheint.

3. *M. brasiliensis.*

Die brasilianische Spott-Drossel.

S. Oberkopf und Oberhals schwarz; Rücken dunkelbraun; Schwanz schwarzbraun, alle Federn, die mittleren ausgenommen, mit weissen Spitzen; mittlere Schwungfedern an der Wurzel weiss; Unter Rücken fahl gelbröthlich-braun; Untertheile vom Kinn bis zum Schwanz röthlich-gelb; Seiten fein schwärzlich queer gewellt; an der Seite des Halses ein nackter orangegelber Fleck.

Japacani, Marcgr. pag. 212.

Oriolus Japacani, Lath., Gmel.

Jeterus Japacani, Daud. Vol. II. pag. 343.

Beschreibung meiner Reise nach Bras. B. II. pag. 93. 143.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel stark, mälsig zusammengedrückt, Rand des Oberkiefers ein wenig eingezogen, Firste mälsig messerförmig erhaben, sehr sanft nach der Kuppe hinabgebogen, mit kleinem Ausschnitte; Kinnwinkel nicht völlig die Mitte des Unterkiefers erreichend, vorn mälsig zugespitzt, befiedert; Nasenloch länglich, am vorderen unteren Ende der zum Theil befiederten Nasenhaut; einige drei bis vier Linien lange Bartborsten stehen über dem Mundwinkel; an jeder Seite des Halses, etwa fünf Linien vom unteren Rande des Auges entfernt, befindet sich ein etwa fünf Linien breiter und sechs Linien langer, völlig nackter Fleck; Flügel kurz,

schwach und abgerundet, reichen kaum über die Schwanzwurzel hinaus, die fünfte Feder ist die längste, die vierte kaum merklich kürzer, die erste sehr kurz, alle Schwungfedern sind etwas gekrümmt; Schwanz ziemlich lang, sehr stark und regelmässig abgestuft, aus zwölf Federn bestehend, die äussersten scheinen etwa zwei Zoll kürzer als die mittleren zu seyn; Beine hoch und stark, die Ferse auf ihrem Rücken mit sechs glatten Tafeln, an ihrer Sohle le glatt gestieft und sehr scharfkantig zusammengedrückt; zwei äussere Zehen an der Wurzel etwas vereint; Zehenrücken getäfelt; Mittel- und Hinternagel viel grösser als die übrigen.

Färbung: Schnabel schwarz; Beine schwärzlich-braun; Iris hochgelb; Obertheil und Seiten des Kopfs, so wie der Oberhals schwarz, und diese Farbe verliert sich am Anfange des Rückens in ein dunkles Caffeebraun, welches Rücken und Flügeldeckfedern färbt, eben so die hinteren Schwungfedern; übrige Schwungfedern schwarzbraun, die mittleren an der Wurzel breit sehr rein weiss; Unterrücken röthlich-gelbbraun; Schwanz schwarzbraun, alle Federn mit starken weissen Spitzen, die bloss den mittleren fehlen, welche etwas heller braun sind, als die übrigen; die weissen Spitzen nehmen nach der Seite des

Schwanzes immer an Größe zu, so daß die äußeren Federn beinahe gänzlich weiß sind; innere Flügeldeckfedern und Seiten braun; alle übrigen Untertheile des Vogels, vom Schnabel bis zum Schwanze, sind schön sanft rüthlichgelb, welches bloß an der Seite des Bauchs und der Schenkel mit feinen schwarzbraunen, sehr netten Wellenlinien durchzogen ist. Der nackte Fleck an der Seite des Halses hat eine orangegelbe Farbe.

Ausmessung: Länge 8" 8¹⁰ — L. d. Schnabels 9½¹⁰ — Höhe d. Schn. 2½ — Br. d. Schn. 2½¹⁰ — L. d. Flügels 8" 1¹⁰ — L. d. Schwanzes 4" — Höhe d. Ferse 1" 2¹⁰ — L. d. Mittelzehe 7½¹⁰ — L. d. äußeren Z. 5½¹⁰ — L. d. inneren Z. 5½¹⁰ — L. d. hinteren Z. 5½¹⁰ — L. d. Mittelnagels 3½¹⁰ — L. d. inneren N. 3¹⁰ — L. d. äußeren N. 3¹⁰ — L. d. hinteren N. 4½¹⁰.

Weibchen: Etwas kleiner als das Männchen, seine Farben weniger lebhaft, besonders der Unterleib blässer, Alles ist übrigens gleich.

Dieser schöne Vogel ist ein echter Uferbewohner, den man nur an Bach- und Flußufern findet, wo er im dichten Gesträuche oder Rohre und mannichfaltigen andern dicht gedrängten Pflanzen wohnt. Ich fand ihn in den in-

neren großen Urwäldern des Sertão der Provinz Bahia am Flüschen Catolé, als ich von Ilhéos dorthin reiste, so wie mehr südlich an den Flußufern. Er klettert, gleich unserer Rohrdrossel (*Turdus arundinaceus*), an den Rohrhalmen auf und ab, ist lebhaft, in beständiger Bewegung und läßt einen Gesang von mancherlei lauten und abwechselnden Stimmen hören. Seine Nahrung besteht in Insecten und vielleicht auch Sämereien. Das Nest steht in den dichtgedrängten Gewächsen der Flußufer, ich habe es aber nie finden können. Kommt man diesen Vögeln nahe, so verkriechen sie sich schnell in die dichteste Verflechtung der Gewächse, und man muß sich alsdann leise anstellen, wenn man sie schießen will.

Marcgrave beschreibt diese Species sehr deutlich unter der Benennung *Japacani*. *Daudin* hat sie verkannt und in das Genus *Icterus* gestellt, ein Fehler, der auch im *Dictionnaire des sciences naturelles* (Vol. 55. pag. 506) begangen ist.

Gen. 19. *Opetiorynchus*, Temm.

R u f d r o s s e l.

Herr *Temminck* hat dieses Geschlecht aufgestellt, an dessen Characteren, wie sie im *Ma-*

nuel d'ornithologie (Vol. I. pag. LXXXIII.) aufgestellt sind, ich mir einige kleine Abänderungen zu machen erlaube, wie folgt:

Schnabel: länger oder etwa eben so lang als der Kopf, schlank, schmal, pfriemförmig, gerad- oder sanft gebogen, an der Wurzel etwas breitgedrückt, zuweilen auch schmal, oft auch auf der ganzen Länge zusammengedrückt, ganzrandig, ohne Zahn oder Ausschnitt.

Nasenlöcher: lateral, etwas von der Schnabelwurzel entfernt, eiförmig, auf ihrer oberen Seite durch eine Haut geschlossen.

Zunge: etwas mehr als halb die Länge des Schnabels, an der Spitze mit einigen Borstenfasern.

Beine: lang, Ferse anderthalb oder zweimal so lang als die Mittelzehe; äussere Zehen an ihrer Wurzel vereint.

Flügel: kurz, drei erste Schwungfedern abgestuft, die dritte und vierte sind die längsten.

Schwanz: zum Theil kurz und wenig abgestuft, zum Theil länger und stärker abgestuft, aus zwölf Federn bestehend.

Ich stelle unter dieser Benennung eine Anzahl von Vögeln zusammen, welche mit den Drosseln und selbst den Sängern viel Aehnlichkeit, aber auch wieder manche Verschiedenheit

zeigen, wozu besonders der Mangel einer Ausrandung oder einer Zahnes wichtig ist. Diese Vögel leben theils in geschlossenen undurchdringlichen Urwäldern, theils in den mehr offenen und mit Gebüsch abwechselnden Gegenden, nähren sich von Insecten und haben eine sonderbare, sehr laute, aus einigen wenigen Tönen zusammengesetzte Stimme. Ich habe vier Arten von ihnen kennen gelernt, welche sich, nach ihrer äußeren Bildung, in zwei Unterabtheilungen bringen lassen.

A. Rufdrosseln mit einer Ferse, welche doppelt so lang ist, als die Mittelzehe, mit kurzem ziemlich gleichem Schwanz; Schnabel etwas kürzer als der Kopf.

1. O. r u f u s.

D i e r o s t r o t h e R u f d r o s s e l.

R. *Ueber dem Auge ein gelblich - weißer Strich; Obertheile, Flügel und Schwanz rostroth; vordere Schwungfedern schwärzlich, die mittleren an Wurzel und Spitze schwarzbraun, die nachfolgenden mit schwarzem Mittelfleck der Hinterfahne; Schwanzfedern an der Spitze zum Theil mit schwärzlichem Fleck; Untertheile weißgelblich. —*

Merops rufus, Linn., Gmel., Lath.

Le Fournier de Buenos Ayres, Buff. pl. enl. No. 739.

Le Fournier d'Azara, Voy. Vol. III. pag. 483.
Turdus figulus, Illig., Licht.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Größe eines *Cinclus aquaticus*. Schnabel etwas kürzer als der Kopf, ziemlich schlank, pfriemförmig, etwas zusammengedrückt, sehr sanft gewölbt, zugespitzt, der Oberkiefer kaum über den unteren vortretend, die Dillenkante höchst sanft aufsteigend; Kinnwinkel breit, vorn ein wenig stumpf, nicht völlig die Mitte der Schnabellänge erreichend; Nasenfedern bis gegen die Nasenöffnung vortretend; die Flügefalten nicht völlig bis zur Mitte des Schwanzes, ihre dritte und vierte Feder sind die längsten, die fünfte ist nur unbedeutend kürzer, die erste die kürzeste; Schwanz mit zwölf ziemlich gleichen, also nur sehr wenig abgestuften, starken, mäßig langen Federn; Beine hoch, Ferse zweimal so lang als die Mittelzehe, mit sechs sehr glatten Tafeln belegt; Zehen schlank, die innerste und äußerste nur wenig in der Länge verschieden, die erstere indessen ein wenig kürzer, Hinterzehe die kürzeste von allen; Nägel ein wenig aufgerichtet, sanft gewölbt, der hinterste ist der größte.

Färbung: Alle Obertheile, Schwanz und Flügel nicht ausgenommen, haben ein lebhaft-

tes Rostroth; über dem Auge entspringt ein gelblich-weißer Streifen, der nach hinten ein wenig an Breite zunimmt und an der Seite des Hinterkopfs endet; Backen und Ohrgegend dunkelbraun; vordere Schwungfedern fast gänzlich schwarzbraun, an ihrer Wurzel etwas rostroth, das auf der zweiten Feder schon breiter wird, und so zieht über alle mittlere Federn ein breiter schön rostrother Streifen hin, der am Schanz und der Vorderfahne einer jeden Feder sich auch noch ein wenig ausdehnt; weiter zurück sind die Schwungfedern schon gänzlich rostroth und haben in der Mitte der Hinterfahne nur einen roströthen Fleck, die hinteren sind gänzlich rostroth; mittlere Schwanzfedern ungefleckt rostroth, die übrigen an dem Spitzenrande der inneren Fahne mit einem schwärzlich-braunen Fleckchen; alle Untertheile des Vogels haben eine fahl gelbröthlich-weiße Farbe; an der Brust fahl gräugellich überlaufen; Schnabel schwarzbräunlich, an der Unterkieferwurzel weißlich; Beine dunkel fleischbraun.

Messung nach einem ausgestopften männlichen Vogel: Länge ungefähr 6" 6''' — L. d. Schnabels $7\frac{1}{2}$ ''' — Breite d. Schn. $1\frac{2}{3}$ ''' — Höhe d. Schn. an der Kinnwinkelspitze $1\frac{2}{3}$ ''' —

L. d. Flügels $3'' \frac{2}{3}''$ — L. d. Schwanzes etwa $2''$ — Höhe d. Ferse $11\frac{1}{2}''$ — L. d. Mittelzehe $6\frac{1}{2}''$ — L. d. äusseren Z. $5\frac{1}{2}''$ — L. d. inneren Z. $4\frac{1}{2}''$ — L. d. hinteren Z. $4\frac{1}{2}''$ — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{2}''$ — L. d. äusseren N. $1\frac{1}{2}''$ — L. d. inneren N. $1\frac{1}{2}''$ — L. d. hinteren N. $3\frac{1}{2}''$

Weibchen: Nur dadurch von dem Männchen zu unterscheiden, daß der Augenstreifen reiner weiß und weniger gelblich, die Brust aber blässer gefärbt ist, der Schwanz und die Obertheile scheinen ebenfalls von einer blässerem, ein wenig mehr verblichenen Farbe.

Dieser Vogel lebt in den meisten von mir bereisten Gegenden von Brasilien nicht, ich habe ihn bloß in der Gegend des Flusses *Jiquirica* und bei *Bahia*, am *Jaguaripa*, so wie bei *Nazareth das Farinhas* gesehen; er ist also in der Gegend des *Recanque* von *Bahia* nicht selten. Ich bemerkte ihn öfters auf benachbarten Bäumen sitzend, wo er eine sehr laute, sonderbare Stimme hören ließ, jedoch seine Natur habe ich nicht selbst kennen gelernt, da ich mich damals in einer, solchen Untersuchungen ungünstigen Lage befand. *Azara* giebt weitläufigere Nachricht über diese Species, deren Nestbau von ihm beschrieben wird; es scheint aber, daß mehrere verwandte Vögel ähnliche

sonderbare Nester bauen, weil mir dieses von drei verschiedenen Arten versichert worden ist. Buffon's Abbildung des *Fournier* ist höchst schlecht, die ganze Gestalt des gedrungenen, ziemlich kurzschwänzigen Vogels ist hier gegen die Natur in die Länge gezogen, der Schwanz viel zu lang und stark, Füße und Schnabel unrichtig und die Farben zu verloschen.

2. *O. ruficauda*.

Die fahlere Ruffdrossel.

R. Rumpf fahl röthlich-brauh; Schwanz rostroth; Schwungfedern schwärzlich-brauh; an der hinteren Fahne ein rostgelber Flack; Kehle weißlich; Brust wie die Oberbrust, nur blässer; Bauch noch heller, in's Gelbliche fallend.

(Beschreibung) nach einem ausgestopften Exemplare, dessen Geschlecht nicht angegeben ist: Gestalt und Färbung dem vorhergehenden sehr ähnlich, aber bedeutend größer; Schnabel wie an No. 1., nur im Verhältniß noch mehr schlank, gestreckt, beinahe gerade, nur an der Spitze sanft geneigt; Kinnwinkel etwa ein Drittheil der Schnabellänge, mehr zugespitzt als an No. 1., dabei befiedert; Tomienrand an beiden Arten gleich stark eingezogen;

Nasenloch gleich gebildet; Augenlid mit Federn besetzt; Schwanz, Flügel und Beine an beiden Arten gleich.

Färbung: Obertheile von einem fahlen röthlichen Braun, auf dem Scheitel mehr bräunlich überlaufen; über dem Auge zeigt sich kein weißlicher Strich; indessen scheint diese Stelle etwas mehr hell und rein röthlich gefärbt; Kehle weißlich; Brust fahl blaßröthlich-braun, welche Farbe nach dem Unterleibe hin immer heller wird und an den unteren Schwanzdeckfedern gänzlich weiß erscheint; Schwungfedern dunkel graubraun, auf ihrer hinteren Fahne ein großer hell rostgelber Fleck, die Vorderfahne röthlich, so wie die ganzen hinteren Schwungfedern; Schwanz ungefleckt rostroth, seine mittleren Federn von der Farbe des Rückens, also blässer; Schnabel am Oberkiefer und der Spitze dunkelbraun, Wurzel des unteren heller; Beine scheinen gefärbt wie an No. 1. —

Messung nach dem ausgestopften Exemplare: Länge 7" — L. d. Schnabels $8\frac{1}{2}$ " — Br. d. Schn. 2" — Höhe d. Schn. 2" — L. d. Flügels $3\frac{2}{3}$ " — L. d. Schwanzes etwas über 2" — Höhe der Ferse 1". —

Ich besitze in meiner ornithologischen Sammlung das aus *Minas Geraes* stammende Exem-

plar, von welchem ich so eben die Beschreibung gegeben, und bin ungewiß, welcher Vogel von beiden Arten, der von *Azara* beschriebene *Hornero* (*Fournier*) sey. Mein erster Vogel hat die Färbung des *Hornero* mehr als der zweite, dagegen hat meine zweite Species mehr die Größe, und könnte, der Färbung zufolge, wohl ein Junges des *Hornero* seyn. Beide von mir beschriebene Arten gleichen sich sehr, scheinen aber verschieden zu seyn. Ueber die Lebensart meiner zweiten Species kann ich nichts hinzufügen, als daß *Freireis*, welcher diesen Vogel mit aus *Minas* brachte, mir sagte, es sey diese diejenige Art, welche, wegen ihres künstlichen Nestbaues, dort den Namen *João de barro* trage. Mir ist dieses also nun von drei verschiedenen Vogelarten versichert worden, worüber uns spätere Reisende die näheren Aufklärungen verschaffen werden.

B. *Rufdrosseln mit einer Ferse, die etwa anderthalbmal so lang ist, als die Mittelzehe, mit mehr verlängertem, sehr stark abgestuftem Schwanz und kürzeren Flügeln.*

3. *O. t u r d i n u s.*

Die *Rufdrossel* mit geflecktem Unterleibe.
R. Iris rothbraun; Oberleib graubraun, Schwanz und

*Flügel mit gelblichen Randfleckchen; Unterleib
weiß mit graubraunen Fleckchen.*

Campylorhynchus scolopaceus, Spiz. Av. T. I. pag. 77.

Tab. 79. Fig. 1.

? *Turdus scolopaceus*, Licht. Verzeichn. d. Doubl.
pag. 39.

Meine Reise nach Bras. B. II. pag. 148.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Größe einer kleinen Drossel, aber mehr schlank.
Schnabel wie an No. 2., aber etwas kürzer,
weniger zusammengedrückt, ohne Zahn oder
Ausschnitt, der Tomienrand nicht so eingezo-
gen; Kinnwinkel ziemlich wie dort, aber etwas
länger; Nase eben so gebildet; die Kuppe des
Oberkiefers tritt ein wenig mehr über die un-
tere über; die Zunge reicht ein wenig über
die Hälfte des Schnabels hinaus und ist an ih-
rer Spitze mit drei Borstenfasern gefranst; Bei-
ne hoch und stark; Ferse mit sechs Tafeln be-
legt, deren obere größtentheils von den Federn
bedeckt ist; Hinternagel weit größer als die
übrigen; Flügel kurz, reichen kaum über die
Schwanzwurzel hinaus, die fünfte Feder ist die
längste; Schwanz ziemlich lang, stark, gewöhn-
lich schmal zusammengeschoben, aus zwölf
schmalen, abgestuften Federn zusammengesetzt;
äußere Feder etwa neun Linien kürzer als die
mittleren.

Färbung: Iris lebhaft rothbraun; Schnabel am Oberkiefer graubraun, am unteren weißlich-fleischbraun; Beine bleifarben; alle Obertheile sind hellgraubraun, am Kopf und Oberhals mit blässeren Rändern, eben so die Schultern, allein hier sind die Rändchen sparsamer; ein Streifen vom Schnabel über dem Auge hin nach dem Hinterkopfe, Kehle, Unterhals und Brust weißlich, die Kehle ungefleckt, die übrigen Untertheile aber mit einzelnen, etwas spitzwinkligen, graubraunen Drosselflecken; Seiten des Kopfs und Backen graubräunlich, mit blässern, weißgraulichen Rändchen; Bauch, After, Schenkel und Steiß blaß grauröthlich überlaufen, schwärzlich-graubraun quer gefleckt; Seiten des Leibes stark schwärzlich-graubraun quer gewellt, eben so die inneren Flügeldeckfedern; große Flügeldeckfedern mit blaß röthlichem Seitenrande und zwei breiteren Fleckchen daran; Schwungfedern eben so am vorderen Rande etwas zackig blaß röthlich gezeichnet und eingefalst; Unterrücken (*uropygium*) dunkel-graubraun mit helleren Federrändchen; mittlere Schwanzfedern an den Seiten dunkel-graubraun gefleckt und an ihrem äußeren Rande blaß röthlich gezackt, die äußeren Federn ungefleckt-graubraun.

Ausmessung: Länge 7" 11"¹⁰⁰ — Breite 9" 1"¹⁰⁰ — L. d. Schnabels 8"¹⁰⁰ — Br. d. Schn. 1 $\frac{1}{2}$ "¹⁰⁰ — Höhe des Schn. an der Kinnwinkelspitze 2"¹⁰⁰ — L. d. Flügels 2" 10 $\frac{1}{2}$ "¹⁰⁰ — L. d. Schwanzes etwa 8" — Höhe der Ferse 11" — L. d. Mittelzehe 6 $\frac{1}{2}$ "¹⁰⁰ — L. d. äußeren Z. 4 $\frac{6}{7}$ "¹⁰⁰ — L. d. inneren Z. 4" — L. d. Hinterzehe 4" — L. d. Mittelnagels 2 $\frac{2}{3}$ "¹⁰⁰ — L. d. äußeren N. 2 $\frac{1}{2}$ "¹⁰⁰ — L. d. inneren N. 2 $\frac{1}{2}$ "¹⁰⁰ — L. d. Hinternagels 3 $\frac{2}{3}$ "¹⁰⁰ —

Weibchen: Es unterscheidet sich dadurch von dem Männchen, daß seine großen Flügeldeckfedern, so wie die hinteren Schwungfedern, die oben beschriebene, zackig gefleckte gelbröthliche Einfassung haben, die dem andern Geschlechte beinahe fehlt und nur schwach angedeutet ist. Die Größe beider Geschlechter scheint ziemlich dieselbe.

Dieser Vogel ist nur Bewohner der großen Urwälder, und ich fand ihn auch da, wo dieselben die Ufer der ~~die~~ durchschneidenden Flüsse bedecken. *Spix* fand ihn schon südlich in den Wäldern bei *Rio de Janeiro*. Er durchzieht hüpfend die Gebüsche und hohen Baumkronen der Waldbäume, und läßt dabei seinen sehr lauten, aus drei gleichartig hinter einander ausgestoßenen Tönen zusammengesetzten Ruf hören, welcher wie: *Kiock! Kiock! Kiock!* klingt.

Ich fand diese Vogelart zuerst am *Rio Doce*, als ich am Abend, nach einer mühevollen Schifffahrt, den Fluß aufwärts, an einer unbewohnten mit Urwald bewachsenen Insel landete. Meine Jäger hieben eben das Gesträuch nieder, um unsere Feuer anzuzünden, als der Vogel über unseren Köpfen rief; allein ich konnte ihn damals, aller angewandten Mühe ungeachtet, nicht erhalten. Später hörte ich ihn ebenfalls häufig in den großen Waldungen am Flusse *Belmonte*, erhielt ihn aber erst im nachfolgenden Jahre, als ich mich in einer Rosse am Flüschen *Catolé* an der alten verwilderten Strasse des *Capitão Filisberto* aufhielt. Dort hörten wir diese Vögel täglich in dem hohen uns umgebenden Urwalde rufen, es gelang uns mehrere von ihnen zu erlegen, und ich fand auch ihr eben vollendetes, aber leider noch leeres Nest, dessen Erbauer meine Jäger eben getödtet hatten. Dieses Nest stand in einer alten, verwilderten, jetzt mit hohen Gebüsch bewachsenen Pflanzung, auf einem isolirten, etwa vierzig bis fünfzig Fuß hohen Bäume. Es bildet in den schwanken Zweigen einen großen Ballen von dürrem Grase und Bast, vermischt mit Bündeln von Baumwolle aus der alten Pflanzung, und ist oben verschlossen. Der Eingang

in dasselbe war eine kleine Oeffnung an der Seite. In der Brütezeit fliegen diese Vögel paarweise umher, sie lieben, wie es scheint, die Flußufer, und gehen ihrer Nahrung, den Insecten nach, die sie an den Bäumen suchen. Beide Vögel locken sich alsdann mit einem beinahe krächzenden, kurzen, etwas schmatzenden Locktone, und wenn sie den lauten Ruf hören lassen, so sitzen sie auf einem Aste, und bewegen den etwas langen Schwanz auf- und abwärts. Man hört diese Stimme während des ganzen Tages, besonders Morgens und Abends, und sie unterhält den in jenen herrlichen Wildnissen noch unerfahrenen Jäger. In Lebensart und Gestalt hat unser Vogel viel Aehnlichkeit mit den Arten des Geschlechts *Anabates*, zu welchen ich ihn vielleicht gestellt haben würde, wenn sein Schnabel mit einem Zahne versehen wäre.

Dr. v. Spix bildet die so eben beschriebene Vogelart in seinem Werke über die brasilianischen Vögel ab; die Gestalt der Figur ist steif und unnatürlich, ihre Obertheile sind zu sehr in's Schwärzliche fallend abgebildet, und die Iris sollte mehr rothbraun seyn; auch sitzt dieser Vogel wohl sehr selten auf dem Boden.

Illustration des Vögelns

4. *O. rectirostris.*

Die Ruffdrossel mit rostrothen Extremitäten.

R. Kopf, Flügel und Schwanz rostroth; Rücken olivenbraun; Untertheile fahl gelblich-olivengrün; Iris hochgelb.

Meine Reise nach Bras. B. II. pag. 191.

João de barro an den Gränzen von *Minas* und *Bahia*.

Beschreibung des weiblichen Vogels: Gestalt schlank und zierlich, Federn sehr glatt anliegend; Schnabel ziemlich lang, stark, hoch, gerade und zugespitzt, auf seiner ganzen Länge etwas zusammengedrückt und an der Wurzel wenig breiter als in der Mitte; Firste ziemlich abgerundet, nach der ein wenig über den Unterkiefer herabtretenden Kuppe sehr sanft hinab gewölbt, kein Zahn hinter der Kuppe; Nasenloch in der Mitte der Schnabelhöhe, ziemlich rundlich-elliptisch, sein oberer Rand etwas erhaben, die Nasenfedern treten bis zu demselben vor; Kinnwinkel kurz, hält kaum ein Drittheil der Unterkieferlänge, ist mäßig zugespitzt und mit kurzen Federchen sparsam besetzt; Dillenkaute ein wenig abgerundet, nur sehr sanft aufsteigend; eigentliche Bartborsten fehlen, allein der Zügel ist mit sehr kurzen Federchen besetzt, welche in kurze, schwarze Bartborsten endigen; Zunge halb so lang als

der Schnabel, schmal, zugespitzt, hornartig, vorn ein wenig getheilt; Augenlider ziemlich nackt, ihr Rand mit kleinen Federchen besetzt; Flügel kaum ein Dritttheil der Schwanzlänge erreichend, die vierte Feder ist die längste; Schwanz ziemlich lang, stark abgestuft, die äußersten Federn einen Zoll drei bis vier Linien kürzer als die mittleren, sie sind sämmtlich an der Spitze rundlich zugespitzt, äußere Fahne der äußeren Federn sehr schmal; Beine stark und ziemlich hoch; Ferse mit sechs bis sieben Tafeln belegt, ihre Sohle ebenfalls gefaltet, so wie der Zehenrücken; Hinternagel am größten.

Färbung: Iris hochgelb; Oberkiefer horngrau-braun, Unterkiefer röthlich-weiß, bloß dessen Spitze graubraun; nackte Augenlider blaß gelblich; Beine hell graubräunlich; Oberkopf, Ober- und Seitenhals, Flügel und Schwanz rostroth, Kopf und Hals heller, Flügel und Schwanz dunkler, mit einer Beimischung von Braun; Flügel zum Theil ein wenig olivenfarben überlaufen; Rücken gelbröthlich-olivengraubraun, die oberen Schwanzdeckfedern rothbraun. Scapular- und kleine obere Flügeldeckfedern gefärbt wie der Rücken; Seiten des Kopfs wie der Scheitel, nur blässer; alle Untertheile hell

saft röthlich-olivengelb, an der Kehle blafs und mehr rein gelblich, an den Seiten der Brust und des Leibes olivenbraun stark überlaufen; Steifs rostroth, innere Flügeldeckfedern hell gelblich-rostroth, Schwungfedern schwärzlich-graubraun mit schwarzen Schäften, rostrother Vorderfahne und dergleichen Saume an der inneren Fahne.

Ausmessung: Länge 8" 8''' — Breite 10" 11''' — L. d. Schnabels 9 $\frac{1}{4}$ ''' — Br. d. Schn. 2 $\frac{1}{2}$ ''' — Höhe d. Schn. 2 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Flügels 3" 6''' — L. d. Schwanzes etwas über 3" — Höhe d. Ferse 11''' — L. d. Mittelzehe 7 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äufsern Z. 5''' — L. d. inneren Z. 4 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Hinterzehe 4 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelnagels 3''' — L. d. äufseren N. 2 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. inneren N. 2 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinternagels 3 $\frac{1}{2}$ ''' —

Dieser niedliche Vogel ist mir in den *Campos Geraës* des inneren Brasiliens vorgekommen, wo er in den Gesträuchen umher kriecht, sich auf den Zweigen bewegt und mit dem Schwanze schnell. Sein Gefieder ist zwar einfach gefärbt, aber immer sehr nett gehalten, glatt anliegend, auch ist die Gestalt sehr zierlich. Die Bewohner jener Gegenden nennen ihn *João de barro*, weil er ein großes Nest von Letten mit mehreren Kammern bauen soll, wel-

ches jetzt den Naturforschern schon bekannt, mir aber in Brasilien zufällig nicht vorgekommen ist. Sowohl dem *Hörnero* des *Azara* als dem hier beschriebenen Vogel schreibt man ein solches künstliches Nest zu, und Dr. v. Spix macht uns noch mit einem dritten *João de barro* bekannt, den er *Figulus albogularis* nennt, wahrscheinlich sind also alle diese verwandten Arten durch einen solchen merkwürdigen Kunsttrieb ausgezeichnet. Ich werde ein solches Nest in meinen Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's geben, wenn anders dieses Werk gute Aufnahme finden sollte.

Fam. XI. Sylviadae, Vig.

Sängerartige Vögel.

In diese Familie gehören die vorzüglichsten europäischen Sänger, und selbst ein Theil der bessern Singvögel der fremden Welttheile. Man muß jedoch bemerken, daß die südamerikanischen, in der Gestalt mit unsern Sängern vollkommen verwandten Vögel, zum Theil nur wenig Gesang haben.

Gen. 20. *Synallaxis*, Vieill.
Kriecher.

Die Vögel dieses Geschlechts bilden einen Uebergang von den Kletterdrosseln (*Anabates*) zu den Sängern, ich habe aber die ersteren in eine andere Familie gesetzt, weil alle diese Vögel mannichfaltige Verwandtschaften zeigen. Die Gestalt des Schnabels ist sehr mit *Anabates* verwandt, allein weniger hoch, und so wie diese haben sie noch eine gewisse Aehnlichkeit in der Vertheilung ihrer Farben mit den Baumhackern, indem Flügel und Schwanz meistens, und bei einigen sogar der Scheitel, rothbraun gefärbt sind; eben so ähnlich ist die Zunge, die Gestalt der kurzen Flügel, der hohen Fersen, des abgestuften Schwanzes mit denen der *Anabates*, allein in der Hauptbildung ihres Körpers sind sie den Sängern (*Sylvia*) mehr ähnlich, und auch ihre Lebensart gleicht mehr der der letzteren. Ihre Flügel sind, wie gesagt, kurz und abgerundet, schwach und ihr Schwanz besteht aus zwölf schmalen, steifen, am Ende sehr abgenutzten Federn, deren Bärte, bei vielen Arten, weitläufig von einander entfernt stehen. Vieillot bildete zuerst dieses Genus, welches mit dem vorhergehenden mit ungezähntem Schnabel, den Uebergang zu den äch-

ten Sängern zu machen, und für America das Geschlecht *Malurus* der alten Welt zu ersetzen scheint. Bloß wegen einiger kleinen, mir nöthig scheinenden Abänderungen, habe ich die *Characteres* der *Synallaxen* nachfolgend aufgeführt:

Schnabel: schlank, meist ganzrandig, zuweilen an der Spitze des Oberkiefers mit einem kleinen Zahne versehen, zugespitzt, zusammengedrückt, die Tomienränder in der Mitte eingezogen; Oberkiefer sanft gewölbt; Unterkiefer gerade, Dillenkante sanft aufsteigend.

Nasenlöcher: länglich, an der Basis oder Oberseite mit einer Haut geschlossen.

Zunge: schmal zugespitzt, vorn ein wenig getheilt und mit einigen Borsten versehen.

Flügel: kurz abgerundet; erste Feder sehr kurz, die vierte am längsten.

Schwanz: aus zwölf abgestuften, ziemlich steifen Federn bestehend.

Beine: vierzehig; äußere Vorderzehen entweder vereint an der Wurzel, oder zuweilen beinahe ganz frei; Mittelzehe länger als die Nebenzehen, die äußere etwas länger als die innere, oder beide einander ziemlich gleich.

Diese Vögel leben in geschlossenen Urwäldern und in offenen, mit Gebüsch und Wal-

dungen abwechselnden Gegenden. Sie sind lebhaft und gewandt, immer in Bewegung; etwa wie unsere Sänger (*Sylvia*), durchkriechen die dichten, dunkeln, niederen Gebüsch, hüpfen auf den Zweigen, steigen, zum Theil gleich unsern Meisen, an denselben umher und suchen Insecten, deren Eier und Puppen. Sie haben weder einen weiten noch hohen Flug, sondern es verhält sich damit wie bei unsern Sängern. Einen Gesang habe ich bei ihnen nicht bemerkt, wohl aber eine kurze Lockstimme. Ueber die Art zu nisten kann ich nur bei einer Art reden.

A. Kriecher mit ganzem Tomienrande, die beiden äußeren Zehen vereint, Flügel sehr kurz.

1. *S. cinereus.*

Der schieferbrüstige Kriecher.

*K. Scheitel, Flügel und Schwanz rostroth; Rücken olivenbraun; Kehle weißgrau; Untertheile dunkel-
aschgrau; Seiten des Leibes olivenbräunlich.*

Parulus ruficeps, Spix Tab. 86. Fig. 1. und 2.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt und Größe eines Sängers; Schnabel gerade, ziemlich kurz, stark zusammengedrückt, an der Spitze herabgeneigt, die Dillenkante st-

was aufsteigend; Nasenhaut bis zur Mitte befiedert; Kinnwinkel etwa ein Dritttheil der Kieferlänge befiedert und ziemlich stumpf; Tomienränder in der Mitte des Schnabels ein wenig eingezogen; Augenlid ziemlich befiedert; Flügel kurz, rund, falten kaum über die Schwanzwurzel hinaus, die vierte Schwungfeder ist die längste; Schwanz mit schmalen, abgestuften, steifen, am Ende sehr abgenutzten Federn, deren Bärte weit von einander entfernt stehen, die äußerste Feder viel kürzer als die mittleren. Beine hoch und stark, Ferse mit fünf bis sechs glatten Tafeln belegt, Mittelzehe viel länger als die Seitenzehen; Nägel schmal verlängert, mäßig gewölbt, der mittlere viel größer als die der Seitenzehen, Hinternagel der größte.

Färbung: Iris im Auge schön gelbbraun; Beine blafs olivengrau; Schnabel schwärzlichbraun, an der Wurzel und dem Rande des Unterkiefers weißlich; Stirn, Scheitel bis in den Nacken sind lebhaft rothbraun, hinter dem Auge geht, von dessen Obertheile aus, ein hellgelber Streifen, welcher gegen den rostrothen Scheitel nett absticht; übrige Obertheile olivenbraun; Flügel und Schwanz rothbraun, etwas dunkler als der Scheitel, der Schwanz am dun-

kelsten; Schwungfedern schwärzlich-bräunlich, an der Vorderfahne, so wie ein großer Fleck an der Wurzel der inneren Fahne rothbraun; Kehle weißlich-grau, die Federn sind hier schwärzlich-grau und haben weißliche Spitzen, wodurch die graue Mischung entsteht; Seiten des Kopfs und alle Untertheile dunkel aschgrau, die Federschäfte etwas blässer; Bauch ein wenig mehr weißlich; Seiten der Brust und des Leibes stark olivenbraun überlaufen.

Ausmessung: Länge 5" 10'" — Länge d. Schnabels 5'" — Höhe d. Schn. 1½'" — Br. d. Schn. 1½'" — L. d. Flügels 2" 1'" — L. d. Schwanzes ungefähr 2" 6'" — Höhe d. Ferse 9¼'" — L. d. Mittelzehe 5½'" — L. d. äußeren Z. 4'" — L. d. inneren Z. 3¾'" — L. d. Hinterzehe 4'" — L. d. Mittelnagels 2½'" — L. d. Hinternagels 3'" —

Weibchen: Dem Männchen ähnlich, aber alle Farben blässer, besonders die Untertheile weniger dunkelgrau, und überall mehr bräunlich überlaufen. Kehle schwärzlich-grau mit weißlichen Quersfleckchen; am Unterhalse ein schwärzlicher Fleck.

Junges Weibchen: Ich erhielt einen solchen Vogel, der eben sein vollkommenes Gefieder anlegte, Die Iris war nur graubraun, der

Scheitel noch Olivenbraun, allein schon mehr röthlich, und es zeigten sich schon rostrothe Federn; der hellgelbe Augenstreif war vorhanden, alle unteren Theile blafs olivengrau, an der Kehle blässer, mehr queer gewässert, und an Unterhals und Brust mit verloschenen Schaftstrichen; Seiten unter den Flügeln etwas gelbroth, innere Flügeldeckfedern hellrostroth. Alle jungen Vögel haben die Untertheile heller, mehr weislich gefärbt als die alten.

Ausmessung: Länge 5" 8¹⁰ — Breite 6" 9¹⁰ —

Dieser Vogel ist mir in den grossen Urwäldern an der Strasse des *Capitao Filisberto* vorgekommen, wo er besonders in den niederen, dunkeln Gesträuchen an den Ufern einiger Bäche umher kroch. Er hält kaum einen Augenblick auf einer Stelle aus, ist immer in Bewegung und sein höchst abgenutzter Schwanz zeigt an, daß er an allen Zweigen, besonders zwischen den dichten Schlingpflanzen, in dunkeln dichten Gesträuchen und an der Erde sich beständig streicht und reibt, auch kroch er häufig nahe an der Erde nach Insecten umher, wobei er eine kurze Lockstimme hören liess. In seinem Magen fanden sich kleine Käferchen.

Temminck's Synallax grisea (Synallaxis

cinerascens, pl. col. 227. Fig. 3.) Hat Aehnlichkeit mit dem von mir eben beschriebenen jungen weiblichen Vogel, bevor er den rostrothen Scheitel erhält, scheint aber verschieden, da sich an meinen Kugeln nichts von der weissen und schwarzen Kehle zeigt. Die Stellung dieser Vögel in dem Temminck'schen Werke ist nicht gut gewählt, da sie in der Natur klein zusammengezogen, niedergebückt und oft mit aufgehobenem Schwanz umherschlüpfen. Inguß ist die Spitzfigur von dieser Species. Die Iris im Auge, weils, welches unrichtig sind. Dieser Reisende fand unsern Vogel am Rio San Francisco und nannte ihn *Rapidas nuficeps*. Wenn ich auch gänzlich davon abstehe, daß *Spiz* den großen Fehler beging, sich nirgends an die von andern gegebenen Benennungen zu binden, indem er bei keinem einzigen Thiere der übrigen Schriftsteller gethan, so habe ich mich hien selbst überschlagen geglaubt, den Trivialnamen abzuändern, da denn die Benennung *nuficeps* auf mehrere dieser Vögel paßt, daher zu verwerfen ist, da bis hin

2. *S. pallidus*.
Die gefahle Kuffeche.
K. Scheitel, Flügel und Schwanz hell rostfarben;
ein weißlicher Superciliarstrich; Obertheile hell
bischlich-olivengrün, Untertheile schmutzig fahl
grünlich.

Beschreibung des weiblichen Vogels: Ge-
stalt von No. 1., allein etwas kleiner, die Fer-
sen weniger hoch und der Schnabel mehr ver-
längert, mehr zugespitzt und mehr schlank,
Dallekante etwas weniger aufsteigend und des-
halb die Firste scheinbar mehr gewölbt; Kin-
winkel etwa ein Dritttheil der Schnabellänge
reichend, mäßig zugespitzt, befiedert; Zunge
schmal zugespitzt, vorn ein wenig getheilt, und
an den Seiten der Spitze mit einigen Borsten
versehen; die Flügel falten ein wenig über die
Schwanzwurzel hinaus, die dritte Feder die
längste, Schwanz aus zwölf starken, am Ende
sehr abgenutzten Federn gebildet, deren Schäfte
deshalb an den mittleren Federn ein wenig vor-
treten; ihre Bärte stehen nicht enge vereint
und sind sehr abgenutzt, die äußere Fahne ist
sehr schmal, die innere breit; Beine etwas we-
niger hoch, übrigens gebildet wie an No. 1.,
Ferse mit fünf Tafeln belegt, äußere Zehen
nur wenig vereint.

Färbung: Iris bräunlich-roth oder kirschbraun; Schnabel am Oberkiefer horngrau-braun, Unterkiefer weißlich - fleischfarben, Beine graulich-olivengrün, Nägel hell graubraun; Scheitel, Flügel und Schwanz hell rostroth; ein weißer Streifen vom dem Nasenloche über dem Auge weg nach dem Hinterkopf; hinter dem Auge hat der weiße Strich eine dunkel graubraune Einfassung, und der Backen ist hell gelblich und olivenbräunlich gemischt, alle Obertheile sind hell röthlich-olivengrün, auf der Mitte des Rückens am lebhaftesten; Kehle etwas weißlich; alle Untertheile hell blivengrau, an den Seiten stark olivenbraun überlaufen, überall ungefleckt; Schwungfedern schwarzbräunlich, an der vorderen Fahne rostroth, so wie der Schaft; innere Flügeldeckfedern hell rostgelb.

Ausmessung: Länge 5" 10'" — Breite 7" 4'" — L. d. Schnabels 4½'" — Breite d. Schn. 1½'" — Höhe d. Schn. 1½'" — L. d. Flügels 2" 4½'" — L. d. Schwanzes beinahe 2" 6'" — Höhe d. Ferse 6½'" — L. d. Mittelzehe 5½'" — L. d. äußeren Z. 3½'" — L. d. inneren Z. 3'" — L. d. Hinterzehe 3½'" — L. d. Mittelnagels 2'" — L. d. Hinternagels 3'".

Männchen: Von dem Weibchen in der

Färbung nicht merklich verschieden; Iris im Auge grünlich-grau, welches ein geringeres Alter anzeigt.

Ausmessung: Länge 6" $4\frac{1}{2}$ ". —

Dieser Vogel findet sich in den inneren grossen *Campos Geraës* von Brasilien, und zwar in den Waldthälern und Einschnitten im Gebüsche, wo man ihn ausser der Paarzeit Familienweise antrifft, indem er nach Insecten das Laub durchsucht, und selbst an jungen Stangen steigt, hackt und pickt, also wirklich nicht blofs in Gestalt und Farbe, sondern auch in der Lebensart einen Uebergang von den Singern zu den Baumhackern macht. Eine Stimme habe ich nicht von ihm gehört. Mit der vorhergehenden Art hat diese die grösste Aehnlichkeit, und gehört deshalb zu den vielen, in der Bildung der brasilianischen Thiere vorkommenden Wiederholungen.

B. Kriecher mit sehr schlankem, pfriemförmig zugespitztem, ungezähntem Schnabel, etwas längeren Flügeln und beinahe ganz getrennten äusseren Zehen, die Seitenzehen gleich lang.

3. *S. caudatus*.

Der Kriecher mit gelber Kehle und zugespitzten Schwanzfedern.

K. Schwanzfedern mit langen Spitzen versehen; Ober-

theile rostroth; die unteren weißlich; an Brust
und Seiten fahl grau-bräunlich überlaufen; Kehle
hellgelb.

L'Inondé, d'Azara Voy. Vol. III. pag. 461.

Meine Reise nach Bras, Bd. I. pag. 48.

Opisthorynchus thundatus, Temm.

Synallaxis ruficauda, Spiz. 44, Tab. 35, Fig. 2.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt schlank und angenehm; Schnabel schlank, gerade, ziemlich lang, zugespitzt; stark zusammengedrückt, Birste nur sehr wenig gewölbt, Dillenkante höchst sanft aufsteigend; Tomienränder stark eingezogen; Kinnwinkel kurz, stumpf und befiedert; Nasenöffnung ritzenförmig, an der unteren Seite der befiederten Nasenhaut; Augenlider mit kleinen Federn besetzt; die Flügel erreichen noch nicht das erste Drittheil des Schwanzes, ihre Federn sind gewölbt, die erste kurz, die vierte scheint die längste; Schwanz aus zwölf stark abgestuften Federn bestehend, ihre Fahne an beiden Seiten vor der Spitze stark ausgeschnitten, so daß an den mittleren Federn eine drei und eine halbe Linie lange Spitze vortritt, die an ihrer Seite nur sehr kurze Bärtchen hat; die äußere Feder hat keine solche vortretende Spitze, bei allen andern kommen sie vor, obgleich weniger lang als an den mittleren Federn; Beine

stark, mäßig hoch, die Ferse mit fünf glatten Schildtafeln belegt, die Sohle derselben schärfkantig zusammengedrückt; Hinternagel weit größer als die vorderen.

Färbung: Schnabel bräunlich-schwarz; Iris im Auge rothbraun; Beine bleifarben; Obertheile röthlich-braun, Flügel und Schwanz lebhaft rothbraun; vordere Schwungfedern gänzlich graubraun; die nachfolgenden mit graubrauner Spitzenhälfte an beiden Fahnen, die hinteren gänzlich rothbraun; innere Flügeldeckfedern bläulich rothgelblich; Unterrücken und obere Schwanzdeckfedern fahl röthlich, blässer als der Rücken; Kinn und Obertheil der Kehle mit einem hell citrongelben Flecke bezeichnet; alle übrigen Untertheile weißlich; Mitte des Bauchs weiß; Unterhals, Oberbrust, Seiten des Leibes und Steiß hell fahl graubräunlich überlaufen.

Messung: Länge 5" 10^{'''} — Breite 6" 6^{'''} — Länge d. Schnabels 6^{'''} — Höhe d. Schn. 1¹/₄" — Breite d. Schn. 1¹/₄" — L. d. Flügels 2" 2¹/₄" — L. d. Schwanzes etwa 2¹/₄" — Höhe d. Ferse 7³/₄" — L. d. Mittelzehe 5¹/₄" — L. d. äußeren Z. 3³/₄" — L. d. inneren Zehe 3¹/₄" — L. d. Hinterzehe 3¹/₄" — L. d. Mittelnagels 2¹/₄" — L. d. Hinternagels 2¹/₄". —

Männchen und *Weibchen* sind nicht bedeutend verschieden, das erstere hat etwas mehr und lebhafteres Gelb an der Kehle, auch scheinen seine übrigen Farben lebhafter.

Azara hat zuerst diesen netten Vogel beschrieben und sehr wichtige Nachrichten von ihm gegeben. Er ist über einen grossen Theil von Südamerica verbreitet, da er in Brasilien vorkommt und zugleich am *La Plata*-Strome gefunden wird. Er kam mir zuerst in der Nähe von *Rio de Janeiro* vor, an Seen, Teichen, Bächen und Sümpfen, wo er in dichten Kräutern, Gesträuchen und besonders im Rohre und Schilfe umherkriecht, und an den Halmen klettert. Sein hellrothrothes Gefieder, verbunden mit der niedlichen, schlanken Gestalt, machen diesen munteren, belebten Vogel zu einer Zierde der Ufer. Er hat keinen bedeutenden Gesang, wie auch *Azara* bemerkt, und nährt sich von Insecten. In der Gegend von *Cabo Frio*, zu *Coral de Battuba* und zu *Muribaca* am Flusse *Itabapua* fand ich Nester dieser Vögel, und zwar das Einemal ziemlich weit vom Wasser entfernt in dem Gebüsch einer trockenen Viehtrift, nahe bei unserer Hütte zu *Coral de Battuba*. Dieses Nest setzt der Vogel in eine Astgabel oder zwischen Rohrhalmen und bildet

dasselbe aus einer Menge Wolle von Thieren und Pflanzen, besonders von der Saamenwolle eines kleinen auf Bäumen wachsenden *Epidendrum* oder *Bromelia*. Es ist kugelförmig zu einem dicken Ballen ziemlich kunstlos gebaut, hat einen kleinen Eingang und es befanden sich Ende Novembers zwei ründliche, rein weißse Eier darin, doch hätte der Vogel vielleicht noch zwei dazu gelegt. Ich habe in der Beschreibung meiner brasilianischen Reise, an verschiedenen Stellen von diesem Vogel geredet. In der Gegend der *Serra de Inud* baute er im Anfange des Monats August sein Nest, und am 21sten September fand ich ein solches zu *Coral de Battuba* beinahe vollendet. Herr *Temminck* hat diesen Vogel in seinem Genus *Opetiorynchus* mit dem *Hornero* des *Azara* zusammengestellt, welches aber, meinen Ansichten zufolge, nicht seine richtige Stelle ist. Der *Inondé* hat vollkommen die Lebensart der *Synallaxen*, während der sehr verschieden gebildete *Fournier* auch eine ganz andere Natur zeigt.

Spix bildet unsern Vogel unter der Benennung des *Synallaxis ruficauda* ab; die Stellung der Figur ist schlecht, auch der Schnabel nicht richtig gezeichnet.

C. Kriecher mit an der Spitze gezähntem Schnabel, sehr kurzen Flügeln und an der Wurzel vereinigten äußeren Zehen.

4. *S. torquatus.*

Der Kriecher mit dem schwarzen Halsbände.

K. Oberkörper röthlich-graubraun, Oberhals rothbraun; durch das Auge ein breites schwarzbraunes Feld; über demselben ein gelblich-weißer, schwarz eingefasster Streifen; Untertheile hell röthlich-gelb, über den Unterhals ein schwarzes Querband.

? *Le collier noir d'Azara, Voy. Vol. III. pag. 463.*

Beschreibung des weiblichen Vogels:

Schnabel ziemlich kurz, gerade, von dem Nasenloche an zusammengedrückt, die Kuppe sanft herab, und die Dillenkante sanft aufsteigend, Firste etwas messerförmig scharf, die Spitze ein wenig herabgebogen, mit einem kleinen Zähnen dahinter; Kinnwinkel ziemlich abgerundet, befiedert; die Zunge erreicht zwei Dritttheile der Schnabellänge, ist etwas platt, hornartig, vorn getheilt und gefrants't; Augenlid ziemlich nackt; Flügel sehr kurz, schwach, abgerundet, die fünfte Feder scheint am längsten, sie ist von der vierten kaum verschieden; Schwanz ziemlich lang, etwas abgestuft; Beine

stark, mälsig hoch, Ferse mit sechs bis sieben glatten Tafeln belegt, zwei äußere Zehen an der Wurzel vereint; Hinternagel etwas spornartig aufgerichtet.

Färbung: Schnabel schwärzlich, an der Wurzel des Unterkiefers dunkel bläulich-bleifarben; Beine hell bräunlich-fleischfarben; Oberkopf und Nacken graubraun, vom Nasenloche über das Auge hin zieht ein netter, gelblich-weißer, an seiner Oberseite schwarz eingefalteter Streifen nach dem Hinterkopfe hin; an den Seiten des Kopfs von der Schnabelwurzel zum Ohre zieht ein breites, schwarzes Feld, worin das Auge steht; Kinn und Kehle sind sanft röthlich-gelb, vom Unterhalse durch eine schöne schwarze Queerbinde getrennt; auf dem Oberhalse und den Seiten desselben liegt ein schöner, breiter, rothbrauner Queerring; alle Obertheile röthlich-braun, dunkler und weniger lebhaft als die Oberhalsbinde, an allen Federn mit verloschenen blafs graugelblichen Rändchen; Deckfedern der Flügel wie der Rücken, nur am Flügelrande und Achselgelenke schwarzbraun, mit feinen weißlichen Rändchen; innere Flügeldeckfedern weißlich, am vorderen Flügelrande schwärzlich gemischt; Untertheile sämmtlich in ihrer Mitte röthlich-gelb,

an den Seiten der Brust, so wie am Steiße oliven - graulich überlaufen; Schwung - und Schwanzfedern hell graubraun, röthlich überlaufen, äußere Fahne mehr röthlich; das schwarze Halsband der Kehle stößt an den Seiten gegen den rothen Ring des Oberhalses.

Ausmessung: Länge 6" 3''' — Breite 6" 4½''' — Länge des Schnabels ungefähr 4½''' — Höhe d. Schn. 1½''' — Br. d. Schn. 1½''' — L. d. Flügels 1" 11''' — L. d. Schwanzes etwa 2" — Höhe d. Ferse 6½''' — L. d. Mittelzehe 5½''' — L. d. äußeren Z. 3½''' — L. d. inneren Z. 3½''' — L. d. Hinterzehe 2½''' — L. d. Mittelnagels 1½''' — L. d. Hinternagels 2⅓''' — L. d. äußeren N. 1''' . —

Männchen: Sehr schön, weit lebhafter und netter gefärbt als das Weibchen, der Kehle und Augenstreifen sind schwärzer, die Kehle lebhafter gelb, Halsband recht rostroth.

Junger weiblicher Vogel: Scheitel graugelblich gemischt, das Schwarze an den Seiten des Kopfs grau gemischt.

Dieser niedliche Vogel lebt im *Campo Geral* des inneren Brasilien's, wo ich ihn in den dichten Gesträuchen herumkriechend fand. Er giebt eine kleine kurze Lockstimme von sich, ist mir übrigens nicht häufig vorgekommen.

Einige Zoologen deuten die *Sylvia* oder *Motacilla gularis*, Linn., Gmel., Lath., auf *Azara's collier noir* (Voyag. Vol. III. pag. 463.), allein dieß scheint mir mit Unrecht, dagegen könnte wohl der genannte Vogel mein *Synalaxis torquatus* seyn.

Gen. 21. *Sylvia*, Lath.

S ä n g e r.

Auch in Brasilien giebt es ein bedeutendes Heer von Singvögeln, die wie unsere europäischen, die Gebüsche und offenen, mit Holz abwechselnden Gegenden bis in die unmittelbare Nähe der menschlichen Wohnungen bevölkern. Einige von ihnen sind mehr durch Schönheit ihres Gefieders, andere mehr durch die Annehmlichkeit ihres Gesanges ausgezeichnet, und hierhin gehören besonders die Drosseln und diejenigen kleinen Arten, welche in ihren Zügen, am meisten mit unseren Sängern (*Sylvia*) übereinstimmen. Sie kommen im Baue ihres Schnabels ziemlich mit den letzteren überein, doch ist er oft ein wenig höher und breiter, und ihre Flügel sind oft etwas kürzer.

Sie haben im Allgemeinen dieselbe Lebensart, nähren sich von Insecten, Beeren und

Früchten, bauen ein ziemlich leichtes Nest in eine Astgabel eines dichten Strauches, und vereinigen sich nach der Brütezeit in kleine Gesellschaften, oft mit anderen kleinen Vögeln, um alsdann besonders den mancherlei reifen Früchten, als Orangen, Bananen, Mamonen, Goyaven u. s. w., nachzustellen. Der Gesang dieser Vögel ist bei einigen Arten recht angenehm und abwechselnd, doch sind sehr wenige, ja ich wülste kaum einen unter ihnen, der mit solcher Kraft und Modulation der Stimme sänge, als unsere Nachtigall und die ächten Grasmücken (*Sylvia atricapilla*, *hortensis*, *cinerea*, *hippolais* u. a.). — Die meisten brasilianischen Sänger singen, wie gesagt, weniger laut und abwechselnd, auch ist dieses Vogelgeschlecht in jenem Lande weniger zahlreich als bei uns. —

A. Sänger mit mäßig schlankem Schnabel, der dabei etwas kurz ist.

1. *S. canicapilla*.

Der grün und gelbe Sänger.

S. Oberkörper olivengrün; Oberkopf aschgrau, von der Nase durch das Auge ein breites schwarzes Feld; Unterkörper hochgelb.

*Le Contre-Maitre vert à poitrine d'or d'Azara, Voy.
Vol. III. pag. 336.*

*Tanagra canicapilla, Swains. Zool. illust. Vol. III.
Sylvia trichas, s. d. Beschr. meiner Reise nach Bras.
Bd. I. p. 297.*

Beschreibung des männlichen Vogels:

Kleiner als unsere *Sylvia atricapilla*. Schnabel mit einem kleinen Ausschnitte hinter der Kuppe, gerade, pfriemförmig zugespitzt, Tomien ein wenig eingezogen, Firste so viel gewölbt abfallend, als die Dille sanft gewölbt aufsteigt; Kinnwinkel ziemlich kurz und befiedert; Flügel etwas über die Schwanzwurzel hinaus fallend, die dritte Schwungfeder die längste; Schwanz etwas abgestuft, die äußeren Federn nur wenig kürzer als die mittleren; Beine schlank und hoch; Fersenrücken mit sieben bis acht höchst glatten Tafeln belegt, Fersensohle glatt gestieft und scharfkantig zusammengedrückt; Mittelzehe viel länger als die Nebenzehen, die beiden äußeren Vorderzehen an der Wurzel ein wenig vereint. —

Färbung: Ganzer Oberkopf bis in den Nacken aschgrau; Stirnrand, Nasenfedern, Zügel und ein breiter Streifen durch das Auge bis unter das Ohr hinab sammtschwarz *); alle

*) Vieillot sagt von der mit dieser Art sehr verwandten Syl-

Obertheile lebhaft olivengrün; Schwanz¹ und Schwanzfedern dunkel graubraun, die letzteren olivengrün überlaufen, und an der äußeren Fahne mit olivengrünem Rande; alle Untertheile vom Kinn bis zum Schwanz sind lebhaft gummiguttgelb, bloß an den Seiten des Leibes etwas olivenfarben überlaufen; Oberschnabel schwärzlich, der untere röthlich-weiß; Beine bräunlich-fleischfarben. —

Ausmessung: Länge 5" — L. d. Schnabels 4"¹/₂ — Br. d. Schn. 1¹/₂" — Höhe d. Schn. 1¹/₂" — L. d. Flügels 2" 2"¹/₂ — L. d. Schwanzes 1" 9"¹/₂ — Höhe d. Ferse 9"¹/₂ — L. d. Mittelzehe 6"¹/₂ — L. d. äußeren Z. 3¹/₂" — L. d. Hinterzehe 8"¹/₂ — L. d. Mittelnagels 1¹/₂" — L. d. Hinternagels 2¹/₂". —

Junges Männchen: Ihm fehlt der schwarze Augenstreif, der Oberkopf ist weniger rein aschgrau, aber die Untertheile sind schon schön gelb.

Weibchen: Der schwarze Augenstreifen fehlt, dagegen bemerkt man von der Nase über das Auge hin eine gelbe Linie von der Farbe des Unterleibes.

via trichas oder *Sylsia marylandica*, Wils., daß der Augenstreifen nach der Paarzeit verschwinde, welches bei der brasilianischen Species nicht geschieht, also als ein gutes Unterscheidungszeichen betrachtet werden kann.

Dieser Vogel scheint über den größten Theil von Südamerica verbreitet, da ihn *Azara* südlich in *Paraguay* beobachtete. In Brasilien ist er einer der angenehmsten und gemeinsten Sänger. Er hat einen kurzen zippenden Lockton, und einen lauten, ziemlich kurzen Gesang, der der Stimme unseres Buchfinken (*Fringilla caelebs*) nicht ganz unähnlich. Man findet ihn überall, sowohl im Innern als an den Küsten in den Gebüsch, wo er besonders die letzteren durchkriecht. In den grossen geschlossenen Urwäldern ist er seltener, besonders gern hält er sich in den Pflanzungen und der Nähe der Fruchtbäume auf, deren Früchten, den Orangen, Bananen u. a., er eifrig nachstellt, wie alle kleinen Vögel.

Swainson hat diesen Vogel unter die *Tangaras* gesetzt, wo er mir aber nicht hinzugehören scheint. Ich hielt ihn anfänglich für die nordamericanische *Sylvia trichas*, wodurch sich dieser Irrthum an mehreren Stellen meiner Brasilianischen Reisebeschreibung befindet; was also dort unter obigem Namen erwähnt wird, ist der jetzt hier von mir beschriebene Vogel. In seiner *hist. naturelle des oiseaux de l'Amér. septentrionale* bildet *Vieillot* seine *Fauvette voilée* (*Sylvia velata*) unserem brasi-

lianischen Vogel ziemlich ähnlich ab, doch sagt er in der Beschreibung, der Rücken sey bläulich-grün. Swainson hat in dem dritten Bande seiner *zoological illustrations* eine ziemlich gute Abbildung der von mir jetzt beschriebenen Species, unter der Benennung *Tanagra canicapilla* gegeben.

2. *S. venusta*, Temm.

Der aschblau und gelbe Sänger.
S. Obertheile aschblau, auf dem Rücken ein olivengrüner Fleck; Zügel schwarz; Untertheile hochgelb, an der Brust dunkler; Spitzen der grossen Flügeldeckfedern weisslich.

Le Bec - en poignon à poitrine dorée d'Azara, Voy. Vol. III. pag. 256.

Bec - fin mignon, Temm. pl. col. 293. Fig. 1.
Sylvia plumbea, Swains. Zool. illustr. Vol. III. pl. 139.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Schnabel sehr zugespitzt, der Kiefferrand etwas eingezogen; Kinnwinkel ziemlich stumpf, befiedert; Augenlid befiedert; die Flügel falten bis über ein Dritttheil des Schwanzes hinaus, die dritte Feder scheint die längste; Schwanz ziemlich gleich, die äusseren Federn nur sehr wenig kürzer als die mittleren, alle Federn am

Ende kurz zugespitzt; Beine mässig schlank, Ferse mit sechs glatten Tafeln belegt; Verhältniss der Zehen wie an der vorhergehenden Art.

Färbung: Oberkiefer schwarzbraun oder glänzend schwarz, der untere gelbröthlich; Beine röthlich-fleischbraun; Zügel- und Nasenfedern schwarz, alle übrigen Obertheile glänzend aschblau, mit einem Schimmer von Indigo, besonders auf dem Kopfe, aber auf dem Ober Rücken ein grosser, dreieckiger olivengrüner Fleck; grosse Flügeldeckfedern mit weissen Spitzen, wodurch an diesem Theile ein Paar grosse weisse Flecke über einander entstehen; Schwungfedern bräunlich-schwarz, mit bläulichem Vorder- und weisslichem Hintersaume; hintere Schwungfedern mit weisslichem Spitzensaume; Schwanzfedern schwärzlich, die mittleren an beiden Seiten bläulich, die äusseren mit einem starken weissen Flecke an der inneren Fahne; alle Untertheile vom Kinn bis zum After hochbrennend gelb, die Brust orangebraun überlaufen; Steiss weiss.

Ausmessung: Länge 4" — Breite 5" 11"
— L. d. Schnabels $3\frac{3}{4}$ " — Br. d. Schn. $1\frac{1}{2}$ " —
Höhe d. Schn. $1\frac{1}{4}$ " — L. d. Flügels $2\frac{2}{3}$ " — L.
d. Schwanzes beinahe 1" 6" — Höhe d. Ferse

6½^{'''} — L. d. Mittelzehe 3½^{'''} — L. d. Hinterzehe 2½^{'''}. —

Weibchen: Von dem Männchen kaum zu unterscheiden, das Gelbe ist etwas blässer, die Obertheile sind weniger indigoblau schimmernd, also mehr aschblau, und etwas mit olivenfarbenen Federrändchen bezeichnet, der grüne Rückenfleck scheint größer.

Junge Vögel: Sie haben die Farben der alten, nur mehr matt und weniger schön und rein.

Dieser niedliche Sänger ist über Brasilien und Paraguay verbreitet, wo er in Gebüsch und Wäldern wohnt. Er kommt bei *Rio de Janeiro* vor, häufig in der Gegend von *Cabo Frio* und des See's *Marica*, und unter allen Brasilianischen Sängerarten ist mir diese überhaupt am häufigsten vorgekommen. Er ist ein sehr niedlicher Vogel, der einen kurzen artigen Gesang hören lässt. In der Lebensart gleicht er unseren Laubvögeln (*Sylvia sibillatrix* und *Fitis*), steigt behende und geschickt, wie die Meisen, an den Zweigen umher und pickt Insecten, ihre Eier und Puppen ab, dabei hört man häufig seine kleine kurze Lockstimme. Im dichten Gewebe hoher Pflanzen, besonders aus der *Syngenesia* und *Erdharina*, picken sie

an den Köpfen und steigen an den Stängeln auf und ab. Das kleine niedliche Nest steht in der Gabel eines Astes in einem dicken Strauche, es befanden sich zwei Junge darin, das Männchen singt in der Nähe. *Temminck* hat eine Abbildung dieser niedlichen Species gegeben, die im Allgemeinen sehr gut ist, nur müßte der olivenfarbene Fleck weiter unten liegen und die Orangerfarbe der Brust ist nicht angegeben. In der Beschreibung erwähnt Hr. *Temminck* nicht, daß *Azara* diesen Vogel zuerst bekannt machte. *Swainson* giebt eine gute Abbildung dieser Species, sagt aber dabei, daß er sie nie in Brasilien angetroffen habe, da sie doch in der von mir bereisten Gegend zu den gemeinsten Vögeln gehört.

3. *S. speciosa*.

Der blaue Sänger mit zimmtfarbenem Steiße.

S. Obertheile schön indigoblau, die unteren Theile dunkel weißlich-blau, zwischen den Schenkeln am weißesten; Steiße schön zimmtbraun.

Bec fin ou-roua, *Tam. pl. ocl. 293. Fig. 2.*

Beschreibung: Gestalt sehr zierlich, das ganze Gefieder höchst hart und glatt. Schnabel zugespitzt, die Temienränder eingezogen;

Nasenloch nach vorn rundlich glatt; Schwanz in der Mitte ein wenig ausgerandet; Ferse geglättet. —

Färbung: Iris dunkelbraun; Schnabel schön blaugrau, die Ränder weißlich, bei wahrscheinlich jüngeren Männchen ist dieser Theil oft horngraubraun; Rachen weißlich; Beine schön bleifarben; alle Obertheile schön glänzend indigoblau, alle unteren weißlich-blau oder bleifarben, an der Brust am dunkelsten, zwischen den Schenkeln am weißlichsten; Steiß schön röthlich-braun; Flügel und Schwanz schwärzlich mit blauen Rändern, Schwungfedern in ihrer Mitte mit einem rein weißen Queerstreifen, den man nur bei offenem Flügel bemerkt. —

Ausmessung: Länge 4" $3\frac{1}{2}$ " — Breite 6" 10" — L. d. Schnabels 4" — Höhe d. Ferse 6". —

Weibchen: Alle Obertheile weniger lebhaft und heller blau, der Steiß hingegen dunkler gefärbt als am Männchen; Unterleib mehr weißlich, und besonders an den Seiten blässer.

Ausmessung: Länge 4" 3". —

Dieser niedliche Vogel ist bei *Rio de Janeiro* nicht selten, wo wir ihn im Monat Juli in dichten Gesträuchen herumkriechen und nach

den Orangen und andern Früchten fliegen sahen. Später fanden wir dieses schöne Vögelchen im Sertong der Provinz *Bahia* in der Gegend von *Angicos*, wo es nach Insecten und Sämereien in den Gesträuchen umherkroch und in den höhern Bäumen flog.

Temminck giebt, nach dem von mir ihm mitgetheilten Exemplare, eine ziemlich gute Abbildung dieser Species, wo aber die Beine und der Schnabel unrichtig colorirt sind.

4. *S. leucogastra*.

Der aschblaue Sänger mit schwarzem Scheitel und Schwanze.

S. Scheitel und mittlere Schwanzfedern schwarz; äußere Schwanzfedern aufsen und an der Spitze weiß; Rücken aschgrau; Untertheile weiß.

Le figuier à tête noire de Cayenne, Buff., Sonn. Vol., 16. pag. 65.

Buff. pl. enl. No. 704. Fig. 1.

Le figuier à tête noire de Cayenne, Vieill. tabl. encrel. et meth. pag. 428.

Beschreibung des männlichen Vogels
Schnabel schlank, gerade, von der Mitte an ein wenig zusammengedrückt, sanft gewölbt, die Dillenkante sanft aufsteigend; Kuppe mit einem kleinen Zähnnchen oder Ausschnitte, To-

innenrand etwas eingezogen; Firste scharfkantig; Kinnwinkel etwa bis zu einem Drittheile des Schnabels vortretend, mälsig zugespitzt, beinahe gänzlich befiedert; Augenlid ein wenig nackt; die Flügel etwas über die Schwanzwurzel hinaus fallend, abgerundet, die vierte Fed der sohekt die längste; Schwanz ziemlich lang, stark abgestuft, die äusseren Federn scheinen um etwa sechs Linien kürzer als die mittleren; Beine hoch und schlank, Ferse mit sechs bis sieben glatten Tafeln belegt; Zehen sehr zart und zierlich. —

Färbung: Iris graubraun; Ferse bleifarben, die Zehen etwas schwärzlich; Schnabel schwarz; Scheitel vom Schnabel bis in den Nacken glänzend schwarz, stahlblau schimmernd; vier mittlere Schwanzfedern schwarz, die nächst folgenden schwarz mit weisser Spitze, die beiden äusseren an jeder Seite weiss, aber die vorletzte an der Wurzel der inneren Fahne schwarz; Schwungfedern schwarzbräunlich mit feinem, aschbläulichem Vordersaume; Rücken aschblau oder bläulich-achgrau; alle unteren Theile weiss, die Seiten der Brust aschbläulich überlaufen.

Ausmessung: Länge $4'' 7\frac{2}{3}'''$ — Breite $6'' 2'''$ — L. d. Schnabels $4\frac{1}{2}'''$ — Br. d. Schn.

$1\frac{1}{2}''$ — Höhe d. Schn. $1''$ — L. d. Flügels $1''$
 $1\frac{1}{2}''$ — L. d. Schwanzes $2''$ — Höhe d. Ferses
 $7''$ — L. d. Mittelzehe $3\frac{1}{2}''$ — L. d. Hinter-
zehe $2\frac{1}{2}''$. —

Weibchen und junge männliche Vögel:

Sie haben nichts Schwarzes auf dem Scheitel,
aber hinter dem Auge liegt eine unbedeutliche,
schwätzliche Stelle; die Flügel sind blässer, nur
dunkelbraun; und die mittleren und hinteren
Schwungfedern stark weißlich gerandet; Unter-
theile nicht so rein weiß. Ein Weibchen war
noch um eine halbe Linie länger als das oben
beschriebene Männchen; daher scheinen beide
Geschlechter in der Größe nicht bedeutend ver-
schieden zu seyn.

Diese Art ist ein munteres Vögelchen, das
den ziemlich langen Schwanz meistens etwas
hochträgt. Es durchkriecht die Gebüsche nach
Insecten, wie die übrigen Arten, und hat ein
leises, kurzes Lockton. Ich habe es besonders
im Sertong der Provinz *Bahia* beobachtet, und
da es *Buffon* aus *Cayenne* beschreibt, so wird
es über einen großen Theil von Südamerica
verbreitet seyn. *Buffon* hat diesen Vogel (*pl.*
enl. No. 704. Fig. 1.) sehr gut abgebildet, und
zwar den männlichen. Er bringt diese Species
als Varietät zu seinem *Figuier gris de fer* (*Sylvia*

caerulea, Lath.), allein Viellot ist auch der Meinung, daß beide Vögel verschieden seyen.

5. *S. caerulescens*.

Der bläuliche Sänger.

S. Obertheile bläulich-grau, die unteren gelblich-weiß oder fahl röthlich-weiß.

? *Le bec-en-poinçon bleu et blanc d'Azara, Vol. III. pag. 257.*

? *Sylvia bicolor, Vieill.*

Beschreibung des männlichen Vogels: Schnabel stark, ziemlich breit, zugespitzt; Kinnwinkel befiedert, an der Spitze sparsam, Firste ziemlich scharf erhaben; Augenlider ein wenig nackt; Flügel etwas über ein Drittheil des Schwanzes hinaus fallend, die vierte Schwungfeder die längste; Schwanz gleich, mäsig lang; Ferse mit sechs bis sieben glatten Tafeln belegt; innere Zehetein wenig kürzer als die äußere; Hinternagel stark und gewölbt.

Färbung: Oberkiefer hornbraun, der untere weißlich; Iris lebhaft gelbbraun; Beine fleischbräunlich; alle oberen Theile stehen zwischen himmelblau und bleifarben in der Mitte, ziehen aber stark in's Himmelblau; Schwungfedern dunkel graubraun, an der äußeren Fah-

ne bläulich gerandet; mittlere Schwanzfedern bläulich, die anderen nur außen auf diese Art gerandet, übrigen wie die Schwungfedern; untere Theile schmutzig-weiß oder gelblich-weiß, am Bauche mehr gelblich, an Brust und Seiten des Leibes grau angefliegen; Seiten des Kopfes und Halses schmutzig aschgrau. —

Ausmessung: Länge 5" 3''' — Breite 6" 10''' — L. d. Schnabels 4½''' — Höhe d. Schn. 1½''' — Br. d. Schn. 1½''' — L. d. Flügels 2" 3''' — L. d. Schwanzes 1½''' — Höhe d. Ferse 7''' — L. d. Mittelzehe 3¼''' — L. d. Hinterzehe 2½''' — L. d. Mittelnagels 1½''' — L. d. Hinternagels 2''' —

Weibchen: Nicht bedeutend verschieden, die Obertheile fallen weniger in's Blaue.

Dieser kleine Vogel hat die Gestalt unserer Sänger und kriecht auch wie diese in den Gebüschchen umher. Am *Mucuri* fand ich ihn in den an Insecten sehr reichen niederen Mangesümpfen, die aus *Conocarpus* und *Avicennia* bestehen, wo er eine kurze, kleine Lockstimme hören liefs. Er hat viel Aehnlichkeit mit *Azara's bec-en-poinçon bleu et blanc* (Vol. III. pag. 257) oder *Vieillot's Sylvia bicolor*, doch bin ich von der Identität beider nicht vollkommen überzeugt.

6. *S. poicilotis*.

D e r r o s t s c h e i t l i c h e S ä n g e r .

S. Obertheile fahl olivengrünlich, Oberkopf rothbraun; Untertheile schmutzig weißgrau; Brust und Bauch schmutzig röthlich oder gelblich angeflogen.

? Hylophilus poicilotis, Temm. pl. col. 173. Fig. 1.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel zugespitzt, an der Wurzel stark, mit einem kleinen Ausschnitte hinter der Spitze; Tomienrand nur wenig eingezogen; Kinnwinkel stark, ziemlich leicht befiedert, die Federn etwas vorwärts gelegt und in schwärzliche Borstspitzen endigend; am Mundwinkel stehen einige Bartborsten; Augenlid mit kleinen Federchen besetzt; Flügel etwas über die Schwanzwurzel hinaus fallend, die zweite Feder scheint die längste zu seyn; Schwanz nur sehr wenig abgerundet, die äußeren Federn ein wenig kürzer; Beine mälsig hoch, stark, Ferse mit etwa fünf grofsen, glatten Tafeln belegt, ihre Sohle gestieft und etwas zusammengedrückt; äußere Zehe länger als die innere; Hinternagel stark.

Färbung: Iris graubraun; Schnabel hell horngraubraun; Beine blaß bleifarben; Scheitel hell zimmt- oder rothbraun, von der Nase bis in den Nacken; Oberhals und Seiten desselben

hell graubräunlich; Kinn, Kehle, Unterhals und Brust eben so, aber blässer, oft weißlich, besonders die Kehle; Bauch röthlich, oder schmutzig graugelblich überlaufen; über dem oberen Augenlide stehen einige weißliche Federn; alle Obertheile hellfahl olivengrün; innere Fahne der Schwungfedern so wie des Schwanzes dunkel graubraun; After und *crissum* blaß gelbgrünlich. —

Ausmessung: Länge 4" 11''' — Breite 6" 6''' — L. d. Schnabels 4 $\frac{2}{3}$ ''' — Br. d. Schn. 1 $\frac{1}{2}$ ''' — Höhe d. Schn. 1 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Flügels 2" 1 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Schwanzes 1" 9''' — Höhe der Ferse 8 $\frac{1}{5}$ ''' — L. d. Mittelzehe 3 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Hinterzehe 2 $\frac{4}{5}$ ''' — L. d. Mittelnagels 1 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinternagels 2''' —

Jüngeres Männchen: Wie das vorhin beschriebene, allein die oberen Theile weniger lebhaft grün, die unteren mehr weißlich.

Weibchen: Gröfse und Farbe genau von dem Männchen, jedoch weniger lebhaft.

Dieser niedliche Vogel lebt im inneren Brasilien, wo ich ihn im Sertong der Provinzen *Bahia* und *Minas* fand. Er durchkriecht die Gebüsche. — Sein Gesang muß unbedeutend seyn.

Herr *Temminck* hat auf seiner 173sten Tafel Figur 2. wahrscheinlich diese Species abgebildet, da die Aehnlichkeit mit meinen männlichen Exemplaren sehr groß ist; allein in diesem Falle scheint *Temminck's* Vogel vielleicht ein sehr altes, und meine Exemplare jünger gewesen zu seyn; ich besitze sie von verschiedenen Altern.

7. *S. thoracica*.

Der grünscheitliche S ä n g e r

S. Ober- und Seitenhals aschgrau; Kehle weißlich; Obertheile mit dem Scheitel olivengrün; Brust gelb; Bauch und Steiß weißlich.

Hylophilus thoracicus, Temm. pl. col. 173. Fig. 1.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel stark, etwas gewölbt, hinter der Kuppe mit einem sehr seichten Ausschnitte; Kinnwinkel breit und ziemlich stumpf, befiedert und die etwas vorwärts gerichteten Federchen in kleine Borstspitzen endigend; Nase mit vorwärtsstrebenden Federn bedeckt; die Flügel erreichen ein Dritttheil des Schwanzes, die vierte Feder ist die längste, die erste ist kurz; Schwanz nur wenig abgestuft, die äußeren Federn um einige Linien kürzer; Ferse mit sieben bis acht

glatten Tafeln belegt; äußere Zehen, wie an der vorhergehenden Art, an der Wurzel vereint, die äußerste etwas länger als die innerste.

Färbung: Schnabel und Füße bleifarben; Iris bläsgelblich; Stirn gelblich-grün; Scheitel zeisigrün; Kehle weißlich; Hinterkopf, Ober- und Seitenhals aschgrau, übrige Obertheile zeisigrün; Backen grünlich; Unterhals und Brust citrongelb; Bauch und Steiß weiß; Schwungfedern dunkel graubraun mit grünem Vordersaume; hinterer Fahnenrand gelblich; Schwanzfedern grünlich, an der inneren Fahne ein wenig graubräunlich überlaufen.

Ausmessung: Länge 5" $7\frac{1}{2}$ " — Länge d. Schnabels $4\frac{1}{3}$ " — Br. d. Schn. $1\frac{1}{2}$ " — Höhe d. Schn. $1\frac{2}{5}$ " — L. d. Flügels 2" 3" — L. d. Schwanzes etwa $1\frac{4}{5}$ " — Höhe der Ferse $7\frac{1}{4}$ " — L. d. Mittelzehe 4" — L. d. äußeren Z. $3\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinterzehe 3" — L. d. Mittelnagels 2" — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{3}$ ". —

Weibchen: Vom Männchen nicht bedeutend verschieden, aber weniger rein und lebhaft gefärbt; Beine bräunlich-bleifarben; Schnabel graubraun.

Dieser Sänger kommt schon südlich am Flusse *Parahyba* vor, wo ich ihn zuerst erhielt, er wird aber gewiß auch noch weiter

südlich gefunden. Ueber seine Lebensart kann ich nichts weiter hinzufügen, als was auch schon von den vorhergehenden Sängerarten gesagt wurde.

Herr *Temminck* hat diese Species auf seiner 178sten Tafel Figur 1. abgebildet.

8. *S. flavola*.

S. Weibchen: Obertheile hell graubraun, am Rücken röthlich-braun; Unterrücken schön gelbröthlich; Flügel und Schwanz roströthlich-braun; Kehle weißlich; alle Untertheile gelbröthlich, nach hinten hinab immer dunkler und lebhafter werdend.

Beschreibung des weiblichen Vogels:
Schnabel schlank, fein zugespitzt, pfriemförmig, hinter der Kuppe ein kleiner Ausschnitt; keine Bartborsten; Zunge schmal, an der Spitze ein wenig gespalten; Flügel abgerundet, sie reichen etwas über die Schwanzwurzel hinaus, die fünfte und sechste Feder sind die längsten; Schwanz etwas abgestuft, die mittleren Federn etwas länger als die äußeren, sie sind sämmtlich ein wenig zugespitzt; Beine glatt gefäfelt.

Färbung: Iris graubraun; Oberkiefer dunkel horngraubraun, Unterkiefer weißlich; Ra-

chen orangegelb; Beine lebhaft himmelbläulich-bleifarben; alle Obertheile hell graubraun, auf dem Rücken schon in's Röthlich-braune übergehend, auf dem Unterrücken schon gelbröthlich; Flügel und Schwanz roströthlich-braun, die inneren Fahnen der Schwungfedern graubraun; Kehle weißlich; alle Untertheile gelbröthlich, nach hinten hinab immer dunkler und lebhafter werdend; innere Flügeldeckfedern weißlich-gelb. —

Ausmessung: Länge 5" $8\frac{1}{2}$ " — Breite 5" $9\frac{1}{2}$ " — L. d. Schnabels $4\frac{5}{8}$ " — Höhe d. freien Ferse $6\frac{1}{3}$ ". —

Ein anderer, wahrscheinlich nicht ganz ausgefederter weiblicher Vogel.

Ausmessung: Länge 4" 7" — Breite 5" $9\frac{1}{2}$ " — L. d. Schnabels $4\frac{1}{3}$ " — Höhe d. Ferse $6\frac{1}{3}$ ". —

Dieser Vogel ist mir im weiblichen Geschlechte einigemal vorgekommen, ich habe aber das Männchen nicht erhalten. Meine Jäger erlegten diese Vögel im Sertong der Provinz Bahía, und zwar in den Wäldern in der Nähe von Os Porcos unweit des Arrayals da Conquista.

Gen. 22. *Hylophilus*, Temm.

Orangenvogel.

Es wird mir hoffentlich erlaubt seyn, dem von Temminck aufgestellten Geschlecht *Hylophilus* eine andere Deutung zu geben, da ich dasselbe von seinem Gründer zu weit ausgedehnt finde. Herr Temminck rechnet nämlich hierher mehrere europäische Sänger (*Sylvia*), wogegen ich vorschlage, dasselbe nur auf die americanischen und vielleicht einige andere sängerartige Vögel mit höherem, dickerem Schnabel anzuwenden, unter welchen *Sylvia Guirā* und die von Temminck unter der Benennung *Tanagra speculifera* zu den Tangara's gesetzte *Sylvia melanoxantha* des Berliner Museums, besonders bekannt sind. Ich characterisire diese Vögel auf folgende Art:

Schnabel: stark, kürzer als der Kopf, ziemlich gerade, an der Wurzel etwas ausgebreitet, etwas breiter oder so breit als hoch, am Vordertheile zusammengedrückt, die Tomien einbezogen, die Firste kantig, nach der Kuppe sanft hinab gewölbt, ein kleiner Ausschnitt hinter derselben, ein anderer Ausschnitt befindet sich oft vor der Wurzel des Oberkieferrandes, wodurch der letztere in der Mitte gewöhnlich einen vortretenden Bogen zeigt; **Nasenlöcher**

länglich, vor der Schnabelwurzel; der Unterkiefer meist höher und breiter als der obere.

Zunge: an der Spitze ein wenig getheilt, oder borstig gefrants't.

Flügel: stark und ziemlich lang, erreichen ein Drittheil, die Mitte oder zwei Drittheile der Schwanzlänge.

Beine: mäßig hoch; äußere Zehen an der Wurzel nur sehr wenig vereint.

Da die eigentlichen americanischen Sänger (*Pitpit*, *Buff*.) noch sehr große Uebereinstimmung mit unseren europäischen (*Sylvia*) zeigen, so schien es mir zweckmäßig, sie bei denselben zu belassen, hingegen die von mir hier unter *Hylophilus* vereinten Vögel von ihnen zu trennen, da sie einen deutlichen Uebergang zu den Tangara's machen. Diese werden also mit Recht von den Sängern (*Sylvia*) getrennt, obgleich ihre Lebensart und Manieren noch vollkommen denen der Sänger gleichen, und weniger Uebereinstimmung mit jenen der Tangara's zeigen. Da die von mir unter *Hylophilus* vereinten Vögel die eifrigsten Verfolger der reifenden Baumfrüchte sind, so habe ich den ihnen beigelegten deutschen Namen von ihrer Lieblingsfrucht entlehnt.

A. Mit kurzen, nach der Spitze stark hinab gewölbtem Schnabel.

1. *H. cinerascens.*

Der dickschnäbelige Orangenvogel.

O. Schnabel kurz, breit, gewölbt; Obertheile grünlich-olivengrau, Untertheile weißgrau; Deckfedern graubraun mit fahl grauröthlichen Rändern.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel breit, hoch, gewölbt, beinahe wie an *Muscicapa*, hinter der Spitze zusammengedrückt und mit einem kleinen Ausschnitte versehen; Dillenkante aufsteigend; Kinnwinkel groß, ziemlich abgerundet, mit borstig endenden, etwas vorwärts strebenden Federn bedeckt; keine Bartborsten am Schnabel; Zunge kürzer als der Schnabel, vorn ein wenig gespalten; Flügel ziemlich lang, erreichen beinahe die Mitte des Schwanzes, ihre Schwungfedern waren nicht alle ausgewachsen, die dritte schien die längste zu seyn; Schwanz mälsig lang, ziemlich gleich. — Ferse mit etwa sieben Tafeln belegt, innere Zehe länger als die äußere, die beiden äußeren Zehen an der Wurzel scheinbar ein wenig vereint. —

Färbung: Kopf und Oberhals aschgrau, bräunlich überlaufen; Rücken graubräunlich,

olivengrünlich überlaufen; Flügel dunkelgrünbraun, die Deckfedern fahl rüthlich-braun stark gerandet; Schwungfedern graubraun, vorn mit grünlichem Rande, hinterer Rand weißlich; innere Flügeldeckfedern weißlich-graugrün, am Flügelrande gelblich; Kinn, Kehle und Brust blaßweißgrau; Bauch und übrige Untertheile weißlich, gelblich überlaufen; Schwanz fahl hell graubraun, außen etwas grünlich gerandet; Beine schwärzlich-bleifarben; Schnabel oben über bräunlich-schwarz, unten weißlich; Iris graubraun.

Ausmessung: Länge 4" 1''' — Breite 6" 6''' — L. d. Schnabels 2½''' — Breite d. Schn. 1½''' — Höhe d. Schn. 1½''' — L. d. Flügels 2" ¼''' — L. d. Schwanzes 1" 6''' — Höhe d. Ferse 5½''' — L. d. Mittelzehe 3''' — L. d. Hinterzehe 2½''' — L. d. Mittelnagels 1½''' — L. d. Hinternagels 1¼''' —

Dieser kleine Vogel weicht in der Bildung seines Schnabels und der Zehen ein wenig von den Sängern und Orangenvögeln ab, doch habe ich ihn nicht von den letzteren trennen wollen, um nicht noch mehrere neue Geschlechter zu bilden. Ich erhielt ein einziges Exemplar im Walde zu *Barra de Jucú*, unweit des Flusses *Espirito Santo*. —

B. Orangenvogel mit mehr verlängertem, an der Spitze weniger gewölbtem Schnabel, dessen Unterkiefer höher ist, als der obere.

2. H. ruficeps.

Der rostköpfige Orangenvogel.

O. Kopf schön zimmtbraun; Brust und Unterrücken orangefarben; an der Seite des Halses ein hochgelber Fleck, eben so die unteren Schwanzdeckfedern; Obertheile olivengrün; Schwungfedern dunkel graubraun mit grünen Rändern; Mitte der Untertheile hell gelb, Seiten grau überlaufen.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt schlank und angenehm, etwas der unseres Stieglitzes (*Fringilla carduelis*) ähnlich. Schnabel an der Wurzel ziemlich breit, mälsig schlank, zugespitzt, die etwas kantige Firste des Oberkiefers nach der Kuppe sanft hinab gewölbt, über die untere ein wenig vortretend; Unterkiefer höher und breiter als der obere; Tomien des Oberkiefers mit einem leichten Ausschnitte an der Wurzel, und einem hinter der Kuppe, wodurch in der Mitte des Kieferrandes ein vortretender Winkel entsteht; Nasenlöcher vor den Nasenfedern, länglich, von den etwas aufgerichteten Federn zum Theile bedeckt; Kinnwinkel ziemlich abgerundet, mehr

als ein Dritttheil der Schnabellänge, stark befiedert, seine Federn etwas in Borsten endigend und ein wenig aufgerichtet; Zunge schmal und zugespitzt, an der Spitze in mehrere kleine Fransen oder Fasern getheilt; Augenlid ziemlich nackt, mit einigen Wimpern besetzt; Flügel ziemlich stark, zugespitzt, reichen über ein Dritttheil des Schwanzes hinaus, die dritte Feder ist die längste; Schwanz ziemlich stark, aus zwölf Federn zusammengesetzt, wovon die mittleren ein wenig kürzer als die äußeren, woher ein kleiner Ausschnitt entsteht; Beine mäßig hoch, Ferse mit fünf bis sechs glatten Tafeln belegt; die innerste Vorderzehe ist die kürzeste, die mittelste die längste; Hinterzehe etwas kürzer als die innere; Hinternagel stark, gewölbt, größer als die übrigen.

Färbung: Iris braun; Rachen orangengelb; Oberkiefer dunkel horngraubraun, sein Rand, so wie der ganze Unterkiefer, lebhaft orangengelb; nacktes Augenlid dunkel aschgrau, die Wimpern zimmtbraun; Beine bleifarben; der ganze Kopf, Nacken, Ohrgegend, Kinn, Kehle schön zimmtbraun, an Kinn und Kehle mehr in's Orangenfarbene ziehend, und diese Farbe geht nach der Brust hin immer mehr in Orangenfarbe über und färbt diesen Theil gänzlich;

oft ist der Kopf abgesetzt zimmtbraun, Unterhals und Brust, ohne andere Beimischung, lebhaft orangefarben; unter dem Ohre steht, an der Seite des Halses, ein hochgelber Fleck, der oft die ganze Seite des Halses bedeckt; alle Obertheile des Vogels sind olivengrün, der Unterrücken lebhaft orangefarben; Schwung- und große Flügeldeckfedern schwärzlich-graubraun, mit breitem, olivengrünem Vordersaume, am hinteren Rande der inneren Fahne etwas weiß; eben so sind die Schwanzfedern gefärbt, allein die mittleren sind beinahe gänzlich olivengrün, und die äußeren Ränder der übrigen sind gelblichgrün; innere Flügeldeckfedern weiß, am vorderen Flügelrande gelb; Steiß hochgelb; Unterbrust und Mitte des ganzen Unterleibes bis zum Steiße blaß schwefelgelb, Seiten des Leibes weißlich-ashgrau, indem die dunkelgrauen Wurzeln der Federn mit den weißlichen Spitzen diese Farbe hervorbringen.

Ausmessung: Länge 5" 10''' — Breite 7" 7''' — Länge d. Schnabels $4\frac{1}{2}$ ''' — Br. d. Schn. $1\frac{3}{4}$ ''' — Höhe d. Schn. $1\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Flügels 2" 5''' — L. d. Schwanzes etwa 1" 10''' — Höhe d. Ferse, so weit sie von Federn entblößt, $5\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelzehe $3\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äußeren Z. $2\frac{3}{4}$ ''' — L. d. inneren Z. $2\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Hinter-

zehe 2''' — L. d. Mittelnagels etwa $4\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinternagels $1\frac{3}{4}$ ''' . —

Jüngerer Männchen: Von dem früher beschriebenen nur durch geringere Nettigkeit und Leben der Farben, so wie etwas geringere GröÙe unterschieden.

Ausmessung: Länge 4" 10''' — Breite 7" 4''' . —

Dieser schöne Vogel wird in den inneren Waldungen von Brasilien gefunden. Ich beobachtete ihn im Sertong der Provinz *Bahia* und auch südlich in der Gegend von *Cabo Frio*, er scheint daher über den größten Theil von Brasilien verbreitet zu seyn. Seine Bewegungen sind leicht und schnell, wie bei unseren Sängern. Er hüpfet und fliegt von einem Aste zu dem andern, und man sieht ihn beständig paarweise an den Früchten gewisser, hoher Bäume, deren gelben Saamen er verzehrte, und welchen man auch in ihren Mägen fand; ich vermuthe indessen, daß sie auch Insecten fressen, deren Spuren ich übrigens nicht bei ihnen fand. Ihr Lockton ist eine kleine kurze, leise Stimme, einen weiteren Gesang habe ich von ihnen nicht gehört. — Diese Species hat sehr viel Aehnlichkeit mit der nachfolgenden, allein es fehlt ihr die schwarze Zeichnung am

Kinn, weshalb ich sie für von derselben verschieden ansehe.

3. *H. Guira*.

Der Orangenvogel mit schwarzem Barte.

O. Obertheile olivengrün; ein Streif über dem Auge und die unteren Schwanzdeckfedern gelb; Seiten des Kopfs und Kehle schwarz; Vorderhals, Brust und Unterhals orangefarben; innere Flügeldeckfedern weifs.

Guira-gaçu-beraba, Marcgr. pag. 212.

Motacilla Guira, Linn.

Tangara à gorge noire, Buff. pl. enl. No. 720. Fig. 1.

Le Bec-en-poinçon jaune à barbe noire d'Azara, Vol.

III. pag. 247.

Beschreibung eines jungen männlichen Vogels: Gestalt wie an der vorhergehenden Art; Schnabel etwas Weniges mehr schlank, übrigens eben so gebildet, die Tomien stark eingezogen; Kinnwinkel wie an No. 2., seine Federn in Borsten endend, welche vorwärts streben; der Schwanz fehlte gänzlich; Flügel wie an *ruficeps*, die dritte Feder die längste.

Färbung: Alle oberen Theile olivengrün; Schwung- und grössere Flügeldeckfedern schwärzlich-graubraun, mit Einfassungen von der Rückenfarbe, an den ersteren ein wenig mehr gelblich-

grün; innere Flügeldeckfedern weiß, nahe am Flügelrande gelb; Seiten des Halses, so wie ein undeutlicher Streifen vom Schnabel über dem Auge hin hochgelb; an der einen Seite des Kopfes befindet sich am Unterkiefer unter dem Ohre schon ein großer schwarzer Fleck; Kinn, Kehle und Unterhals blaß gelb, grünlich-grau gemischt; Brust hell gelb, grünlich-grau gemischt, allein es brechen lebhaft orangefarbene Federn hervor; Unterrücken lebhaft orangefarben; Mitte des Bauch so wie Aftergegend und Steiß hell gelb. —

Ausmessung: Länge ohne den Schwanz ungefähr 3" 6''' — L. d. Schnabels 4''' — Höhe d. Schn. $1\frac{1}{2}$ ''' — Br. d. Schn. $1\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Flügels 2" 4''' — Höhe d. Ferse $5\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelzehe $3\frac{2}{3}$ ''' — L. d. äußeren Z. $2\frac{5}{8}$ ''' — L. d. inneren Z. $2\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinterzehe 2''' — L. d. Mittelnagels $1\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinternagels 2''' —

Dieser Vogel ist mir nur einmal, und zwar, wie hier beschrieben, als männlich und noch nicht völlig ausgefedert, in die Hände gefallen. Er ist unbedingt der junge Vogel von *Azara's Bec-en-poinçon à barbe noire*, welches der schon erscheinende schwarze Fleck am Kinne beweist, und diesen halte ich ohne Bedenken

für *Marcgrave's Guira guaçú-beraba*. Lebensart und Manieren sind wie an der vorhin beschriebenen Species.

4. *H. caeruleus*.

Der bläuliche Orangenvogel.

O. Obertheile bleifarben-himmelblau; Schwungfedern schwarz, mit himmelblauer Vorderfahne; vordere kleine Flügeldeckfedern himmelblau; mittlere Schwanzfedern bläulich, die übrigen an der inneren Fahne schwarzbräunlich mit feinem weißem Saume an der inneren Fahne; Untertheile schmutzigweiß; Kehle fahl röthlich-gelb, die Seiten fahl bräunlich-grau überlaufen.

? Le Bec-en-poinçon bleu et blanc d'Azara, *Voyag.*
Vol. III. pag. 257.

Beschreibung eines weiblichen Vogels nach einem ausgestopften Exemplare: Schnabel mälsig groß, stark zusammengedrückt, die Tormen etwas eingezogen; die kantige Firste ziemlich stark nach der Kuppe hinab gewölbt, ein höchst kleines Zähnchen hinter der letzteren; Nasenloch rundlich vor der Wurzel des Schnabels, die Federn treten bis zu demselben vor; Kinnwinkel kurz, etwa ein Dritttheil der Schnabellänge, mälsig zugespitzt, leicht mit sehr zer-schlissenen Federn bedeckt; Dille sehr sanft

aufsteigend, gegen die Spitze hin kantig; Bartborsten über dem Mundwinkel schwarz und ziemlich kurz; die Flügel sind ziemlich lang, reichen über die Mitte des kurzen Schwanzes hinaus, die zweite Schwungfeder ist die längste, die erste und dritte geben ihr an Länge wenig nach. — Schwanz kurz und schwach, in der Mitte kaum merklich ausgerandet; Beine mälsig hoch, eher ziemlich kurz zu nennen; Ferse mit fünf glatten Tafeln belegt, äussere Zehen an der Wurzel ein wenig vereint, die äusserste ein wenig länger als die innerste; Hinternagel stärker und mehr gewölbt als die übrigen.

Färbung: Iris königsgelb; Beine gelblich; Oberkiefer schwärzlich-hornbraun, der untere weislich; alle Obertheile des Vogels sind himmelblau, stark in's Bleifarbene ziehend, auf den Deckfedern der Flügel schön himmelblau, am Unterrücken und im Nacken etwas blässer; mittlere Flügeldeckfedern an ihrer Vorderfahne mit einem bläulich-weißen Rande, wodurch ein solcher Querstreifen auf diesem Theile entsteht, die vorderen Flügeldeckfedern und der Flügelrand schwarz; Schwungfedern bräunlich-schwarz, die vorderen und mittleren mit himmelblauem Vordersaume und weislichem Hin-

terrande der hinteren Fahne, hintere Schwungfedern schwarz, mit blaugrauer Vorderfahne, einige von ihnen mit einem weißlichen Vordersaume; innere Flügeldeckfedern weiß; mittlere Schwanzfedern bläulich, die übrigen schwärzlich mit bläulichem Außenrande, die äußeren an der Spitze der inneren Fahne mit einem weißlichen Rande; alle Untertheile sind weißlich, an der Kehle und an dem Unterhalse bis zur Brust gelbröthlich überlaufen, am Bauche graugelblich angeflogen. —

Ausmessung *): Länge 5" 2''' — Breite 8" 4''' — Länge des Schnabels 4 $\frac{7}{8}$ ''' — Höhe d. Schn. 2 $\frac{1}{8}$ ''' — Br. d. Schn. 2''' — L. d. Flügels 2" 6 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Schwanzes 1" 7 $\frac{1}{2}$ ''' — Höhe d. Ferse 7 $\frac{7}{8}$ ''' — L. d. Mittelzehe 4 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. äußeren Z. 8 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. inneren Z. 3 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Hinterzehe 2 $\frac{4}{5}$ ''' — L. d. Mittelnagels 2''' — L. d. Hinternagels 2''' —

Von diesem Vogel besitze ich nur das weibliche Geschlecht aus der Gegend von *Bahid*. Er scheint mir zu *Azara's Bec-en-poinçon bleu et blanc* zu gehören.

*) Die Maasse sind sämmtlich an dem frischen Vogel genommen.

5. *H. cyanoleucus*.

Der bläuliche Orangenvogel mit schwarzem Scheitel.

O. Scheitel, Seiten des Kopfs und ein Streif am Halse hinab glänzend schwarz; eben so die oberen kleinen Flügeldeckfedern; Obertheile indigoblau, hier und da in's Bleifarbene ziehend; Untertheile weifs. —

Tanagra pileata, Linn., Gmel., Lath.

La corbeille noire, Buff. (pl. enl. No. 720.), Desmarest.

Le bec-en-peignon bleu et blanc d'Azara, Voy. Vol. III. pag. 251.

Sylvia cyanoleuca, Mus. Berol.

Beschreibung nach einem ausgestopften et was beschädigten Exemplare: Schnabel mälsig grofs und stark, ziemlich schlank, auf der etwas rundlich kantigen Firste sanft gewölbt, mit nur höchst kleinem Ausschnitte vor der Kuppe, ziemlich breit an der Wurzel, dann zusammengedrückt; Nasenloch rundlich; klein, unmittelbar vor den Nasenfedern; Dille nur wenig kantig, sehr sanft aufsteigend; Kinnwinkel etwa ein Drittheil der Schnabellänge, mälsig abgerundet, leicht befiedert; sehr kurze schwarze Bartborsten am Mundwinkel; Flügel lang und stark, erreichen die Mitte des Schwanzes, die zweite Feder scheint die längste; der Schwanz und die Flügel waren an dem Exemplare sehr

beschädigt; der erstere scheint in der Mitte etwas ausgerandet zu seyn; Beine mäßig hoch, oder etwas kurz, Ferse mit vier bis fünf Tafeln belegt. —

Färbung: Scheitel und Ohrgegend, so wie ein Streifen längs der Seite des Halses hinab, glänzend schwarz, eben so die kleinen oberen Flügeldeckfedern an der Spitze des *humerus*, und ein Fleck an der Seite der Brust; alle obere Theile bleifarben-indigoblau, auf dem größten Theile der Flügeldeckfedern lebhaft und dunkler indigoblau; Schwung- und Schwanzfedern schwärzlich mit blauen Rändern; von der Nase zieht nach dem Auge ein bläulich-weißer Streifen; Kinn, Kehle und Brust rein weiß, alle übrigen Untertheile weiß, hier und da schmutzig-graugelblich überlaufen.

Ausmessung einiger Theile: Länge 5" 4"
— Länge d. Schnabels 5"
— Höhe d. Schn. 2"
— Breite d. Schn. 2"
— L. d. Flügels etwa 2" 8"
— L. d. Schwanzes etwa 2" — Höhe d. Ferse 7"
— L. d. Mittelzehe 4½"
— L. d. äußeren Z. 3½"
— L. d. inneren Zehe 3½"
— L. d. Hinterzehe 3"
— L. d. Mittelnagels 1½"
— L. d. Hinternagels 1½". —

Ich erhielt in der Gegend von *Bahid* ein einziges durch den Schafs sehr beschädigtes Ex-

emplar dieses Vogels, und kann daher nur eine unvollkommene Beschreibung desselben geben, man kann indessen das Fehlende durch *Azara's* Nachrichten über diese Species ergänzen.

6. *H. melanozanthus*.

Der schwarz und gelbe Orangenvogel.

O. Kinn, Kehle, Unterrücken und Steifs hochgelb; Obertheile schwarz; Brust, Bauch und After weißlich; Weibchen an den Obertheilen olivenbraun, Untertheile hellgelb.

Tangara à miroir, Temm. pl. col. 36. Fig. 1. et 2.

Nemosia flavicollis, Vieill.

Sylvia melanozantha, Licht.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt schlank und zierlich. Schnabel gerade, schlank, gestreckt, von der Mitte an zusammengedrückt, Firste kantig erhaben, Tomien stark eingezogen, Kuppe kaum merkbar überragend, dahinter ein kleiner Zahn; Nasenloch länglich-eiförmig, an der Oberseite von der Nasenhaut überspannt, die Federn treten bis zu demselben vor; Kinnwinkel ein Dritteltheil der Unterkieferlänge, mäßig zugespitzt, befiedert, die Federn mit vorstrebenden Borstspitzen; kurze schwarze Bartborsten über der Na-

se und dem Mundwinkel; unteres Augenlid am Rande mit kleinen Federchen besetzt; Flügel stärker und länger als an den wahren Tanager's, ziemlich zugespitzt, die dritte Feder die längste, die erste nicht viel kürzer, die zweite noch weniger, die zweite, dritte und vierte haben einen saften Ausschnitt an der Vorderfahne; Schwanz stark, ziemlich gleich, geschlossen, in der Mitte oft etwas ausgerandet oder getheilt; Beine mäßig hoch, ziemlich schlank, Ferse mit Tafeln belegt, äussere Zehen an der Wurzel nur höchst wenig verzweigt; Hinternagel gross und stark.

Färbung: Iris graubraun; Oberkiefer hornbraun, der untere bläulichgelb; Beine bräunlichgrau; Kinn, Kehle und Unterhals bis gegen die Oberbrust, der Unterrücken und Steiss hochgummiguttgelb; alle Obertheile schwarz, zuweilen mit etwas Olivenglanz; Schwungfedern an der Wurzel weiss, wodurch auf dem Flügel ein gewöhnlich verdeckter, weisser Querstreifen entsteht; innere Flügeldeckfedern weiss, am Flügelrande schwärzlich; Schwanz bräunlich-schwarz, die beiden äusseren Federn an jeder Seite tragen an ihrer inneren Fahne, etwas über der Spitze, einen grossen weisslichen Fleck.

Messung: Länge 5" — L. d. Schnabels $5\frac{1}{2}$ " — Höhe d. Schn. $1\frac{1}{2}$ " — Breite d. Schn. $1\frac{1}{2}$ " — L. d. Flügels 3" — L. d. Schwanzes $2\frac{1}{2}$ " — Höhe d. Ferse $7\frac{1}{2}$ " — L. d. Mittelzehe $3\frac{1}{2}$ " — L. d. äußeren Z. $2\frac{1}{2}$ " — L. d. inneren Z. $2\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinterzehe $2\frac{1}{2}$ " — L. d. Mittelnagels $1\frac{1}{2}$ " — L. d. äußeren N. $1\frac{1}{2}$ " — L. d. inneren N. 1" — L. d. Hinternagels 2". —

Weibchen: Obertheile bräunlich-olivfarben, Deckfedern der Flügel grünlich-gelb gerandet; Schwung- und Schwanzfedern graubraun, grünlich-gelb gerandet; Untertheile limonengelb, unter dem Halse und an dessen Seiten am lebhaftesten; die weißen Schwanzflecke fehlen.

Dieser den Sängern sehr nahe verwandte Vogel hat mit diesen einerlei Lebensart und Manieren, auch scheint er von Beeren und Insecten zu leben. Er bewegt sich leicht und schnell in den Kronen der hohen Wald- und Buschbäume, durchsucht die Blätter und Zweige, und ist beständig in Bewegung. Gewöhnlich beobachtet man ihn, so wie andere verwandte Vögel, in kleinen Gesellschaften. Ich fand diese Art zuerst südlich in der Gegend von *Cabo Frio*, sie scheint über ganz Brasilien

verbreitet, wo Wald und Gebüsch gedeihen.
Eine Stimme habe ich zufällig von ihnen nicht
vernommen.

Picillo's Abbildung ist schlecht; sie ist
braun, statt schwarz, die *Temminckische* ist da-
her weit vorzuziehen.

Gen. 23. *Thryothorus*, Vieill.

Schlüpfer.

Es befindet sich in Brasilien eine kleine
Familie von Vögeln, deren Gestalt im Allge-
meinen mit der unseres Zaunkönigs (*Troglodytes*) sehr viel Aehnlichkeit zeigt, an welche
sie sich auch unmittelbar anschließt, dennoch
aber wieder in manchen Zügen von ersteren
abweicht. Ich nehme folgende Charactere für
diese Vögel an:

Schnabel: stark, beinahe so lang oder län-
ger als der Kopf, mehr hoch als breit, hinter
der Oberkieferkuppe mit einem kleinen Zahne
oder Ausschnitte versehen, pfriemförmig zuge-
spitzt, meist sanft gekrümmt, bei einigen ge-
rade, von seiner Mitte an mehr oder weniger
zusammengedrückt, die Kiefernänder oder To-
mien eingezogen.

Zunge: an der Spitze hornartig und gestutzt.

Flügel: kurz, kaum ein Drittel der Schwanzlänge erreichend, die erste Feder die kürzeste, die fünfte die längste.

Schwanz: mälsig lang, aus zwölf meist abgestuften Federn bestehend.

Beine: ziemlich lang; Ferse länger als die Mittelzehe; Mittelzehe die längste, die äußere Nebenzehe etwas länger als die innere, zwei äußere Zehen an der Wurzel vereint.

Diese Vögel sind lebhaft, munter, beweglich, haben im Allgemeinen die Lebensart unserer Sänger (*Sylvia*) und einige etwa die unseres Zaunkönigs (*Troglodytes*), doch kriechen sie nicht so stark und vollkommen wie dieser, ihr Schnäbel ist länger, stärker und meistens mehr gekrümmt. Sie leben zum Theil in den dichtesten, verborgensten Schlupfwinkeln, dunkel schattigen Gebüsch, und eine brasilianische Art in den Dächern der menschlichen Wohnungen, Gartenzäunen, in Städten und Dörfern, wo sie, wie *Troglodytes aedon* und unser europäischer Sperling, den Menschen nicht scheut, und in seiner Nähe ihren melodischen Gesang hören läßt. Diese Art macht einen vollkommenen Uebergang zu den Sängern, und

besonders zu *Troglodytes*. Die übrigen Arten verbergen sich in dem dichtesten, niederen Gebüsch, wo man sie nur sehr selten zu sehen bekommt, und wo sie eine aus sehr lauten Tönen bestehende Stimme hören lassen. Diese Arten bilden den Uebergang zu dem Geschlecht *Opetiarynchus* (Rufdrossel), sowohl durch den stärker zusammengedrückten, höheren Schnabel, als durch Lebensart und Manieren. Sie nähren sich sämmtlich von Insecten, und nur von einer der zu beschreibenden Arten habe ich den Nestbau kennen gelernt, der etwa mit dem unserer Sänger (*Sylvia*) übereinkommt. Sie sind nicht bloß durch ihre Bildung mit *Troglodytes* verwandt, sondern selbst durch die Farbe, indem bei mehreren von ihnen Flügel und Schwanz auf einem bräunlichen Grunde dunklere Querstreifen tragen. Hierhin gehören noch mehrere andere Vögel, z. B. *Troglodytes furvus*, *aedon* Vieill., *Sylvia caroliniana* Wilson, welche zum Theil auf der Gränze zwischen *Troglodytes* und *Thryothorus* stehen. Vieillot belegt diese Familie mit der Benennung Binsenspringer (*Tryothorus*), die aber nicht vollkommen auf die Lebensart der von mir beobachteten Vögel paßt, da ich sie nur in dichten Gebüsch und nicht am Wasser ge-

sehen habe. Man könnte sie eher *Hylama-
throus* (der im Busche ruft) nennen. —

1. *T. platensis.*

Der Hausschlüpfer.

8. Obertheile grau-braun, auf Rücken, Flügeln und
Schwanz überall sehr zierlich dunkler queer liniert;
Untertheile grauröthlich-fahl; Schwanz ein wenig
mehr röthlich-braun, mit starken schwarzbraunen
Queerlinien.

Basacaraguay d'Azara, Voy. Vol. III. pag. 323.

Sylvia platensis Auctor.

Rozelet de Buenos-Ayres, Buff. pl. enl. No. 750.

Fig 2.

Beschreibung des männlichen Vogels: In
Gestalt, Lebensart und Manieren viel Aehnlich-
keit mit unserem Zaunkönig (*Troglodytes*), zu
welchem ich ihn auch den Uebergang machen
lasse, aber bedeutend gröfser, mit längerem,
stärkerem Schnabel, längerem Schwanz und
Flügeln. Schnabel etwas kürzer als der Kopf,
gebildet wie an der nachfolgenden Art, ohne
deutlichen Zahn, aber mit einem sanften Aus-
schnitte hinter der Oberkieferkuppe; Augenlid
mit kleinen Federchen besetzt; die Flügel er-
reichen noch nicht ein Dritttheil der Schwanz-
länge, sind gebildet wie an der nachfolgenden

Art, die vierte und fünfte Schwungfeder die längsten; Schwanz kaum merklich abgestuft, wird wie bei unserm Zaunkönig getragen; Beine wie an der nachfolgenden Art; Ferse mit fünf bis sechs Tafeln belegt.

Färbung: Alle Obertheile haben ein sanftes angenehmes Graubraun, an Unterrücken und Schwanz nur sehr wenig mehr in's Röthliche fallend, Rücken, Flügel und Schwanz höchst fein dunkler in die Quere linirt, an Flügeln und Schwanz sind aber diese Streifen schwarzbraun und weit stärker, auf dem Rücken höchst schwach, Oberhalt und Kopf ungefleckt; innere Fahne der mittleren und vorderen Schwungfedern ungefleckt schwärzlich-graubraun; über dem Auge befindet sich ein fahl röthlich-gelber Streifen, der hinter demselben endet; alle Untertheile des Vogels haben eine fahl hellgrau-röthliche Farbe, an der Mitte des Bauchs zuweilen mehr weißlich; Seiten der Brust und des Leibes mehr fahl röthlich-braun überlaufen; Steiß hell röthlich, mit starken schwärzlich-braunen Flecken; Schnabel am Oberkiefer dunkel hornbraun, Unterkiefer an der Wurzel weißlich; Iris dunkel; Beine fleischbraun; *Azara* beschreibt die innern Flügeldeck-

federn gestreift, welches mir an dem brasilianischen Vogel nicht vorgekommen ist.

Ausmessung: Länge 4" 6"¹⁰ — Breite 6"¹⁰ — L. d. Schnabels 5"¹⁰ — Breite d. Schn. auf den Nasenlöchern 1 $\frac{1}{2}$ " — Breite desselben in seiner Mitte $\frac{3}{4}$ " — Höhe d. Schn. an der Kinnwinkelspitze 1"¹⁰ — L. d. Flügels 1" 10 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Schwänzes etwas über 1" 6" — Höhe d. Fesses 7" — L. d. Mittelzehe 5" — L. d. äußeren Z. 3 $\frac{1}{2}$ " — L. d. inneren Z. 2 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinterzehe 3" — L. d. Mittelnagels 2" — L. d. Hinternagels 2 $\frac{1}{2}$ "

Weibchen: Von dem männlichen Vogel nicht bemerkbar verschieden.

Junger Vogel: Die Querlinien sind weniger nett und deutlich abgesetzt, die Kehle mehr weißlich, und die übrigen Untertheile an den Seiten mehr roströthlich.

Dieser angenehme Singvogel ersetzt in den Wohnungen der Brasilianer unsern europäischen Sperling; denn er ist der Hausvogel oder einzige in den Gebäuden vorkommende gefiederte Bewohner. Er gleicht in Gestalt, Farbe und Manieren unserm Zaunkönig (*Troglodytes*) sehr, ist höchst lebhaft, häufig singend, beständig in Bewegung, den Schwanz aufrichtend und damit schnellend, den Körper niedrig

gebeugt tragend, und häufig hin und her durch Zäune, kleine Oeffnungen, unter die Dächer u. s. w. kriechend. Er hält sich an den Gartenpalissaden, Mäuern, Dächern u. s. w. auf, gewöhnlich paarweise, hat eine etwas schmatzende Lockstimme, etwa wie einige unserer Grasmücken (*Sylvia*), und läßt, auf einem Zaune, Dache oder Hecke sitzend, einen lauten, angenehmen, belebten und sehr abwechselnden Gesang hören, der ihn zu einem der besten brasilianischen Sänger erhebt. Selbst in den Städten, z. B. *Rio de Janeiro*, *Caravellas* u. a., hörte ich nicht selten seinen Gesang auf einem Gartenzaune oder Dache, auch sind diese niedlichen Vögel von den Bewohnern geliebt und scheinen die Gesellschaft des Menschen zu suchen. Ihre Nahrung besteht in Insecten. Sein Nest erbaut unser Vogel meistens unter die Dächer oder in Mauerhöhlen und zwischen die gewöhnlich aus Cocospalissaden bestehenden Zäune. Schon im Monat Julius sah ich ihn Federn, Halme u. dergl. zu seinem Neste zusammentragen, welches er in dem hohl ausgefaulten Palmenstamme einer Hofumzäunung zu *Caravellas* erbaute, ein anderes Nest fand ich zu *Villa de Belmonte* im Monat August in einer Höhlung zweier Balken an einem Hause.

Das Nest selbst ist klein, schlecht gebaut, oben offen und wenig tief, aus Halmen zusammengesetzt und stark mit Federn durchwirkt; es befanden sich vier, auf stark fleischfarbigem oder rosenrothem Grunde, dunkler roth fein besprengte und getüpfelte, Eier darin.

Buffon bildet diese Species (*pl. enl. No. 730. Fig. 2.*) ab, allein die Figur ist sehr schlecht, Stellung unrichtig, Schnabel und Färbung nur sehr oberflächlich, Kopf- und Halsfedern sehr unrichtig dargestellt. Buffon's *Roitelet de Surinam* (*Troglodytes furvus*, Licht.) scheint mir, nach genauer Vergleichung, nicht zu dieser Art zu gehören, wie einige Ornithologen glauben, da sich verschiedene kleine Abweichungen zeigen, obgleich die Aehnlichkeit bei der Vögel sehr groß ist. *Troglodytes furvus* ist wahrscheinlich die Nachtigall der Holländer in Surinam, oder der Schischu *). Azara hat die besten, gründlichen Nachrichten von dem brasilianischen Vogel gegeben, er nennt die Grundfarbe der Eier weiß, da ich sie hinge-

*) S. v. Sack's Reise nach Surinam, 1ste Abth. pag. 32. — Herr Dr. Wolf, welcher dieses Werk mit naturhistorischen Noten versah, irrt, wenn er diesen Vogel für *Pipra musica* ansieht.

gen rosenroth gefunden habe. Seinen *Basacraguay* hält er für identisch mit unserm *Troglodytes*, allein meine Beschreibung wird dargethan haben, daß beide Vögel nur eine oberflächliche Aehnlichkeit und sehr bedeutende Verschiedenheiten zeigen. Ich will hier noch die genaue Vergleichung mit *Troglodytes furvus* folgen lassen.

Troglodytes furvus: Hat sehr viel Aehnlichkeit mit *Tryothorus platensis*, könnte vielleicht Geschlechts- oder Altersverschiedenheit seyn, scheint aber doch eine verschiedene Species zu bilden. Die Farbe ist an den Obertheilen etwa dieselbe, allein der Schwanz fällt weniger in's Roströthliche; die Untertheile sind an *platensis* ungefleckt fahl grauröthlich; an den Seiten des Leibes und der Brust blaß roströthlich überlaufen, bei *furvus* hingegen waren sie mehr schmutzig weißlich, röthlich überlaufen, und an den Seiten des Bauchs und den Schenkeln dunkel queer gewellt und röthlich überlaufen welches wohl auf ein geringeres Alter deutet.

Ausmessung des Troglodytes furvus: Länge etwa 4" 5''' — L. d. Schwanzes 1" 6 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Schnabels 4 $\frac{1}{2}$ ''' — Höhe d. Schn. 1 $\frac{1}{2}$ ''' — Höhe der Ferse, so weit sie unbefiedert, 6 $\frac{2}{3}$ ''' —

Dieselben Ausmessungen an einem ande-

ren Exemplare des *platensis* genommen: Länge 4" 2''' — L. d. Schwanzes: 1" 8½''' — L. d. Schnabels 5½''' — Höhe d. Schn. 1" — Höhe der unbefiederten Ferse 5½'''.

Say fand, bei Gelegenheit von Major Long's Reise zu den *Rocky Mountains*, noch eine Art des Genus *Thryothorus*, die dem *Great Carolina Wren* sehr nahe steht.

2. *T. striolatus*.

Der Schlüpfer mit rostgelber Brust.

S. Schnabel etwas länger als der Kopf, stark; über dem Auge ein weißlicher Strich; Kehle weißlich; Untertheile rostgelb, nach unten rostroth überlaufen; Obertheile braun, Schwung- und Schwanzfedern schwarzbraun queergestreift.

? *Reislet de la Louisiana*, Buff. pl. enl. No. 780.

Fig. 1.

Kampylorynchus striolatus, Spix Av.

Beschreibung des männlichen Vogels nach einem ausgestopften Exemplare: Schnabel stark, etwas länger als der Kopf, höher als breit, von der Mitte an zusammengedrückt, sanft gewölbt messerförmig, Spitze des Oberkiefers sanft hinab gewölbt, mit einem Ausschnitte oder kleinen Zahne versehen; Nasenloch an der Spitze der

Nasenhaut, eiförmig; Tormienränder in der Mitte eingezogen; Kinnwinkel etwa auf ein Dritttheil der Schnabellänge vortretend, zugespitzt, größtentheils befiedert, an seiner Spitze nackt; Flügel nicht völlig die Hälfte oder ein Dritttheil des Schwanzes erreichend, abgerundet, indem die erste Feder sehr kurz, die nachfolgenden bis zur fünften zunehmend sind, welche die längste ist; Schwanz mälsig lang, gewöhnlich etwas aufgerichtet getragen, wie an unserem Zaunkönig; Beine stark und hoch; Fersenrücken mit sechs glatten Tafeln belegt, Fersensole glatt gestieft; Mittelzehe sehr lang, ihr Nagel ebenfalls viel größer als die der beiden Nebenzehen; Hinternagel noch weit größer, dick, stark, und stark gewölbt.

Färbung: Oberkiefer schwarzbraun, am Rande weißlich, wie der Unterkiefer an der Wurzelhälfte, dessen Spitze ebenfalls schwärzlich ist; Beine graubraun, im Leben wahrscheinlich bleifarben; alle Obertheile des Vogels sind dunkel röthlich-braun, auf dem Kopfe mehr graubraun; von der Nase zieht über dem Auge hin eine weißliche Linie, Seiten des Kopfs unter derselben dunkelbraun, weiter hinab fahl graulich-braun; Kehle weißlich, kaum merklich fein dunkler gestrichelt; Brust

und ganzer Unterleib rostgelb, an Bauch, Seiten, After und Steiß mehr in's Rostrothe fallend; Unterrücken etwas heller, mehr röthlichbraun als der Rücken, Schwanz mit neun bis zehn schönen, eine Linie breiten, schwarzen Queerbinden bezeichnet, die an der Spitze der äußeren Federn spitzwinklig werden; Flügel an den großen Deck- und Schwungfedern ebenfalls schwarz in die Quere gestreift, doch ist die hintere Fahne der letzteren gänzlich dunkel graubraun ohne Flecken.

Ausmessung: Länge ungefähr $4\frac{1}{2}$ bis 5" — L. d. Schnabels $9\frac{1}{2}$ " — Breite d. Schn. auf den Nasenlöchern $1\frac{2}{3}$ " — Br. d. Schn. in der Mitte $\frac{4}{5}$ " — Höhe d. Schn. an der Kinnwinkelspitze $1\frac{2}{3}$ " — L. d. Flügels $2''\ 4'''$ — L. d. Schwanzes etwa 2" — Höhe d. Ferse $9\frac{1}{3}$ " — L. d. Mittelzehe $6\frac{1}{5}$ " — L. d. äußeren Z. $4\frac{1}{4}$ " — L. d. inneren Z. $3\frac{4}{5}$ " — L. d. Hinterzehe $4\frac{1}{2}$ " — L. d. Mittelnagels 2" — L. d. äußeren N. $1\frac{7}{8}$ " — L. d. Hinternagels 3".

Dieser Vogel ist mir nicht oft vorgekommen, da er sich in den dichten, dunkeln Gebüschchen aufhält, und daher nicht leicht zu erlegen ist. Er soll eine laute, starke Stimme haben. In der Gestalt gleicht er sehr der vorhergehenden Art, eben so in der Färbung, ist

aber bedeutend größer. Von der Lebensart dieser Species kann ich weiter nichts hinzufügen, auch ihre Beschreibung selbst nur nach dem ausgestopften Vogel geben, da er in meiner Abwesenheit geschossen und präparirt wurde.

Buffon's Figur (*pl. enl. No. 730. Fig. 1.*) hat mit der hier beschriebenen Species viel Aehnlichkeit, ich vermüthe aber, daß jene auf *Wilson's great Carolina Wren* bezogen werden müsse, ob sie gleich in der Färbung mehr meinem Vogel gleicht, als dem des *Wilson*. Der eben genannte carolinische Vogel ist verschieden von dem meinigen, ob er gleich viel Aehnlichkeit mit ihm und auch dieselbe GröÙe hat. *Spix* scheint in seinem *Kampylorhynchus striolatus* meinen Vogel abbilden zu wollen, allein die Figur ist nicht wohl gerathen.

3. *T. Gladiator.*

Der Schlüpfer mit der Degenklinge.

S. Schnabel sehr lang, schlank und gerade; Obertheile olivenbräunlich, Untertheile weißlich, an den Seiten gelblich-braun überlaufen; Schwanz schwärzlich-braun.

? *Troglodytes rectirostris*, Swains. Zool. illustr. Vol. III, pl. 140.

? *Ramphocaenus melanurus*, Vieillot Gal. d'ois.
pl. 128.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel bedeutend länger als der Kopf, beinahe gerade, an der Wurzel breit, dann zusammengedrückt, in der Mitte höher als breit, sehr schlank, beinahe klingenförmig, an der Spitze des Oberkiefer sanft herab gebogen, mit einem kleinen Zahne; Dillenkante vom Kinnwinkel an sehr sanft aufsteigend, dieser lang, breit, ziemlich zugespitzt, zum Theil befiedert; Firste an der Wurzel, zwischen den etwas vertieften Nasenhäuten kantig erhaben; Nasenloch eine feine Ritze; Flügel kurz, abgerundet, sie falten auf der Schwanzwurzel, die erste Feder sehr kurz, dann nehmen sie zu bis zur fünften, welche die längste ist; Schwanz schwach, schmalfedrig und abgestuft, nur mäßig lang; Beine schlank, Ferse mit sechs bis sieben glatten Tafeln belegt, Lauf- oder Fersensohle glatt; Hinternagel wenig größer als der mittlere Vorder nagel.

Färbung: Alle Obertheile röthlich-olivengraun, die Schwungfedern nur an der Vorderfahne, dabei mehr röthlich überlaufen, die Hinterfahne dunkel graubraun; Schwanz bräunlich-schwarz, die äußeren Federn ein wenig bläs-

ser; Untertheile weißlich, an der Brust treten die grauen Wurzeln der weißlich bespitzten Federn etwas hervor; Seiten der Brust und des Leibes stark röthlich - graubraun überlaufen; Schnabel am Oberkiefer schwärzlich-braun, am unteren weißlich.

Ausmessung: Länge etwa $4'' 3\frac{1}{2}'''$ — L. d. Schnabels $8\frac{1}{4}'''$ — Höhe d. Schn. an der Kinnwinkelspitze $1'''$ — Breite d. Schn. daselbst $\frac{3}{4}'''$ — Br. d. Schn. auf den Nasenlöchern $1\frac{1}{4}'''$ — L. d. Flügels $1'' 8'''$ — L. d. Schwanzes (wie es scheint in der Mauser) $1'' 6'''$ — Höhe d. Ferse $8\frac{1}{5}'''$ — L. d. Mittelzehe $4\frac{1}{2}'''$ — L. d. äußeren Z. $3\frac{1}{2}'''$ — L. d. inneren Z. $3'''$ — L. d. Hinterzehe $3\frac{1}{5}'''$ — L. d. Mittelnagels $2'''$ — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{5}'''$. —

Dieser sonderbare lang- und dünnschnäbelige Vogel ist mir nur selten vorgekommen, auch habe ich ihn nur nach dem ausgestopften Exemplare beschrieben, da er in meiner Abwesenheit erlegt wurde. Er kriecht, wie die übrigen Arten, in den dunkeln, dichten Gebüsch umher, und hat in der Gestalt des Schnabels schon Aehnlichkeit mit dem Geschlecht *Myothera*. Da er mir in der Natur nicht zu Gesicht gekommen ist, so muß ich

mich in dieser Hinsicht auf die Aussage meiner Jäger verlassen.

Swainson scheint diesen Vogel auf seiner 140sten Tafel darzustellen, allein in diesem Falle ist seine Figur nicht gänzlich tadelfrei, besonders in Hinsicht des Schnabels; denn die herabgebogene Kuppe des Oberkiefers fehlt meinem Vogel.

4. *T. Coraya*, Vieill.

Der Schlüpfer mit dem schwarzen Bartstreifen.

S. Oberkopf graubraun, eine weißliche Linie über den Augen; Kinn und Kehle weißlich, letztere an jeder Seite mit einer schwarzen Längslinie; Obertheile rothbraun; Schwanz graubraun, schwärzlich queergestreift; Bauch röthlich-braun überlaufen.

Le Coraya, Buff. pl. enl. No. 701. Fig. 1.

Turdus Coraya, Lath.

Myothera Coraya, Illig.

Vieill. tab. encycl. et meth. pag. 627.

Sphenura Coraya, Licht.

Myothera Coraya, Spiz Av. T. II. pag. 73. Tab. 73.

Fig. 2.

Beschreibung des weiblichen Vogels:

Schnabel stark, kürzer als der Kopf, hoch, gegen die Spitze hin zusammengedrückt, hinter der Kuppe des Oberkiefers mit einem kleinen

Zähne: Erste ziemlich scharf, etwas gewölbt, besonders nach der Spitze hin herabgesenkt; Tomien nur wenig eingezogen; Kinnwinkel gegen die Mitte des Schnabels vortretend, ziemlich zugespitzt, befiedert; Nase mit einer stark gerandeten Haut oder einer Hautschuppe bedeckt, an deren unterer Seite die länglich-eiförmige Oeffnung sich befindet, bis zu welcher die Federn vortreten; Zunge wie oben angegeben; Flügel kurz und abgerundet, die Federn ein wenig gekrümmt, die fünfte und sechste sind die längsten, die erste sehr kurz; Schwanz aus zwölf mälsig langen, abgestuften, unten abgerundeten Federn bestehend; Beine stark und ziemlich hoch; Ferse mit sechs glatten Tafeln belegt, Fersensohle zusammengedrückt und gestiefelt, d. h. mit einer glatten Tafel belegt; Zehenrücken getäfelt; Hinterzehe groß und lang, mit starkem, gekrümmtem Nagel.

Färbung: Iris gelbbraun; Beine schmutzig bräunlich-bleifarben; Oberkiefer schwarzbraun mit gelblichem Rande, Unterkiefer blafs-gelb; Scheitel, Nacken, Oberhals und Seiten desselben graubraun; vom Nasenloche zieht über dem Auge hin eine weisse Linie nach dem Hinterkopfe; Seiten des Kopfs aschgrau und

weiß gemischt, an der unteren Seite der Backen schwarz, sich gegen einen weißen Streifen absetzend, der von dem Unterkiefer unter den Backen hinabzieht; Kehle und Brust weißlich, aber unter dem weißen Unterkieferstreifen zieht an jeder Seite der Kehle eine nette, feine, schwarze Linie bis unter das Ohr hinab; Rücken, Schultern, Flügeldeckfedern und vorderer Saum der dunkelgraubraunen Schwungfedern sind schön röthlich - kastanienbraun; Schwanz dunkel graubraun mit elf bis zwölf schwärzlichen Querbinden; Untertheile in der Mitte weißlich, aber überall und besonders in den Seiten sehr stark gelbbraunlich überlaufen.

Ausmessung: Länge 5" 8''' — Breite 7" — Länge d. Schnabels 6 $\frac{1}{2}$ ''' — Höhe d. Schn. 1 $\frac{3}{4}$ ''' — Br. d. Schn. 1 $\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Flügels 2" 3 $\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Schwanzes etwa 2" — Höhe d. Ferse 7 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Mittelzehe etwa 5 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. äußeren Z. 4''' — L. d. inneren Z. 3 $\frac{7}{8}$ ''' — L. d. hinteren Z. 4''' — L. d. Mittelnagels 2 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äußeren N. 1 $\frac{3}{4}$ ''' — L. d. inneren N. 1 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinternagels 3'''.

Männchen: Von dem Weibchen in der Färbung kaum zu unterscheiden, scheint ein wenig größer, auch sind wohl die Farben ein wenig stärker und mehr nett ausgedrückt, Brust

und Kehle sind recht rein, oft auch der Oberkopf mehr aschgrau, worin diese Vögel überhaupt ein wenig variiren, indem der Kopf zuweilen mehr aschgrau oder mehr graubraun ist, wahrscheinlich nach Alter und Geschlecht.

Diesen Vogel fand ich überall in den dichten, sehr dunkeln, niederen Gebüschten, wo er langsam umher hüpfte und seine laute, aus ein Paar sonderbaren Tönen bestehende Stimme hören läßt. Man bekommt ihn sehr selten zu sehen, und oft haben sich meine Jäger stundenlang angestellt, um diese schüchternen Vögel zu überlisten, und sie dennoch nicht zu sehen bekommen, während die Stimme ganz in der Nähe gehört wurde. Sie bleiben immer in dem dichtesten, verworrensten Dunkel der niederen Gebüschte, wo sie Insecten finden. Schon *Sonnini* und *Viellot* geben über diesen Vogel gute Nachrichten, und *Buffon* bildet ihn ab; allein diese Figur ist nicht gut; denn sie zeigt die Untertheile braun, da sie doch in der Natur weißlich sind, auch fehlen die Kehlstreifen, deren weder *Buffon* noch *Viellot* erwähnen. Die *Spix'sche* Abbildung ist in der Färbung besser als die des *Buffon*, allein bei dieser ist wieder die Stellung und Figur des Vogels vorzuziehen.

Gen. 24. Coereba, Bris.

S a i.

Dieses Geschlecht enthält in Brasilien einige sehr schön gefärbte Vögel, welche *Linné* und die älteren Naturforscher wegen der Wölbung ihres Schnabels zu den Baumläufern (*Certhia*) zählten. *Illiger* vereinigte sie später unter der Benennung *Nectarinia* mit ähnlichen schönen Vögeln der alten Welt, welche durch ein prachtvolles metallglänzendes Gefieder ausgezeichnet sind; allein diese Benennung kann für die americanischen Vögel füglich wegfallen, da sie nicht von Blumensaft, sondern von Beeren und Insecten leben, auch sollen die Arten der alten Welt einen verschiedenartigen Zungenbau besitzen, und von ihnen glaubt man noch gegenwärtig, daß sie die Honigsäfte der Blumen geniessen *), welches ich indessen bezweifle. Ich habe in Brasilien vier in das Geschlecht *Coereba* zu rechnende Vogelarten kennen gelernt, sämmtlich den Ornithologen schon längst bekannt, in deren Naturgeschichte ich die beiden nachfolgenden Punkte habe aufklären können, nämlich:

*) S. *Levaillant, hist. nat. d'Afrique, Tom. 6. p. 94.*
u. a. a. Orten.

- 1) Dafs die bisher besonders aufgestellte *Sylvia* oder *Nectarinia cyanocephala* das Weibchen der *caerulea*, und
- 2) dafs diese Vögel nicht von Blumensaft leben, wie *Vieillot* und andere Ornithologen noch in ihren neuesten Schriften annehmen. Den letzteren Punct, ich meine die Insectennahrung, habe ich auch für das Geschlecht der Fliegenvögel (*Trochilus*) zuerst bestätigt.

Die Sa's (denn *Ca'i* ist ihr brasilianischer Name in der von mir bereis'ten Gegend) sind muntere, allerliebste kleine Vögel, die in ihren Manieren und in ihrer Lebensart am meisten Aehnlichkeit mit unsern Sängern (*Sylvia*) zeigen. Sie sind beständig in Bewegung, besonders hoch in den Zweigen der Waldbäume, wo sie von Ast zu Ast fliegend oder hüpfend, sich wie die Meisen anhängen und den Insecten und Baumfrüchten nachstellen. Ich habe in ihren Mägen mehr Früchte als Insecten gefunden, öfters schön rothe Saamenkerne und Beeren, sie ziehen aber nach allen Arten der reifenden Baumfrüchte, besonders den Orangen umher, welchen beinahe alle kleinere brasilianische Vögel und selbst eine Menge der gröfseren Arten gefährlich sind. Zur Zeit der Reife dieser Früchte kommen sie in die Gärten und nähern

sich den menschlichen Wohnungen so sehr als unsere Snger (*Sylvia*) und unsere Finken in Europa. Sie leben eben so gut in den geschlossenen Waldungen als in abwechselnden Gebuschen. Gesang habe ich von diesen, wegen ihrer Schnheit bekannten Vgeln wohl eigentlich nie gehrt, doch soll derselbe als ein leises Zwitschern vorkommen; die gewhnliche Lockstimme ist ein kurzer Ton. Die Art ihrer Fortpflanzung habe ich nicht beobachten knnen; denn ich habe nie ein solches Nest gefunden, vermuthet aber, daf sie in hohe luftige Zweige der Waldbume bauen. Von knstlich erbauten Nestern des Geschlechts *Coereba* haben mir die brasilianischen Jger nie etwas sagen knnen, ich glaube dafhalb, daf diese Thierchen ein einfaches Nest erbauen, wie die Manakin's (*Pipra*), und daf man mit Unrecht der *Coereba cyanea* das von *Seba* (T. I. Tab. 68. Fig. 2.) abgebildete Nest zuschreibt. Die Figuren der Vogelnester in *Seba's* Werk sind zum Theil sehr unrichtig gedeutet worden, und ich glaube gewif, daf ich von einem so knstlichen Nestbaue unterrichtet worden wre, wenn er existirte, da dergleichen von der gewhnlichen Art abweichende Bildungen den einheimischen Jgern nicht fremd zu bleiben pflegen.

Obgleich das Gefieder der Saïs vorzüglich schön ist, so habe ich sie doch nie gezähmt in den Wohnungen der Brasilianer angetroffen, vielleicht halten sie die Gefangenschaft nicht wohl aus. *Azara* erwähnt die hier aufzuführenden Vogelarten nicht, es scheint, daß sie nicht so weit südlich hinab gehen.

1. *C. cyanea*, Vieill.

Der blaue Saï mit schwarz und gelben Flügeln.

S. *Prächtig glänzend hellblau; Scheitel glänzend blaugrün; Rücken, Augenstreif, Flügel und Schwanz schwarz; innerer Rand der Schwungfedern schön gelb.*

Guira Coereba, *Marcgr.* pag. 212.

Le Guit - Guit noir et bleu, *Buff. pl. enl. 83. Fig. 2.*

— — — *proprement dit*, *Vieill.*

Vieillot galerie d'ois. pl. 176.

Meine Reise nach Bras. Bd. I. pag. 44. 187. 276.

Caï im östlichen Brasilien.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt schlank und angenehm; Auge lebhaft; Schnabel stark, pfriemförmig, an der Wurzel etwas breit, Firste mälsig erhaben, Spitze sanft hinab gewölbt, etwas zusammengedrückt, zugespitzt; Oberkiefer nur sehr wenig länger als der untere; Tomienrand ein wenig eingezogen;

Nasenlöcher neben der Firste eiförmig vertieft, die Nase bis gegen die Oeffnung mit Federn bedeckt; Kinnwinkel breit, erreicht kaum ein Dritttheil der Schnabellänge, ist mälsig spitzwinklig; die Dillenkante mälsig zugeschärft; die Flügel erreichen in der Ruhe etwa die Mitte des Schwanzes, die erste Schwungfeder ist die längste; äufßere Schwanzfedern ein wenig länger als die inneren, daher erscheint der Schwanz in der Mitte ein wenig ausgerandet; Beine schlank, ziemlich hoch, glatt getäfelt, Fersentrücken mit fünf glatten Tafeln belegt; Mittelzehe die längste von allen, über eine Linie länger als die äufßere, welche wieder länger ist, als die innerste, Hinterzehe etwas kürzer als die innerste. —

Färbung: Schnabel schwarz; Iris graubraun; Beine lebhaft orangenroth; Klauen schwarz; der Scheitel ist schön matt glänzend blaugrün, welches sich vortrefflich gegen die prächtig glänzend ultramarinblaue Farbe des ganzen übrigen Kopfes hebt; die schön blaue Kopffarbe bedeckt ferner den Nacken, die Ohrgegend, Kinn, Kehle, Unterhals, Brust, Bauch, After, Steifs und Seiten, so wie die Scapularfedern, den Mittel- und Unterrücken, auch die oberen Schwanzdeckfedern; kohl- oder sammt-

schwarz sind die Zügel durch das Auge und noch ein kleiner Fleck hinter demselben, Ober- und Seitenhals, so wie der Rücken bis zu seiner Mitte, die ganzen Flügel, der Schwanz, die Schenkel und die den Schwanz unmittelbar berührenden unteren Deckfedern; Schwungfedern an der inneren Fahne schön gelb, die Spitze derselben aber wieder schwarz.

Ausmessung: Länge etwa 4" 8''' — Länge d. Schnabels 6 $\frac{3}{4}$ ''' — Br. d. Schn. an der Wurzel 1 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Flügels 2" 3''' — L. d. Schwanzes ungefähr 1" 3''' — Höhe der Ferse 5 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelzehe 3 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äußeren Z. 2 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. inneren Z. 2 $\frac{1}{8}$ ''' — L. d. Hinterzehe 2''' — L. d. Mittelnagels 1 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. äußeren N. 1''' — L. d. inneren N. 1 $\frac{1}{8}$ ''' — L. d. Hinternagels 2'''.

Weibchen: An Größe und Gestalt wenig von dem Männchen verschieden. Schnabel schwarzbraun; Iris wie bei dem männlichen Vogel; Beine bräunlich-roth; alle Obertheile zeisiggrün, die unteren blaßgrün, die Federn in der Mitte weißlich-gelb, daher diese Theile ein gestricheltes Ansehn erhalten; innere Flügeldeckfedern blaßgelb; innerer Rand der Schwungfedern blaß gelblich; Kehle weißlich; vorderer Rand der Schwungfedern grün.

Junger männlicher Vogel: Farbe wie an dem vorhergehenden, Schwungfedern wie dort schwärzlich - braun mit grünem Vordersaume, allein es fehlt ihnen an der inneren Fahne der blaßgelbe Saum; die Füße sind graubraun; große Flügeldeckfedern graubraun mit breitem grünem Saume.

Junger männlicher Vogel im Federwechsel: Ich besitze mehrere sehr instructive Exemplare dieser Art, wo der ganze Körper noch die grüne Farbe hat, auf dem grünen Rücken aber schon sehr bunt schwarz gefleckt und gleichsam queer gewellt ist; an Nacken, Seiten des Halses, Brust und Bauch stehen überall schon die glänzend blauen Federn einzeln vertheilt, und die grünblauen Scheitelfedern zeigen sich auch gleich schönen glänzenden Flecken. —

Der überaus schöne Gegenstand obiger Beschreibung ist jetzt in allen Cabinetten verbreitet und sehr gemein, er wird aber dennoch immer eine der größten Zierden derselben bleiben. Er scheint über den größten Theil von Südamerica verbreitet, indem er in *Guiana*, *Surinam* und *Cayenne* vorkommt, in *Mexico* leben soll und bei *Rio de Janeiro* von mir noch beobachtet wurde. In den von mir bereits

Gegenden ist er nirgends so häufig als in der Provinz *Espirito Santo*; denn dort in dem schönen Walde von *Barra de Jucú*, unweit der Seeküste, erlegten meine Jäger eine große Menge dieser schönen Vögel. Sie waren in der Paarzeit gepaart, übrigens aber in kleinen Gesellschaften, von sechs bis acht Stücken vereint, und durchzogen munter die hohen Baumzweige. In ihren Mägen fand man meistens Ueberreste von Früchten, doch auch von Insecten. Eine laute Stimme oder einen bedeutenden Gesang haben wir nicht von ihnen gehört, sie sollen indessen ein ziemlich leises Gezwitzchen haben, und ihre Lockstimme ist ein oft und schnell wiederholter kurzer Laut. Sie hüpfen und flattern, gleich unseren Meisen, gesellschaftlich von Ast zu Ast, sind stets in Bewegung, halten sich nicht lange an einer Stelle auf. Oft sind sie mit andern kleinen Vögeln, z. B. den *Tangara's* oder kleinen Sängern (*Sylvia, Hylophilus*) gesellschaftlich vereint. Sie leben in großen Wäldern und offenen, mit Gebüsch abwechselnden Gegenden. In der Zeit, wenn die saftigen Früchte, besonders die Orangen, reifen, stellen sie diesen eifrig nach, alsdann kann man auf diesen Bäumen alle Sorten der schönsten kleinen Vögel in Menge erlegen.

Herr Professor *Lichtenstein* sagt in der Erläuterung zu *Marcgrave's* Naturgeschichte von Brasilien, daß dieser Vogel in der *Menzelschen* Abbildung *Caii-curiba* genannt sey, die Benennung *Cai* scheint also in einem großen Theile von Brasilien zu gelten. *Buffon* bildet (*pl. enl. No. 83.*) unsern Vogel ziemlich richtig ab, allein die schöne blaue Farbe hat der Maler nicht erreicht, auch dürfte es schwer seyn, diesen prachtvollen Glanz nachzuahmen. Die *Tafel No. 682.* stellt *Buffon's grimpereau verd de Cayenne* oder den *Guit-Guit tout verd* vor, der wahrscheinlich eine, ziemlich schlecht gerathene, Abbildung des jungen *Coereba cyanea* oder *spiza* seyn soll. *Vieillot's* Abbildung ist ziemlich hübsch, doch erreichen alle Abbildungen den Glanz und die Lebhaftigkeit dieses schönen Vogels in der Natur nicht.

2. *C. caerulea*, Vieill.

Der blaue schwarzkehlige Sai.

♂. Körper schön glänzend blaugrün; Zügel, Nasenfedern, Kinn, Kehle bis zur Brust, Oberrücken und Schwanz schwarz; Deck- und Schwungfedern schwarz mit blauen Rändern; Weibchen grün, mit himmelblauem Scheitel und Backen.

Le Guit-Guit noir et bleu, Buff., Vieill.

Certhia caerulea et Motacilla cyanocephala, Linn.,
Gmel.

Nectarinia cyanocephala, Swains. Zool. illustr. Vol.
II. pl. 117.

Guit - Guit verd et bleu à gorge blanche, Buff., des
Weibchen (pl. enl. No. 578. Fig. 1.)

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt etwa der vorhergehenden Art, aber weniger schlank; Schnabel in der Hauptsache von derselben Bildung, allein etwas kürzer und von stärkerem Höhendurchmesser, daher dicker; Kinnwinkel an seinem Vordertheile nackt; übrige Theile gebildet wie an No. 1.

Färbung: Schnabel schwarz; Iris lebhaft rothbraun; Beine fleischfarben-bräunlich; die die Nasenlöcher deckenden Federn, der Zügel, ein kleiner Fleck hinter dem Auge, Kinn, Kehle, Mitte des Unterhalses, Rücken bis zu seiner Mitte und Schwanz sind dunkel schwarz, alle übrigen Theile glänzend himmelblau, welches nach dem Lichte hin, wie bei *Procnias ventralis* (*Ampelis tersa*, Linn.), in ein prächtiges Grün schillert; die blauen Federn sind an der Wurzel aschgrau und nicht so fest als die blauen der vorhergehenden Art, sondern mehr locker, weshalb man zuweilen die graue Farbe hindurch blicken sieht; Scapular-, große Flü-

geldeck- und Schwungfedern schwarz, mit schönen, starken, himmelblauen Rändern.

Ausmessung: Länge 4" 7''' — Breite 7" 6''' — L. d. Schnabels 5''' — Breite d. Schn. 2''' — Höhe d. Schn. 1''' — L. d. Flügels 2" 4½''' — L. d. Schwanzes etwa 1" 4''' — Höhe d. Ferse 6½''' — L. d. Mittelzehe 4½''' — L. d. äusseren Z. 2½''' — L. d. inneren Z. 2¼''' — L. d. Hinterzehe 2''' — L. d. Mittelnagels 1½''' — L. d. Hinternagels 1¼''' . —

Altes Weibchen: Ist bis jetzt als *Motacilla cyanocephala*, Linn., oder als *Buffon's Guit-Guit verd et bleu à gorge blanche* bekannt gewesen. Iris hoch rothbraun; Beine bräunlich-fleischfarben; Schnabel am Oberkiefer schwarzbraun, Unterkiefer blafs hornbräunlich; Scheitel und Backen blafs himmelblau, obere kleine Flügeldeckfedern graublau, etwas in's Grünliche fallend; ganzes übriges Gefieder lebhaft papagaygrün, an den Obertheilen ein wenig bräunlich überlaufen, an den Untertheilen lebhafter und heller grün, zuweilen etwas gelblich gemischt, und die Federn an der Wurzel grau; Steihsfedern blafs, mehr in's Graugelbe fallend; Kehle blafs aschgrau; grosse Flügeldeck- und hintere Schwungfedern grünlich-braun mit schön grünen Rändern, eben so die

meisten Schwanzfedern; vordere Schwung- und ein Paar Schwanzfedern mit himmelblauem Vordersaume.

Ausmessung: Länge 4" 8½" — Breite 7" 2". —

Dieser weibliche Vogel ist von *Buffon, pl. enl. No. 578. Fig. 1.*, sehr fehlerhaft abgebildet; denn weder die Gestalt noch Färbung sind richtig dargestellt.

Jungen Vögeln fehlt manchmal der blaue Kopf, den sie indessen gewöhnlich in beiden Geschlechtern besitzen, und sie sind nicht so schön grün als das alte Weibchen, mehr bräunlich und schmutzig überlaufen.

Männlicher Vogel im Uebergange: Befindet sich in verschiedenen Exemplaren in meiner Sammlung. Er ist über und über himmelblau und schwarz, allein in der glänzend blauen Farbe stehen noch einzelne lebhaft grüne Federn. —

Der hier beschriebene Saï hat die Lebensart und Manieren des vorhergehenden, und lebt auch mit ihm in ein und derselben Gegend. Ich erlegte zuerst das alte Weibchen bei *Rio de Janeiro*, und fand in dessen Magen damals, in der kalten Jahreszeit im Monat Julius, große

rothe Saamenkerne, so wie die Untersuchung ihrer Mägen uns meistentheils Fruchtüberreste gezeigt hat. Sie ziehen in kleinen Gesellschaften umher, sind nicht selten und lassen sich zum Schusse nahe kommen. Ihre Lockstimme ist kurz und fein. *Buffon* beschreibt seinen Vogel aus *Guiana*, und da er bei *Rio* gefunden wird, so ist er über einen grossen Theil von Südamerica verbreitet.

Im *Dictionnaire des sciences naturelles* (Vol. 41. pag. 169.) wird der weibliche Vogel dieser Species (*Motacilla cyanocephala*, Linn.) für eine Varietät des *Pitpit bleu* (*Motacilla cayana*, Linn.) ausgegeben, welches, wie ich gezeigt, ungegründet, indem der cayennische Vogel mir in Brasilien nie vorgekommen ist, dagegen *Coereba caerulea* überall paarweise geschossen werden kann. *Swainson* hat dagegen, nachdem ich in meiner Reisebeschreibung jenen Irrthum aufgeklärt, ein Paar dieser niedlichen Vögel recht gut abgebildet, nur schade, daß die Farben des Männchens nicht schön und lebhaft genug sind.

3. *C. spiza*.

Der grüne Saï mit schwarzem Kopfe.

S. Körper schön glänzend grün; Obertheil und Seiten des Kopfs schwarz; Weibchen grünlich papageygrün, ohne schwarzen Kopf.

Certhia spiza, Linn., Lath.

Le Guit - Guit verd à tête noire, Buff. pl. enl. No.

578. Fig. 2.

Coccyzus melanocephala, Vieill.

Meine Reise nach Bras. B. I. pag. 276.

Cor im östlichen Brasilien.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt etwa der vorhergehenden Arten; Schnabel stark, etwas gewölbt und vorn sanft hinabgebogen, beide Kiefer etwa gleich lang, Wurzel des Oberkiefers breit, Firste sanft messerförmig erhaben; Nase mit einer Haut bedeckt, das Nasenloch nur wenig geöffnet, unbefiedert; Kinnwinkel mälsig zugespitzt, ziemlich breit und beinahe gänzlich befiedert; Flügel ziemlich kurz, sie erreichen kaum ein Dritttheil des Schwanzes; Beine stark und ziemlich hoch, glatt gefäelt, oder die Ferse mit vier bis fünf grossen, glatten Schildtafeln belegt; Nägel stark und gewölbt; Schwanzfedern ziemlich gleich lang. —

Färbung: Oberkiefer schwarz, der untere citrongelb; Iris im Auge graubraun; Beine

schön bleifarben; ganzes Gefieder sehr schön lebhaft und glänzend etwas dunkel bläulich-grün, an Hals und Untertheilen am hellsten und glänzendsten; Deckfedern der Flügel und mittlere Schwanzfedern ziemlich dunkelgrün; Oberkopf bis in den Nacken, und Seiten des ganzen Kopfs, bis unter das Ohr dunkel schwarz; Schwung-, Schwanz- und große Flügeldeckfedern bräunlich-schwarz, mit lebhaft grünen Rändern und Vorderfahne; Schaftgegend der mittleren grünen Schwanzfedern schwarz; die grünen Federn des Leibes sind an der Wurzelhälfte schwärzlich.

Ausmessung: Länge 5" $2\frac{2}{3}$ " — Breite 8" — L. d. Schnabels 7" — Breite d. Schn. $2\frac{1}{3}$ " — Höhe d. Schn. $2\frac{1}{4}$ " — L. d. Flügels 2" $5\frac{1}{2}$ " — L. d. Schwanzes ungefähr 1" 5" — Höhe d. Ferse 7" — L. d. Mittelzehe $4\frac{3}{4}$ " — L. d. äusseren Z. 3" — L. d. inneren Z. $2\frac{6}{7}$ " — L. d. Hinterzehe 3" — L. d. Mittelnagels 2" — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{2}$ " — L. d. inneren N. $1\frac{1}{8}$ ". —

Weibchen: Der Unterschnabel ist nicht so lebhaft gelb, mehr weisslich-gelb; der Kopf hat nichts von der schönen schwarzen Farbe; der ganze Körper ohne Ausnahme ist papagaygrün, und nicht von der mehr in's Spangrüne

fallenden Mischung des Männchens; Obertheile etwas dunkler als die unteren, die Kehle fällt etwas in's Gelbliche; Schwungfedern dunkel graubraun, mit grünem Vordersäume; Schwanzfedern eben so, nur die mittleren grün; Beine graubraun.

Junger Vogel: Gefärbt wie das Weibchen, aber die Untertheile heller, Kehle und Bauch mehr gelblich-grün.

Dieser schöne Vogel ist mir in einigen Gegenden häufiger vorgekommen, als in anderen; ich habe ihn aber nirgends so zahlreich gefunden, als in der Gegend von *Villa Viçosa* am Flusse *Peruhype*, auch weiter nördlich war er nicht selten. Sie halten sich sowohl in den Gebüschten als in den großen Urwaldungen auf, haben mit den vorhergehenden einerlei Lebensweise, und ich habe sie nicht singen, sondern nur eine kurze Lockstimme von sich geben gehört.

Buffon bildet diese schöne Species (No. 578. Fig. 2) ab, allein nicht gut; denn das schöne Grün ist viel zu dunkel und ohne alles Leben, welches bei diesem Gefieder besonders durch einen unvergleichlichen Glanz hervorgebracht wird.

4. *C. flaveola*, Vieill.

Der gelbbäuchige Saï.

S. Obertheile aschgraubraun, über das Auge hin ein weißer Streifen; Kehle aschgrau oder weißlich; Steiße weißlich; Untertheile schön gelb; äussere Schwanzfedern mit weißen Spitzen.

Certhia flaveola, Linn., Lath.

Le Sucrier, Buff.

Le Guit-Guit Sucrier, Vieill.

Nectarinia flaveola, Swains. Vol. III. pl. 142.

Meine Reise nach Bras. B. I. pag. 297.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Ein kleiner kurz gedrungener Vogel. Schnabel kürzer als der Kopf, sehr zugespitzt, sanft gewölbt, stark, Firste kantig erhaben, Nasenlöcher unbefiedert, Kinnwinkel ziemlich stumpf und befiedert; Beine ziemlich hoch, schlank, die Ferse mit vier glatten Tafeln belegt; Flügel etwas über ein Dritttheil der Schwanzlänge hinaustretend; Schwanz ziemlich kurz, die äusseren Federn an Länge nur sehr wenig abnehmend, wodurch er sehr sanft abgerundet erscheint.

Färbung: Schnabel schwarz; Iris graubraun; Beine fleischbraun; Obertheile dunkel graubraun, bei manchen Individuen etwas blässer; Kehle rein aschblau; über das Auge hin

zieht ein breiter weißer Streifen, der auf den Nasenlöchern beginnt, und an der Seite des Hinterkopfs endet; Brust und Bauch bis zu den Beinen lebhaft gelb; Schenkel, Aftergegend und *uropygium* weniger lebhaft oder blässer gelb; Steiß weißlich; vordere Schwung- und Schwanzfedern dunkel graubraun, die ersteren mit weißem Vordersaume, die letzteren mit weißem Randsaume, und die äußeren mit weißer Spitze.

Weibchen: Vom männlichen Vogel kaum zu unterscheiden, ich glaube, daß der erstere die Farben etwas lebhafter trägt.

Junge Vögel: Alle Farben sind blaß und die Kehle ist nicht aschgrau, sondern weißlichgrau und unrein, alle Farben verloschen; solche Vögel sind oft noch sehr klein.

Ausmessung: Länge 3" 10''' — L. d. Schnabels $4\frac{3}{4}$ ''' — Höhe d. Schn. $1\frac{1}{2}$ ''' — Breite d. Schn. 1''' — L. d. Flügels 2" $1\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Schwanzes 1" — Höhe d. Ferse $6\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelzehe $3\frac{3}{4}$ ''' — L. d. äußeren Z. $2\frac{1}{2}$ ''' — L. d. inneren Z. $2\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Hinterzehe $2\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Mittelnagels $1\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Hinternagels 2''' —

Der kleine Vogel obiger Beschreibung ist in allen von mir bereis'ten brasilianischen Ge-

genden sehr gemein, er lebt in Gebüsch, den menschlichen Wohnungen nahe und in den großen Waldungen. Er soll einen leisen Gesang haben, ob ich gleich aus eigener Erfahrung nur von einer kurzen Lockstimme reden kann. Er ist über den größten Theil von Süd-america ausgedehnt; denn er kommt auf den Inseln vor, in *Guiana* und ganz Brasilien. *Azara* scheint ihn in *Paraguay* nicht beobachtet zu haben. Daß dieser Vogel sich von Zuckersaft nähren soll, hat man mir in Brasilien nirgends bestätigt, auch habe ich nichts ähnliches bemerkt. In *Jamaica* sollen diese Vögel auf ihren Obertheilen gänzlich schwarz gefärbt seyn, welches doch vielleicht eine spezifische Verschiedenheit begründet, andere Varietäten aus verschiedenen Provinzen von Süd-america kann man bei *Vieillot* und andern Ornithologen nachlesen, sie bilden vielleicht verschiedene Arten. In Brasilien sind mir keine Varietäten unter diesen Vögeln vorgekommen.

Vieillot sagt, in *Cayenne* baue dieser Vogel ein künstliches Nest, welches an einer Liane aufgehängt sey, wovon ich in Brasilien nichts in Erfahrung gebracht habe.

Swainson hat eine ziemlich gute Abbildung unseres Vogels gegeben. Nach ihm soll

er Insecten und Blumensaft verzehren; das erstere ist gegründet, allein das letztere höchst unwahrscheinlich da er mit seiner kurzen Sängerkunst gar nicht in die Röhren der Blumen eindringen kann. Auch *Swainson* redet von dem hängenden Neste, allein er wird dieses aus *Pieillot's* Schriften entnommen haben.

Sect. 5. D e n t i r o s t r e s.

Z a h n s c h n ä b l e r.

Fam. XII. Muscicipiadae, Vig.

Fliegenfängerartige Vögel.

Die zahlreiche Familie der Fliegenfänger zeichnet sich durch ihren mehr oder weniger breit und platt gedrückten Schnabel aus, und schließt sich sowohl durch Körperbildung als durch Lebensart und übrige Eigenheiten natürlich an die Sänger an, auch kann man beinahe die vollkommene Reihe der Uebergänge von den letzteren bis zu den höchst breit- und plattschnäbeligen *Platyrynchos* und *Todus* darstellen. Die erste Abtheilung dieser Familie bildet den wahren Uebergang zu den Sängern, und zählt eine Menge von Vögeln, welche noch einen ganz artigen Gesang haben, und also auch in dieser Hinsicht einen Uebergang zu den ächten, beinahe stummen und stupiden

Fliegenfänger bilden. Die Breite des Schnabels nimmt bei allen diesen Vögeln immer allmählig zu, sie erreicht in dem Geschlechte *Platyrynchos* die größte Breite, und je mehr diese zunimmt, desto mehr geht Gesang und andere empfehlende Eigenschaften verloren. Die wahren breitschnäbligen Vögel sind einsam, still, entweder ohne bedeutende Stimme, oder haben einen lauten, schreienden Ruf, aber nur gewiss höchst wenige von ihnen singen. Ich nehme für die hier aufgestellte Familie, nebst dem Hauptzuge, daß sie sämtlich insectenfressend sind, folgende Charactere an:

Schnabel an der Wurzel immer mehr breit als hoch, häufig sehr platt gedrückt, die Kuppe des Oberkiefers herabgebogen und mit einem kleinen Zähnchen oder Ausschnitte versehen. *Barbborsten* am Mundwinkel.

Diese Vögel sind in den americanischen Urwäldern höchst zahlreich an Arten und Individuen, indem man sie in allen Gebüsch von mannichfaltiger Art beobachtet. Viele von ihnen gleichen sich aber dennoch im höchsten Grade, und sind nur durch wenige Züge von einander unterschieden. Diese Arten dienen alsdann zum Beweise des Satzes, daß

in Brasilien die Thiergestalten sehr häufig wiederholt sind.

Das Gefieder ist unter den mir vorgekommenen Arten meist einfach gefärbt, grau, olivengrün, braun oder schwärzlich, bei einigen auch lebhaft und schön, sehr viele haben die Untertheile schön gelb gefärbt. Eine merkwürdige Eigenheit, die sehr häufig in dieser Familie vorkommt, und unter diesen Vögeln für America beinahe national ist, da sie auch im nördlichen Theile dieses Continents vorkommt, besteht in der gelben, orangenrothen oder weissen Färbung der Scheitelfedern, welche von andern gewöhnlich schwarz gefärbten Seitenfedern des Scheitels eingefasst, und in der Ruhe häufig bedeckt und verborgen werden; oft sind diese abweichend gefärbten Scheitelfedern an ihrer Spitze wieder von der Farbe der übrigen Obertheile.

Sie nähren sich sämmtlich von Insecten, denen sie meistens still sitzend auf einem isolirten Aste auflauern, steigen zum Theil auch oft nach fliegenden Insecten in die Luft, und fallen auf ihren Standort wieder ein.

Ihr Nestbau ist zum Theil einfach und kunstlos, zum Theil sehr künstlich und von merkwürdig abweichender, ganz ungewöhnli-

cker Bildung. Ich muß schließlic noch be-
merken, daß es ein sehr schwieriges Geschäft
ist, die Vögel dieser Familie scharf und genau
in verschiedene Geschlechter zu theilen. Die
Übergänge sind so allmählig und die Arten so
mannichfaltig, daß auch ich schwerlich hier
dem Kenner zu genügen hoffen darf. Ich be-
schränke mich darauf, die einzelnen Arten ge-
nau und richtig zu beschreiben, die Sonderung
derselben in Gruppen bleibt nachher einem je-
den Leser anheim gestellt.

Anm. Bei dieser, so wie bei einigen andern Familien breit-
schnäbliger Vögel bin ich von dem Grundsätze ab-
gegangen, die Breite des Schnabels auf den Nasen-
löchern zu messen. Wegen des am Mundwinkel häu-
fig sehr breit heraustretenden Kieferrandes nahm ich
bei den genannten Geschlechtern die Breite dieses
Theils bei dem Ende der Stirnfedern, und nicht der
Nasenfedern. Den Höhendurchmesser des geschlos-
senen Schnabels habe ich durchgängig an der Spitze
des Kinrwinkels gemessen.

Gen. 25. *Entomophagus*,

Fliegenstelze.

Der von mir hier als besonderes *Genus*
aufgestellte Vogel hat den Schnabel der Flie-
genfänger und die hohen Beine der Stein-
schmätzer (*Saxicola*), mit welchen er auch

einerlei Manieren und eine ähnliche Lebensart vereinigt, kommt jedoch den Fliegenfängern wieder durch größeres Phlegma näher. Seine Charactere sind folgende.

Schnabel: stark, gerade, kürzer als der Kopf, an der Wurzel ausgebreitet, doppelt so breit als hoch, daselbst mit kaum merklich bogig austretendem Rande; Firste kantig, die Kuppe ein wenig herabgebogen mit sehr kleinem Zähnchen; Dille des Unterkiefers an der Wurzel abgeflacht, alsdann sanft gewölbt aufsteigend; Bartborsten am Mundwinkel.

Zunge: halb so lang als der Unterkiefer, hornartig, an der Spitze nur kaum bemerkbar getheilt.

Flügel: mälsig lang, die zweite und dritte Schwungfeder etwa gleich und die längsten.

Schwanz: abgestuft.

Beine: hoch, die Ferse mehr als noch einmal so lang als die Mittelzehe (ohne ihren Nagel). —

1. *E. mystaceus.*

Die weisse und schwarze Fliegenstelze.

F. Ein Streifen durch die Augen und die Flügel schwarzbraun; Schwanzfedern schwarz mit weissen

Spitzen; Rücken fahl rötlich-grau; ganzer übriger Körper weiß.

Muscicapa mystacea, Spiz. Av. T. 11. pag. 22. Tab.

81. a. Männchen und Weibchen.

Lavandsira im östlichen Brasilien.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel eines *Muscicapa*, Gestalt und Lebensweise einer *Saxicola*. Schnabel beinahe so lang als der Kopf, stark, doppelt so breit als hoch, rundlich dick, Firste kantig, gerade, vorn mit einem kleinen Häkchen herabgebogen, hinter welchem ein kleines Zähnchen befindlich; Nasenhaut befiedert, an ihrem vorderen Ende das eiförmig-rundliche Nasenloch, dessen oberer Rand aufgeschwollen ist; Schnabel an den Seiten geradlinig, am Mundwinkel ein wenig austretend, nur an der Spitze oder dem Häkchen ein wenig zusammengedrückt; Dillenkaute vor dem Kinnwinkel abgeflacht, hinter ihrer Spitze ein wenig kantig und sanft aufsteigend; Kinnwinkel etwa halb Schnabellänge, vorn mälsig abgerundet, befiedert; Bartborsten an Nase und Mundwinkel ziemlich schwach; Zunge halb so lang als der Unterkiefer, hornartig, an der Spitze nur kaum bemerkbar getheilt; Augenlid ziemlich nackt; Flügel mälsig lang, erreichen etwa die Mitte des Schwanzes, sind ziemlich

zugespitzt, die dritte Feder ist die längste, die erste ziemlich lang; Schwanz mäfsig lang, abgestuft, die mittleren Federn abgenutzt; Ferse hoch, beinahe anderthalbmal so lang als die Mittelzehe, mit sechs sehr glatten wenig bemerkbaren Tafeln belegt; äufsere Zehe nur sehr wenig länger als die innere, die beiden äusseren an der Wurzel etwas vereint; Hinterangel bedeutend gröfser als der mittlere.

Färbung: Iris im Auge graubraun; Schnabel, Füfse und der Rachen schwarz; vom Nasenloche läuft durch das Auge bis nach dem Hinterkopf ein nach vorn schwarzer, nach hinten bräunlich-schwarzer Streifen; Kopf, Hals, Unterrücken und alle Untertheile sind weifs, der Ober- und Mittelrücken röthlich-grau; Flügel gänzlich schwarzbraun, Schwungfederschäfte mehr gelbröthlich; Schwanzfedern bräunlich-schwarz, die äusseren mit weissen Spitzen, welche den beiden mittleren fehlen; untere und obere Schwanzdeckfedern sehr lang und schön weifs.

Ammessung: Länge 6" 4^m — Breite 3" 9¹/₂^m — Länge des Schnabels, so weit er entblöfst ist, 6¹/₂^m — Br. d. Schn. 3^m — Höhe d. Schn. 1¹/₂^m — L. d. Flügels etwa 2" 6^m — L. d. Schwanzes etwa 2" 6^m — Höhe der Ferse 10¹/₂^m — L. d. Mittelzehe 5¹/₂^m — L. d. Hinter-

zehe 3^{te} — L. d. äußeren Z. 3^{te} — L. d. inneren Z. 3^{te} — L. d. Mittelnagel 2^{te} — L. d. Hinternagel 2^{te}. —

Weibchen: Der weiße Scheitel ist grau gestrichelt; Seiten der Brust mehr grau; übriges kein Unterschied.

Jünger Vogel: Am Flusse *Itahype* im Monat December erlegt. Auf dem Rücken mehr gelblich überlaufen, die Farben sämtlich mehr unrein und blass, das Weiße beschmutzt; Beine bleifarbig; Schwanz noch kürzer als am alten Vogel; große Flügeldeckfedern mit braunrothen Spitzenenden.

Dieser Vogel hat in Gestalt und Lebensart viel Aehnlichkeit mit den Steinschmätzern (*Saxicola*), ist aber langsamer und träger als unser Weißschwanz (*Saxicola oenanthe*), dabei hat sein Schnabel weit mehr Verwandtschaft mit *Muscicapa*. Er läuft an den Flusasufern schnell auf dem Boden hin, indem er den Schwanz auf und ab bewegt, und die Brasilianer nennen ihn deshalb *Lavandeira* (Bachstelze). Ich habe diese Vögel auch sehr häufig auf Viehtriften bemerkt. Sie sitzen oft lange still auf einem Pfahle, Zaune oder isolirten Aste, um den Insecten aufzulauern, und stellen also in jeder Hinsicht ein vollkommenes

Bindeglied zwischen *Sericola* und *Muscicapa* dar. Am Flusse *Belmonte* bemerkte ich diesen Vogel zuerst, nachher am *Itahype*, auch *Spix* beschreibt ihn aus der Provinz *Bahia*. Eine Stimme habe ich nie von ihm gehört.

Die bekannte *Muscicapa bicolor* hat Aehnlichkeit mit unserem Vogel, scheint aber verschieden, eben so *Azara's* *Dominicain* (Voy. Vol. III. p. 362); denn ich habe unter meinen Vögeln nie Varietäten, und auch alle jungen Vögel schon mit dem schwarzen Augentreffen versehen gefunden. *Azara's* Beschreibung seines *Dominicain* paßt durchaus nicht auf unseren Vogel, dagegen ist derselbe von *Spix* abgebildet und erwähnt worden.

Gen. 26. *Muscicapa*, Linn.

Fliegenfänger.

Ich nehme dieses an Arten und Uebertönen so zahlreiche und daher schwierige Geschlecht, einige Ausnahmen abgerechnet, etwa wie es *Temminck* in seinem *Manuel d'ornithologie* (Vol. II.) aufstellte. Dieses Genus vereinigt eine große Anzahl von Vögeln, welche eine gewisse Hauptähnlichkeit, dabei aber eine Reihe von Abweichungen zeigen, deren Son-

derung durch bestimmte scharfe Unterscheidungsmerkmale sehr schwierig ist. Der Schnabel ist in dem *Linndischen Genus Muscicapa* an der Wurzel ausgebreitet, und geht von der schlanken, dem Sängerschnabel ähnlichen Bildung, bis in die höchst plattgedrückte Gestalt des *Platyrhynchus*-Schnabels über, der mehr als noch einmal so breit ist, als hoch. Seine Seitenränder sind bald geradlinig, bald weniger, bald mehr bogig austretend, und es ist hier keine scharfe Gränzlinie aufzufinden, sondern überall erblickt man allmälige Uebergänge, sowohl in der Körperbildung als in der Lebensart der Fliegenfänger.

Einige Ornithologen haben jetzt angefangen, mehrere Geschlechter aus dieser Familie zu bilden, deren Charactere mir aber nicht bezeichnend genug scheinen. So hat z. B. Herr *Swainson* neuerlich eine Aufzählung der Arten für das *Genus Tyrannus* *) gegeben, welches er sehr natürlich nennt; ich muß aber meiner Ueberzeugung zu Folge sagen, daß ich diese Vögel von den übrigen Fliegenfängern meistens durchaus nicht durch scharf bezeichnende Züge

*) S. *Ferussac's bullet. des sciences natur.*, Avril 1828. pag. 433.

zu unterscheiden weiß. Die von Hrn. *Swainson* aufgeführten Arten sind zum Theil in Bildung und Lebensart wahre Fliegenfänger, und zeigen selbst verschiedenartige Uebergänge.

Da mir diese Eintheilung nicht genügte, so habe ich versucht, die größere oder geringere Zusammendrückung oder Ausbreitung des Schnabels als Kennzeichen anzunehmen, ob ich gleich wohl fühle, daß auch diese nur sehr mangelhaft ist. Mehrere Versuche werden nach und nach auf den richtigen Weg führen. Ich nehme für mein *Genus Muscicapa* folgende Charactere an:

Schnabel: stark, an der Wurzel ausgebreitet, kantig, am Seitenrande geradlinig oder wenigstens nicht bogig austretend, an der Mitte vor oder an der Kuppe mehr oder weniger zusammengedrückt; diese etwas hakenförmig herabgekrümmt, mit einem kleinen Zahne versehen. Bartborsten am Mundwinkel.

Flügel: mälsig lang.

Beine: mälsig lang, oder kurz.

1831. *Am Sngerartige Fliegenfnger.*
Gestalt: angenehm, etwa von Sylvia; Schnabel achlank,
gerade, mssig breit und dick; Ferse mssig hoch.
Sie haben gewhnlich Gesang.

1831. 1. *Muscicapa rivularis.*
Der grau-schneitliche Fliegenfnger.
Fl. Oberkopf dunkel aschgrau, ein weisslicher Strei-
fen ber dem Auge; Obertheile olivengrn; Un-
tertheile weisslichgelb; Brust und Seiten brun-
lich-gelb berlaufen.

Meine Reise nach Bras. Bd. II. pag. 103.
Faill. tabl. enoycl. et mth. pag. 496.

-die Beschreibung des mnnlichen Vogels:
Grsse und Gestalt der *Sylvia atricapilla*.
Schnabel stark, gerade, mssig breit, Spitze
des Oberkiefers sanft hinab gewlbt, mit einem
kleinen Zhnchen; Firste mssig kantig erha-
ben; Nebenlcher in der sanft vertieften Nasen-
haut mit Federn und Bartborsten bedeckt; To-
mianrand nach der Spitze hin ein wenig ein-
gezogen; Unterkiefer gerade, Dillenkante ab-
geflcht und ein wenig sanft aufsteigend; an
jeder Seite des Mundwinkels stehen sechs, sie-
ben bis acht drei und eine halbe Linie lange,
steife Bartborsten; Kinnwinkel abgerundet, be-
fiedert; Zunge ziemlich kurz, vorn an der Spi-
tze ein wenig getheilt; Augenlid sparsam be-

fiedert; Flügel etwas über die Schwanzwurzel hinausfallend, die dritte Feder die längste; Schwanz mälsig lang, wie an den Sängern, nur sehr wenig abgestuft. Beine ziemlich hoch und schlank, Ferse mit fünf bis sechs höchst glatten, grossen, langen Tafeln belegt, Laufsohle scharf zusammengedrückt, glatt gestieft; Nebenzehen ziemlich gleich lang, Hinternagel am grössten.

Färbung: Iris graubraun; Schnabel schwarz; Beine hell gelblich-fleischbraun; Scheitel und Backen dunkel aschgrau, die letzteren etwas weisslich gemischt; über jedem Auge ein weissgelber Streifen; Zügel schwarz; Kinnwinkel gelblich; Kinn und Kehle gelblich-weiss; Brust graugelblich überlaufen; Bauch in der Mitte weiss; Seiten wie die Brust graugelblich-braun, eben so After und Steiss; Hinterkopf, Oberhals und alle Obertheile dunkel olivengrün, in's Zsiggrüne fallend; Seitenfedern des Schwanzes an der inneren Fahne graubraun; Schwungfedern ebenfalls an der inneren Fahne und Spitze dunkel graubraun, übrigens alle diese Theile wie der Rücken.

Ausmessung: Länge 5" 3'" — Breite 7" 3'" — Länge d. Schnabels 4 $\frac{4}{5}$ " — Br. d. Schn. 2 $\frac{1}{5}$ " — Höhe d. Schn. 1 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Flügels 2"

4½'' → L. d. Schwanzes etwas über 2'' — Höhe d. Ferses 10'' — L. d. Mittelzahn 5½'' — L. d. Äußeren Z. 3½'' — L. d. inneren Z. 3½'' — L. d. Hinterzahn 3½'' → L. d. Mittelnagels 2½'' — L. d. Hinternagels 3''.

Weibchen: Von dem Männchen nicht bedeutend verschieden, der Unterleib vielleicht weniger weiß, und der Scheitel etwas blässer.

Dieser niedliche Vogel hat etwa die Gestalt und Lebhaftigkeit eines Sängers (*Sylvia*), z. B. der *Sylvia cyaneola* oder *suscia*, nur ist er schneller und weit beweglicher, er verbindet also mit den vollkommenen Kennzeichen eines *Muscicapa* die Manieren eines Sängers und eignet sich deshalb ganz vortrefflich zu einem Bindegliede beider Geschlechter. Er lebt an den von mir besuchten Flüssen in Brasilien, da wo diese mit Waldungen und dichten Gebüsch bedeckt sind, im dunkelsten Schatten. Die Nähe des Wassers scheint er sehr zu lieben, etwa wie unser Blaukehlchen, und erkriecht in den Ufern und dichten Pflanzen, Reisern und den Uferhöhlen, mit aufgerichtetem Schwanze umher, womit er auch beständig schnellt. Ich fand ihn zuerst am Flusse *Belmonte*, an den einsamen, kleinen, über Gestein und Felsenstücke herabrauschenden *Cor-*

regos oder Waldbächen, welche sich in den Flufs ergießen, hier liefs er seinen Gesang in der kühlen Feuchtigkeit dieser malerischen, wilden Waldscenen hören. Später fand ich ihn ebenfalls sehr häufig an den in den Flufs *Ilhéos* einfallenden kleinen Bächen der grossen Urwälder, wo ich auch sein Nest fand. An den Ufern gröfserer Flüsse, z. B. des *Belmonte*, lebt er in der dichten Verflechtung der dem Wasser nahen Gewächse und Zweige, besonders unter den Baumwurzeln und zwischen dem Ufergestein, wo man ihn umherkriechen und nach seiner Nahrung, den Insecten, suchen sieht.

Diese Vögel leben nur in der Paarzeit gepaart, übrigens einsam. Das niedliche Nest fand ich in der Höhlung der Erde eines Bachufers, nach Art unseres Roth- oder Blaukehlchens, wo es im dunkeln Schatten unter jung hervorwachsenden Cocosblättern und andern schönen Gesträuchen angelegt war. Der Eingang in die Höhlung war ziemlich enge, das Nestchen oben über von der Erde geschützt, sehr nett von dürren Halmen und kleinen Wurzeln tief und glatt gebaut, darin befanden sich zwei weisse, am stumpfen Ende rothpunctirte Eier, am Ende des Monats December. Das

Männchen liefs in der Nähe des Nests beständig seinen Gesang hören, welcher leise beginnt und immer lauter wird, und aus acht bis zehn kurz aufeinander folgenden, gleichartigen, immer an Stärke zunehmenden Tönen besteht. —

Dieser Vogel hat Aehnlichkeit mit *Azara's Tachuris à tête couleur de plomb*, allein er ist viel größer.

2. *M. chrysochloris*.

Der gelb und olivengrüne Fliegenfänger.

Fl. Obertheile olivengrün, Flügel und Schwanz graubraun, die Deck- und Schwungfedern der ersteren breit weißlich eingefasst; ein Streifen über dem Auge und alle Untertheile schön limonengelb.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Kaum kleiner als unsere Nachtigall. Schnabel wie an unsern deutschen Fliegenfängern, gerade, mälsig breit, die Kuppe ein wenig herabgebogen, mit kleinem Zähnchen; Nasenloch ziemlich eröffnet, die Nasenhaut bis dahin befiedert; Kinnwinkel ziemlich abgerundet, die Nasen- und Kinnwinkelfedern endigen in Borsten, streben vorwärts, auch am Mundwinkel stehen kleine Borsten; Flügel zugespitzt, erreichen nicht völlig die Mitte des Schwanzes,

die zweite und dritte Feder sind die längsten; Schwanz ziemlich gleich; Beine ziemlich kurz und schlank, Ferse mit sechs glatten Tafeln belegt; Mittelnagel beinahe so lang als der hintere.

Färbung: Schnabel dunkel hornbraun, am Unterkiefer blässer; Iris graubraun; Beine schwärzlich-braun; Obertheile graulich-olivengrün, eben so die kleinen Flügeldeckfedern; mittlere und große Flügeldeck- und Schwungfedern graubraun, mit starken weißlichen Spitzensäumen, wodurch ein Paar weißliche Querstreifen auf den Deckfedern entstehen; hintere und mittlere Schwungfedern mit gelblich-weißem Saume; Schwanz graubraun, die äußere Feder jeder Seite mit einem gelblich-weißen Rande an der äußeren Fahne; ein starker Streifen, welcher auf der Nase entspringt und über dem Auge weg nach dem Hinterkopfe zieht, so wie alle Untertheile des Vogels vom Kinne bis zum Schwanze sind schön lebhaft gelb, an den Seiten der Brust olivengrün überlaufen; innere Flügeldeckfedern bläsgelb.

Ausmessung nach einem ausgestopften Exemplare: Länge etwa 5" 6 bis 10" — Länge d. Schnabels 5" — Höhe d. Schn. $2\frac{1}{2}$ " — Breite d. Schn. $1\frac{2}{3}$ " — L. d. Flügels 2" 11" — L. d.

Schwanzes 2" 6''' — Höhe d. Ferse 7 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelzehe 5''' — L. d. inneren Z. 3 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äulseren Z. 3 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinterzehe 2 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelnagels 2 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinternagels 2 $\frac{1}{2}$ ''' . —

Weibchen: Die grolsen weilsen Einfassungen der Flügeldeckfedern und mittleren Schwungfedern sind hier sehr stark, bei dem Männchen aber weniger bemerkbar, übrigens alles ziemlich gleich.

Dieser schöne Fliegenfänger ist in manchen Gegenden nicht selten, ich habe ihn besonders häufig auf den Inseln im Flusse *Belmonte* gesehen, wo er auf den Gebüschcn saß, aber auch wie ein Sänger umherkroch, und unsern Wohnungen sehr nahe kam. Von seiner übrigen Lebensart und Manieren kann ich nichts weiter hinzufügen.

3. *M. a g i l i s.*

Der Fliegenfänger mit dem weilsen Augenstreifen.

Fl. Scheitel aschgrau, an den Seiten schwärzlich eingefasst; über dem Auge hin ein weilslicher Streifen; Obertheile hell olivengrün; Schwungfedern graubraun mit grünem Vordersaume; Untertheile weilslich, Seiten olivengrün überlaufen.

Le Gabier d'Azara, Voy. Vol. III. pag. 330.

Lanius agilis, Mus. Berol.

Tamnophilus agilis, Spix Av. T. II. pag. 25. Tab.

34. Fig. 1.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt angenehm und schlank; Schnabel stark, an der Wurzel mälsig breit, von der Mitte an zusammengedrückt; Firste sanft gewölbt, ein über den Unterkiefer herabtretendes Häkchen und kleiner Zahn dahinter; Kinnwinkel beinahe halb Schnabellänge, vorn mälsig abgestumpft, leicht befiedert; Nasenloch klein, länglichrund, in der Mitte der etwas vertieften Nasenhaut; Bartborsten ziemlich zart und schwach; Flügel ziemlich lang, sie reichen etwas über die Mitte des Schwanzes hinaus, sind zugespitzt, die dritte Schwungfeder die längste; Schwanz mälsig stark, schmal, in der Ruhe in der Mitte etwas ausgerandet; Beine mälsig lang, Ferse mit fünf glatten Tafeln belegt, äussere Zehen an der Wurzel vereint; Hinternagel gröfser als die übrigen.

Färbung: Schnabel oben graulich-hornbraun, Unterkiefer grau, der Rand weifslich; Beine bleifarben; Iris graubraun; Scheitel hell aschgrau, von einem weissen, an den Nasenlöchern beginnenden und über dem Auge nach

dem Hinterkopfe ziehenden Streifen, durch eine schwarze Linie getrennt; Zügel schwärzlich-grau; Seiten des Kopfs und Halses, so wie alle Obertheile des Vogels von einem angenehmen, hellen Olivengrün; grofse Deck- und Schwungfedern der Flügel schwärzlich-braun, die äufsere Fahne grün, hinterer Rand der inneren Fahne blafs weifslich-gelb; Schwanzfedern heller graubraun, äufsere Fahne grün; innere Flügeldeckfedern gelblich-grün; Untertheile vom Kinn bis zum Schwanz weifslich, Seiten olivengrün, Brust ein wenig grau überlaufen; Steifs grünlich.

Ausmessung: Länge 5" 5''' — Breite 7" 11''' — L. d. Schnabels $5\frac{1}{2}$ ''' — Breite d. Schn. 2''' — Höhe d. Schn. $1\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Flügels 2" 5 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Schwanzes etwa 1" 9''' — L. d. Mittelzehe 4''' — L. d. äufseren Z. 3''' — L. d. inneren Z. 2''' — L. d. Hinterzehe $2\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelnagels $1\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinternagels $1\frac{2}{3}$ ''' — L. d. äufseren N. $\frac{2}{3}$ ''' — Höhe d. Ferse 6 $\frac{1}{2}$ ''' —

Weibchen: Weniger nett und schön gefärbt als das Männchen, übrigens kein bedeutender Unterschied.

Ausmessung: Länge 5" 1''' — Breite 7" 9''' —

Junger Vogel: Es fehlen hier die deutlichen Kopfstreifen, übrigens ist kein bedeutender Unterschied von dem Alten.

Dieser niedliche Vogel ist von *Azara* zuerst beschrieben, später bald unter die Würger (*Lanius*), bald in andere Geschlechter versetzt worden, auch hat er in seiner Bildung so viel Aehnlichkeit mit den letzteren, als mit den Sängern und Fliegenfängern, doch würde ich ihn nicht zu den Batare's (*Tamnophilus*) setzen. In der Lebensart hat er die meiste Verwandtschaft mit *Sylvia*, und ich glaube deshalb, daß man ihn in deren Nähe zu den Fliegenfängern bringen könne. Er ist überall in den von mir bereisten Gegenden gemein, belebt die Gebüsche wie die großen Wälder, und hat einen ziemlich unbedeutenden Gesang. Sein Nest erbaut dieser Vogel sehr niedrig. Ich fand dasselbe im Monat December. Es fand sich in der Gabel eines Astes frei schwebend befestigt, wie das unseres Pirol's (*Oriolus galbula*, Linn.). Die Gestalt des Nestes selbst war die gewöhnliche, halbkugelförmig, aber ziemlich tief, von hell grünen Tillandsia-Fäden oder Fadenflechten und weißer Wolle, aus Baum- und Pflanzenwolle erbaut, und sehr stark mit breitem Bast und Grasblättern durchwebt, inwendig sehr nett

und glatt mit dünnen Grashalmen ausgelegt; die fünf Jungen, welche sich in dem Neste befanden, hatten das oben angegebene Gefieder.

Dr. v. Spix bildet unseren Vogel auf seiner 84ten Tafel Figur 1. ab. —

B. Kurzschnäbelige Fliegenfänger.

Gestalt etwa von *Sylvia*, Schnabel klein, kurz, an der Wurzel ziemlich breit. Sie sind zum Theil niedliche Vögel.

4. *M. brevirostris.*

Der kurzschnäbelige Fliegenfänger.

Fl. Schnabel sehr kurz; Oberkörper olivengrau; auf den Deckfedern der Flügel drei weißliche Querstreifen; Schwungfedern gelblich-weiß gerandet; Kinn, Kehle und Unterhals weißgrau, übriger Unterleib sehr blaß limonengelb.

? *Platyrrhynchus paganus*, Spix Av. Vol. II. pag. 18.
Tab. 16. Fig. 1.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel kurz, in der Mitte und hinter der Spitze zusammengedrückt, etwa um ein Drittel so breit als hoch; Firste gerade, ziemlich scharf erhaben, nach der Spitze hinab gewölbt, nur sehr wenig über den Unterkiefer hinab tretend, mit einem kleinen Einschnitt oder Zähn-

chen; Dille des Unterkiefers nach der Spitze hin sehr sanft aufsteigend, rundlich abgeflacht; Nasenloch weit, rundlich-eiförmig, ein wenig mit Borstfedern bedeckt; Kinnwinkel etwas über ein Dritttheil der Schnabellänge, abgerundet, an der Spitze mit vorstrebenden Borstfedern bedeckt; die Flügel erreichen etwa ein Dritttheil des Schwanzes, sind mäßig zugespitzt, die erste Feder die kürzeste, die vierte die längste, die dritte und vierte ziemlich gleich lang; Schwanz stark, aus ziemlich langen, schmalen Federn bestehend, in der Mitte kaum merklich ausgerandet; Beine ziemlich kurz, Ferse etwa anderthalbmal so lang als die Mittelzehe, mit sechs glatten Tafeln belegt; Hinternagel am größten; Scheitelfedern dicht, lang und buschig, können im Affecte ein wenig aufgerichtet werden.

Färbung: Schnabel und Füße dunkel hornfarben-fleischbraun; Rachen blafs gelb; Iris graubraun; alle Obertheile des Vogels olivengrau, auf Kopf und oberen Schwanzdeckfedern etwas dunkler, auf dem ersteren zuweilen ein wenig gestrichelt; Flügel dunkel graubraun, die großen Deck- und hinteren Schwungfedern mit schmutzig weißem, breitem Spitzensaume, wodurch drei breite weißliche Querstreifen

auf den Deckfedern entstehen; mittlere und vordere Schwungfedern mit blaß gelblichem Vordersaume; Schwanz dunkel graubraun, die äußeren Rändchen der Federn etwas olivengrün; Kinn weißlich; Kehle, Unterhals und Oberbrust hell weißgrau oder blaß aschgrau; Unterbrust und alle Untertheile bis zum Schwanz hell blaß limonengelb.

Ausmessung: Länge 6" — Breite 9" — 4"
— Länge d. Schnabels $3\frac{1}{2}$ " — Breite d. Schn. $2\frac{1}{2}$ " — Höhe d. Schn. $1\frac{1}{2}$ " — L. d. Flügels 8" 1" — L. d. Schwanzes 2" 9 bis 10" — Höhe d. Ferse 8" — L. d. Mittelzehe $4\frac{1}{2}$ " — L. d. äußeren Z. $3\frac{1}{2}$ " — L. d. inneren Zehe $3\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinterzehe $2\frac{1}{2}$ " — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{2}$ ". —

Weibchen: Die ganze Brust ist hier aschgrau und blaß gelblich gestrichelt, übrigens kein bedeutender Unterschied an beiden Geschlechtern.

Junge Vögel: Sie haben weniger grünlichen Anstrich, und ihre Flügelränder sind bloß schmutzig weißlich.

Dieser Vogel ist ein ächter Fliegenfänger, und überall ziemlich gemein. Ich fand ihn häufig nahe um Rio de Janeiro, und er ließ sich ohne Furcht sehr nahe kommen. Er ist

ein stiller phlegmatischer Vogel, wie die meisten verwandten Arten, und ich habe keine Stimme von ihm gehört.

Spix hat einen *Platyrynchos brevirostris* (T. II. Tab. 15. Fig. 1. pag. 13.), den ich abez auf meinen *Muscipeta Asilus* deuten möchte; dagegen scheint Spix's *Platyrynchos paganus* hierher zu gehören, und nur die Länge des Schnabels weicht von der meines Vogels ab, ein kleiner Unterschied kann hier indels durch die Art zu messen herbeigeführt werden.

C. Menckner'sige Fliegenfänger.

Ähnlichkeit mit Pipra. Schnabel mäfsig stark, wenig breit, ziemlich kurz und gewölbt; Flügel ziemlich kurz, Schwanz mäfsig stark.

5. *M. virescens.*

Der braungrüne Fliegenfänger.

Fl. Schnabel kurz und schmal; Körper dunkel schmutzig olivenfarben, Flügel und Schwanz röthlich-braun; Ferse etwas mehr als ein Dritttheil länger als die Mittelzehe.

Beschreibung des weiblichen Vogels:
Ein gedrungener, starker Vogel von der Grösse einer Lerche. Kopf dick, Flügel kurz, Schwanz

mäßig lang, aber stark, Beine ziemlich hoch, nachserfürtig erhaben, hinter der Kruppe etwas zusammengegedrückt, mit etwas eingezogenen Toes; Hinterste nach der Kruppe mäßig gewölbt, kaum merklich über dem Hinterkiefer herabretend, seit einem Ausschnitte hinter der Kruppe; Nasenloch wie an den übrigen Arten, mit verhältnißmäßig sträubenden, haarartig endenden Federn beinahe bedeckt; Dille sehr sanft aufsteigend, vor dem Kinnwinkel flach, nachher rindlich kantig; Kinnwinkel etwas über ein Drittel der Schnabellänge, ziemlich abgerundet, mit borstig endenden Federn bedeckt; Mundwinkel mit vielen langen, zarten Bartborsten bis unter das Auge hin besetzt; Zunge vorn ein wenig gespalten; Augenlid mit kleinen Federn sparsam besetzt; Flügel kaum ein Drittel der Schwanzlänge, die vierte Feder die längste; Schwanz mäßig lang, äußere Federn sehr wenig kürzer, daher ist er nur sehr schwach abgerundet; Ferses etwas mehr als ein Drittel länger als die Mittelzehe, mit sechs glatten Tafeln belegt, von welchen die obere größtentheils noch befiedert ist; zwei äußere Zehen mit ihren zwei Wurzelgelenken verwachsen; Hinter- und Mittelnagel groß.

Färbung: Oberkiefer und Spitze des un-

teren horngrau-braun, Wurzel des unteren bleifarben; Iris graubraun; Beine bräunlich-bleigrau, ganzes Gefieder dunkel schmutzig-olivengrün, am Rücken und den Seiten der Brust ein wenig mehr bräunlich überlaufen, in der Gegend des Auges etwas mehr in's Aschgrau fallend; Flügel und Schwanz schmutzig röthlich-braun, olivenfarben überlaufen; obere kleinere Flügeldeckfedern wie der Körper, die mittleren schon größeren mit röthlich-olivengrauen Rändern; innere Schwungfederfahnen dunkel graubraun; Steiße ein wenig röthlich überlaufen; innere Flügeldeckfedern bleis röthlich-olivengrau.

Ausmessung: Länge 6" 3''' — Breite 9" 3''' — L. d. Schnabels $4\frac{2}{3}$ ''' — Breite d. Schn. $2\frac{1}{2}$ ''' — Höhe d. Schn. 2''' — L. d. Flügels 2" 10 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Schwanzes 2" 3''' — Höhe d. Ferse 9''' — L. d. Mittelzehe $4\frac{2}{3}$ ''' — L. d. äußeren Z. $3\frac{1}{2}$ ''' — L. d. inneren Z. $2\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinterzehe $3\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinternagels 3''' —

Dieser Vogel hat in seinem Schnabel eine geringere Breite und mehr Höhe als die eigentlichen Fliegenfänger, auch ist dieser Theil etwas zusammengedrückt, wodurch er den Uebergang zu den *Pipra's* und *Cotinga's* zu machen

scheint, ich kann ihn aber doch nirgends anders hinsetzen, als in das *Genus Muscivora*, da er auch in der Lebensart vollkommen mit diesen Vögeln übereinstimmt. Ich erhielt diese Species nur einmal während der Dauer meiner Reise, und zwar den beschriebenen weiblichen Vogel, in den Wäldern und Gebüschern der Gegend des *Arraial da Conquista* im Innern der Provinz *Bahia*.

In seinen Farben hat dieser Vogel viel Aehnlichkeit mit *Spix's Platyrynchos ruficauda* (*Spix*, T. II. pag. 9. Tab. 11. Fig. 1.), und letzterer könnte in dieser Hinsicht wohl der männliche Vogel seyn; allein der Name *Platyrynchos* würde nicht auf meinen Vogel passen, der unter allen mir bekannten brasilianischen Arten des Geschlechts *Muscivora*, wie gesagt, den am wenigsten breiten Schnabel trägt, ich vermuthe daher, daß bei den vielen in Brasilien vorkommenden Wiederholungen der Thiergestalten, diese beiden Vögel einander nur ähnlich, dennoch aber verschiedener Art sind.

D. Cotingaartige Fliegenfänger.

Schnabel stark, dick, ziemlich kurz, gewölbt; Flügel stark und ziemlich lang; Schwanz meistens stark; Ferse ziemlich kurz. Stimme meist sonderbar und laut.

6. *M. plumbea*, Illig.

Der lautrufende Fliegenfänger.

Fl. Grösse einer Amsel; Gefieder aschgrau, am Unterleibe blässer, dabei etwas bräunlich überlaufen; Flügel und Schwanz bräunlich überlaufen.

Murciocope vociferans.

Meine Reise nach Bras. B. I. p. 242. B. II. p. 112.

Sebastiam oder Sabiak do mate virgem im östlichen Brasilien.

Qui-qui-niech botocudisch.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel stark, dick, kürzer als der Kopf, anderthalbmal so breit als hoch, Firste nur höchst sanft gewölbt, nach der Spitze hinab geneigt und in kurzem Haken über den Unterkiefer herabtretend, dahinter ein kleiner Ansehnitt oder Zähnchen; Nasenloch wie an den übrigen Arten, eiförmig, zum Theil ein wenig mit Borstfederchen bedeckt; Unterkiefer unten abgerundet, die Dille nur an der Spitze ein wenig kantig, und auch der Unterkiefer zeigt vor seiner Spitze oder Kuppe einen kleinen Aus-

schnitt, Kinnwinkel breit, groß, abgerundet; an der Spitze sparsam besetzt; die Federn mit Borsten endigend; Mundwinkel und Nase mit Borsten versehen; Rachen weit; Zunge pfelförmig, noch nicht halb so lang als der Schnabel, an der Spitze mit mehreren kleinen Fransen; Körper gestreckt, die etwas langen Scheitelfedern können aufgerichtet werden; Schwanz lang und gleich, nur in der Mitte ein wenig ausgerandet, mit zwölf starken Federn, etwa wie an *Turdus Merula*; die Flügel erreichen nicht völlig das erste Drittheil des Schwanzes, die erste Schwungfeder ist die kürzeste, die vierte die längste, aber die fünfte nur kaum merklich kürzer; Beine kurz; Ferse nicht viel länger als die Mittelzehe, mit sieben bis acht Tafeln belegt und ein wenig unter den Fußbeuge befiedert; Hinter- und Mittelfeder groß, der hintere am größten; zwei äußere Zehen vereint, äußerste länger als die innerste.

Färbung: Iris dunkel graubraun, nach der Pupille hin mehr aschgrau; Schnabel schwärzlich-brann, an der Wurzel des Unterkiefers blässer; Rachen lebhaft hochgelb; Beine grünlich aschgrau; ganzes Gefieder unansehnlich aschgrau, an den Obertheilen etwas dunkel, an den unteren blässer; Kopf und Hals etwas gelblich oder

bräunlich angeflogen, eben so Rücken und Schultern, jedoch kaum bemerkbar; große Deck- und Schwungfedern dunkel aschgräubräunlich, etwas bräunlich gerandet, an dem inneren Fahnenrande etwas weißlich; Schwanz eben so, nur ungerandet, aber mit weißlichen Federkielen; alle Untertheile hell aschgrau, Brust und Unterhals am dunkelsten, an den Spitzen der Federn stark gelblich; Bauch weißlich - grau mit gelblichen Federspitzen, bald mehr, bald weniger.

Ausmessung: Länge 9" 11''' — Breite 14" 6''' — L. d. Schnabels 8''' — Br. d. Schn. 5''' — Höhe d. Schn. 3''' — L. d. Flügels 4" 8 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Schwanzes etwas über 4" — Höhe d. Ferse 8 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelzehe 6''' — L. d. äußeren Z. 4 $\frac{1}{8}$ ''' — L. d. inneren Z. 3 $\frac{3}{4}$ ''' — L. d. Hinterzehe 3 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Mittelnagels 3''' — L. d. äußeren N. 2''' — L. d. Hinternagels 3 $\frac{1}{5}$ '''.

Weibchen: Von dem Männchen sehr wenig verschieden.

Dieser Vogel überrascht den reisenden Fremdling in den brasilianischen Urwäldern durch seine höchst laute, sonderbare Stimme. Ich habe diese Thiere bloß in der Gegend des *Mucuri*, am *Alcobaça* und in der alten verwilderten Waldstraße des *Capitão Filisberto*, im-

mer aber in dicht geschlossenem, hohem und schattenreichem Urwalde gefunden, wo alsdann immer eine Menge dieser Vögel zugleich ihre Stimmen hören ließen. Sie sitzen ziemlich hoch, etwa vierzig bis fünfzig Fuß hoch, auch wohl noch niedriger, nach Art der ächten Fliegenfänger meistens unbeweglich auf einem Aste, worin sie auch mit den Cotinga's Aehnlichkeit haben, und man erkennt sie, ihres upansehnlich grauen Gefieders wegen, nur schwer, gewöhnlich nur durch Hülfe ihrer lauten Stimme. Diese beginnt mit zwei sehr lauten, ziemlich tiefen und vollen Piffen, welche allmählig herabsinken, und nun folgt sogleich ein dreistimmiger sehr lauter Piff, nach Art unserer Schäfer.

Ich habe es versucht, diese Stimme etwa auf nachfolgende Art in Noten auszudrücken:



Anm. Am deutlichsten auf der A Seite mit einem Finger auf der Violine abziehen.

Da diese Vögel gewöhnlich gesellschaftlich und in Menge vereint sind, so machen ihre Stimmen einen solchen Lärm, daß der ganze Wald davon wiederhallt und der fremde Jäger bei diesem Concerte sich des Staunens nicht enthalten kann. Als wir zum erstenmal uns in der Mitte einer Gesellschaft solcher Vögel befanden, blickten wir uns befremdet an und sprangen sogleich von unseren Pferden, um die Bekanntschaft dieser sonderbaren Gäste zu machen. In ihren Mägen fand ich Ueberreste von Insecten. Ihren Nestbau habe ich leider nicht kennen gelernt.

An den Flüssen *Mucuri* und *Alcobaça* belegt man diesen Vogel mit der Benennung *Sebastião* oder *Sebastiam*, in *Minas Geraës* trägt er den Namen *Sabiah do mato virgem* oder Drossel des Urwaldes.

7. *M. sibilatrix*.

Der pfeifende Fliegenfänger.

Fl. Körper aschgrau, hier und da bräunlich überlaufen; Flügel und Schwanz bräunlich-grau, grobe Deck- und Schwanzfedern mit weißgelblichen Spitzen; mittlere kleine Flügeldeckfedern oliven-

grün; kleine Deckfedern am humerus und Flügelbuge, so wie die Seiten der Brust, gelb.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel dick, stark, gerade, ziemlich kurz, mäßig breit, Firste kantig erhaben, an der Spitze hinab gewölbt, mit der Kuppe ein wenig über den Unterkiefer herabtretend und einem kleinen Zahne dahinter; Schnabel vor der Spitze nur ein wenig zusammengedrückt; Unterkiefer mit abgerundeter sehr sanft aufwärts gewölbter Dillenkante, vor der Spitze der Kieferrand mit einem kleinen Ausschnitte versehen; Nasenloch lateral, beinahe gänzlich von den Nasenfedern bedeckt; Kinnwinkel mehr als ein Drittheil, groß, breit, mit borstig endenden Federn bedeckt; Bartborsten am Mundwinkel nicht stark; Auge groß und lebhaft; Augenlid befiedert; Flügel lang und schlank, zugespitzt, erreichen beinahe die Mitte des Schwanzes, die vierte Feder ist die längste; Schwanz stark, breit wie bei den Drosseln (*Turdus*), äußere Federn nur wenig kürzer, daher erscheint er sanft abgerundet; Beine kurz und schwach; Ferse etwa mit fünf glatten Tafeln belegt, kaum um ein Drittheil länger als die Mittelzehe; äußere Zehen mit den zwei Wurzelgliedern vereint, Hinterzehe etwa so lang

als die äußerste; Mittel- und Hinternagel grofs.

Färbung: Iris graubraun; Schnabel bräunlich-schwarz, Wurzel des Unterkiefers blässer; Beine fleischbraun; ganzer Körper aschgrau, olivengrünlich überlaufen, an den Untertheilen blässer, besonders an Bauch, After und Steifs; grofse Deck-, Schwung- und Schwanzfedern dunkel graubraun, mit grünlich-grauer oder röthlich-graubrauner Vorderkante; die ersten, so wie die Schwanzfedern, deren beide mittlere ausgenommen, mit fahl röthlich-weißen Spitzenfleckchen; kleine Flügeldeckfedern lebhaft olivengrün, darüber aber befindet sich an dem Flügelbuge und *humerus* ein schön citrongelber Fleck, und ein ähnlicher bedeckt die Brust an jeder ihrer Seiten; Bauch und Oberbrust ein wenig gelblich überlaufen; Spitzen der unteren Schwanzdeckfedern gelbröthlich. —

Ausmessung: Länge 8" 3''' — Breite 13" 3''' — L. d. Schnabels $6\frac{1}{2}$ ''' — Br. d. Schp. $3\frac{1}{4}$ ''' — Höhe d. Schn. 3''' — L. d. Flügels 4" 1 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Schwanzes 3" 4''' — Höhe d. Ferse $7\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Mittelzehe $5\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äußeren Z. $4\frac{2}{5}$ ''' — L. d. inneren Z. $3\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Hinterzehe $4\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelnagels 3''' —

L. d. äußeren N. 11^{'''} — L. d. Hinternagels 3½^{'''}. —

Andere Männchen gleichen dem vorher beschriebenen vollkommen, allein die Farbe ist heller und mehr rein aschgrau, besonders auch alle Obertheile blässer, und die gelben Federn an Schultern und Seiten der Brust sind nicht citrongelb, sondern röthlich-braungelb, oder etwa lebhaft orangen-bräunlich.

Dieser Vogel bewohnt bloß die dunkeln Schatten der geschlossenen Urwälder, wie der vorhergehende, und sitzt gewöhnlich stille. Seine Stimme ist ein feiner, zarter Pfiff, daher man ihn mit allem Rechte den Pfeifer nennen kann. Ich habe diese Species bloß in den ruhigen, geschlossenen Waldungen an der alten Straße des *Capitao Filisberto* beobachtet, und hier besonders an schauerlich einsamen, selten besuchten Stellen, in stillen, tiefen, dunkeln Thälern, in der Nähe wild herabrauschender *Corregos* oder kleiner Waldbäche, die nie vom Tritte des Europäers, vielleicht höchst selten einmal von dem Fuße des jagenden *Canacian*-Indianers beunruhigt werden. Das Nest dieses stillen einsamen Vogels habe ich nie zu finden das Glück gehabt.

8. *M. squamata*.

Der Fliegenfänger mit wellenstreifigem Bauche.

Fl. Scheitel schwarz; Oberleib zeisiggrün; Schwungfedern und Schwanz schwarzbraun mit grünen Rändern; Untertheils gelb mit schwarzen Wellenlinien.

Lanius squamatus, Licht.

Beschreibung des weiblichen Vogels: Körper gedrunken, Kopf dick, Flügel lang, Schwanz ziemlich kurz. Schnabel kurz, gerade, schmal, nur höchst wenig breiter als hoch, Firste kantig, an der Spitze herabgebogen, mit kleinem über den Unterkiefer herabtretenden Haken, dahinter mit einem Zahne; Nasenloch eiförmig, ziemlich weit, von den vorstrebenden, borstig endenden Nasenfedern halb bedeckt; Unterkiefer am Kinnwinkel abgeflacht, gegen die Spitze hin abgerundet, vor derselben am Tomienrande mit einem kleinen Ausschnitte versehen; Kinnwinkel kaum ein Drittheil der Schnabellänge; mit borstig endenden Federn besetzt; mälsig starke schwarze Bartborsten am Mundwinkel, auf dem Zügel und, wie gesagt, oben und unten den Schnabel umgebend; Auge grofs; Augenlid sparsam befiedert; Flügel stark, lang und ziemlich zugespitzt, sie erreichen das letzte Drittheil des Schwanzes, die dritte Feder

scheint die längste zu seyn; Schwanz ziemlich kurz; schmal, gleich, aus zwölf nur wenig zugespitzten Federn bestehend; Beine mäsig hoch; Füße mit fünf bis sechs glatten Tüfeln belegt, um ein Dritttheil länger als die Mittelzehe; äußere Zehen an der Wurzel vereint; die äußerste länger als die hinterste; Mittel- und Hinternagel groß. *Farbung:* Augedunkel; Schnabel am Oberkiefer schwarzbraun, am unteren röthlich-weiß; Beine bräunlich-fleischfarben; der ganze Oberkörper schwarz, auf dem Rücken ein wenig ins Olivengrünliche ziehend; die Federn des Scheitels etwas lang und dicht; Sittens des Kopfes, Halses und aller Obertheile des ganzen Vogels zeitig grün, ebenso die mittlere Schwanzfedern; große Deckfedern, Schwungfedern und alle übrigen Schwanzfedern schwämmlich-graubraun, an der Vorderflanke grün wie der Rücken; Untertheile vom Kinn bis zum Schwanz gelb, mit starken, schwarzen, bogigen Wellenlinien, die am Steiße blässer und verloschener, an der Brust am stärksten und dichtesten stehen; innere Flügeldeckfedern hell gelb.

Ausmessung: Länge 6¹¹/₁₆ bis 7¹/₁₆ — L. d. Schnabels 6¹/₂ — Br. d. Schn. 3¹/₁₆ — Höhe d. Schn. 2¹/₂ — L. d. Flügels 3¹/₁₆ 8¹/₂ — L. d.

Schwanzes 2" 4''' — Höhe d. Ferse 3 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Mittelzehe 5 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. äußeren Z. 3 $\frac{7}{8}$ ''' — L. d. inneren Z. 3 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Hinterzehe 3 $\frac{4}{5}$ ''' — L. d. Mittelnagels 3''' — L. d. äußeren N. 2''' — L. d. Hinternagels 3 $\frac{1}{4}$ '''.

? *Männchen*: Ich halte einen Vogel meiner Sammlung für das Männchen der beschriebenen Art, der in allen Stücken dem vorhergehenden gleicht, allein dessen Untertheile viel lebhafter gelb und weit weniger mit schwarzen Wellen bezeichnet sind; Kinn und Kehle sind ungefleckt gummiguttgelb, eben so die Mitte der Brust und des ganzen Unterleibes; an den Seiten dieser Theile bemerkt man überall die schwarzen, jetzt meistens kurzen Wellenlinien; und auf dem Unterhalse an der oberen Gränze der Brust laufen noch einige schwarze Wellenstreifen quer über diesen ganzen Theil. Das Geschlecht wurde an diesem Exemplare durch Zufall nicht untersucht.

Dieser Vogel ist von meinen Jägern mehrmals im Urwalde erlegt worden, allein als ein stilles, einsames Thier ist er schwer zu beobachten, und ich kann über seine Lebensweise nichts weiter hinzufügen.

Er. Schlankschnäbelige Fliegenfänger:
Schnabel stark, ziemlich schlank, zuweilen kaum höher als breit.

9. *M. t u r d i n a.*

Der drosselartige Fliegenfänger.
Fl. Schnabel etwas breiter als hoch; ganzes Gefieder olivenbraun, an den Obertheilen dunkler, an den Flügeln etwas röthlich überlaufen; Grösse beinahe die eines Staares.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt etwas drosselartig, allein der Kopf dick. Schnabel kurz, etwas höher als breit, gerade, von der Mitte an zusammengedrückt; Firste kantig, an ihrem Vordertheile hinab gewölbt, mit sehr kleinem, kaum übertretendem, aber zugespitztem Häkchen und einem höchst kleinen Ausschnitte dahinter; Rand des Oberkiefers ein wenig eingezogen; Nasenloch länglicheiförmig, von den borstig endenden Nasenfedern etwa zur Hälfte bedeckt; Kinnwinkel beinahe halb Schnabellänge, mässig abgerundet, befiedert, die Federn mit schwarzen Borstspitzen, übrigens zerschlossen; Bartborsten am Mundwinkel und am Unterkiefer, sie sind ziemlich schwach, schwarz; unteres Augenlid nackt, am Rande mit Wimperfederchen besetzt; Flü-

gel ziemlich stark, sie erreichen beinahe die Mitte des Schwanzes, die erste Feder ist kurz, die dritte und vierte die längsten; Schwanz gleich, ziemlich stark; Beine mälsig hoch; Ferse mit fünf glatten Tafeln belegt, welche sich an der zusammengedrückten Fersensohle schließen, indem sie das Bein rund umgeben; äußere Zehen am Wurzelgliede verwachsen; Hinterzehe schlank, ihr Nagel ist der größte von allen.

Färbung: Schnabel schwärzlich-braun, an der Wurzel heller graubräunlich; Beine Fleischbraun, im Leben vielleicht bleifarben; ganzes Gefieder olivenbraun, an den Obertheilen am dunkelsten, mehr in's Braune, an den Untertheilen mehr in's Olivengrüne ziehend; Brust olivenbraun, allein etwas mehr in's Gelbbraune, Flügel und Schwanz mehr in's Röthlich-olivengrün ziehend; alle Schwungfedern sind an der inneren Fahne schwärzlich-braun, an der vorderen röthlich-olivengrün gerandet; innere Flügeldeckfedern fahl graulich-olivengrün; Schwanz olivenbraun, olivengrünlich gerandet.

Anmerkung: Länge zwischen 6 und 7^u
— L. d. Schnabels 5^u — Höhe d. Schn. 2 $\frac{1}{2}$ ^u
— Br. d. Schn. 2 $\frac{1}{2}$ ^u — L. d. Flügels 3^u 7^u —
L. d. Schwanzes etwa 2^u 9^u — Höhe d. Ferses 10^u — L. d. Mittelzehe 5 $\frac{1}{2}$ ^u — L. d. äußeren

Z. $4\frac{1}{2}''$ — L. d. inneren Z. $3''$ — L. d. Hinterseele $3\frac{1}{4}''$ — L. d. Mittelnagels $3''$ — L. d. äußeren N. $1\frac{1}{4}''$ — L. d. Hinternagels $3'''$. —

Dieser Vogel ist mir von meinen Jägern nur todt überbracht worden, und ich konnte seine Beschreibung nicht sogleich entwerfen, weshalb ich dieses an dem ausgestopften Vogel nachholen mußte. Er lebt in allen von mir betretenen brasilianischen Gegenden in den Wäldern.

10. *M. comata*, Licht.

Der schwarze gehäubte Fliegenfänger.

Fl. Ein Busch von schmalen, aufwärts gekrümmten Federn auf dem Scheitel; ganzes Gefieder schwarz mit blauem Stahlglanze; innere Fahne der Schwungfedern halbweiß; Iris blutroth.

Muscicapa lophotes, Temm.

Muscic. gelvata, Spix T. II. pag. 20. Tab. 27.

? — *nigerrima*, Vieill. tabl. enyel. et mèch. p. 623.

Beschreibung des alten weiblichen Vogels:

Größe etwa von einem Stare, aber schlanker und der Schwanz länger. Schnabel stark, gerade, Kuppe herabgebogen, mit einem kleinen Zahne; Nasenloch klein, eiförmig, die Nasenhaut bis zu ihnen befiedert; Kinnwinkel ein Drittheil der Schnabellänge, abgerundet, befiedert;

Mundwinkel mit mäÙig langen Bartborsten besetzt; Zunge kurz, vorn ein wenig gefrñst; Augenlid ziemlich nackt; Flügel stark und ziemlich lang, erreichen etwa die Mitte des Schwanzes, die vierte (wahrscheinlich die dritte Feder) ist die längste; der Schwanz geschlossen ein wenig ausgerandet; Beine mäÙig hoch, Zehen schwach und schlank; Ferse mit sechs glatten Tafeln belegt, Zehenrücken gefältelt; Mittel- und Hinternagel schlank; Federn des Scheitels bei dem alten Vogel schmal lanzettförmig zugespitzt, auf der Mitte desselben beinahe eilf Linien lang und einzeln aufwärts gekrümmt, wie an *Parus cristatus*, wodurch ein aufgerichteter, vorwärts gekrümmter Federbusch entsteht.

Färbung: Iris hoch kirsch- oder blutroth; Schnabel bräunlich-schwarz; Rachen hell orangengelb; Beine schwarz; ganzes Gefieder ohne Unterschied schwarz, mit schön dunkelblauem Stahlglanze nach dem Lichte; vordere Hälfte der Schwungfedern mit innerer halb weißer Fahne, die Spitzenhälfte schwarz; hintere Schwungfedern gänzlich schwarz.

Ausmessung: Länge 8" 3'" — L. d. Schnabels 6½'" — Br. d. Schn. 3'" — Höhe d. Schn. 2½'" — L. d. Flügels 4" 7½'" — L. d. Schwanz

nas. 3" — Höhe d. Fasse 9½" — L. d. Mittelz. 3½" — L. d. äußeren Z. 4½" — L. d. inneren Z. 4" — L. d. Hinterz. 3½" — L. d. Mittelnagels 3" — L. d. Hinternagels 3" — L. d. äußeren N. 1½". —

Männchen: Von dem weiblichen Vogel scheinbar nicht verschieden, nur der blaue Stahlglanz ist lebhafter.

Junges Männchen: Iris graubraun, Gefieder weniger blau glänzend, die Haube noch klein.

Noch jüngerer Vogel: Gefieder ohne Glanz, mehr schmutzig bräunlich überlaufen, die Haube fehlt gänzlich.

Dieser schöne Fliegenfänger ist mir im inneren Brasilien, und zwar an den Grenzen der Provinzen *Minas* und *Bahia* im *Campo Geral* vorgekommen, wo er häufig war. *Spix* traf ihn südlich in der Provinz *S. Paulo*. Man sieht diesen Vogel beständig auf der Spitze eines Strauches sitzen und auf Insecten lauern, auch ließ er hier nicht selten seinen nicht unangenehmen Kehlgesang hören. — Die brasilianischen Portugiesen nennen ihn *Melro* (Amsel), wegen seiner Größe und des schwarzen Gefieders. *Spix* bildet ihn ab, allein Schnabel und Stellung sind nicht gut, eben so die Beine,

wie an allen Abbildungen des ornithologischen Theils jenes Werkes. Die Iris ist schwarzbraun, da sie doch in der Natur eine sehr verschiedene Farbe hat. — Der junge Vogel soll, nach *Spix*, eine kastanienbraun gestrichelte Kehle haben, welches an meinen Exemplaren sich nicht zeigt.

11. *M. leucocephala*.

Der weifsköpfige Fliegenfänger.

Fl. Körper durchaus schwarz, Kopf rein weifs. Weibchen an Stirn und Untertheilen weiflich, an den oberen bräunlich-grau; Flügel und Schwanz schwärzlich.

Todus leucocephalus, *Pall.*, *Lath.*

Muscicapa dominicana, *Spix* pag. 21. Tab. 29. Fig. 2.

Männchen. Tab. 30. Fig. 2. Weibchen.

La tête blanche d'Azara, *Voy.* Vol. III. pag. 363.

Platyrhynchus leucocephalus, *Vieill.*

Meine Reise nach Bras. Bd. I. an versch. Stellen.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel stark, gerade, so lang als der Kopf, ziemlich breit, auf der Firste ziemlich abgerundet, Kuppe etwas hakenförmig herab gewölbt, mit einem kleinen Zähnchen oder Ausschnitte; Nasenlöcher eiförmig, die Nasenhaut bis zu ihnen befiedert; Dille stark abgeplattet, nur

höchst wenig aufsteigend, Kinnwinkel halb so lang als der Unterkiefer, breit, groß, abgerundet, an der Spitzenhälfte sparsam befiedert; die Flügel erreichen beinahe die Mitte des kurzen, ziemlich gleichen Schwanzes, dritte Schwungfeder die längste, die vierte nur sehr wenig kürzer; Beine mälig hoch; Ferse mit sechs bis sieben glatten Tafeln belegt; Hinter- nagel bei weitem der größte.

Färbung: Oberkiefer und Spitze des un- teren schwarz, Wurzel des letzteren gelb; Bei- ne schwarz; Iris dunkel röthlich-braun; der ganze Kopf wie abgeschnitten rein weiß, auf dem Scheitel mit langen, lockeren Federn; der ganze Körper schwarz; Rachen lebhaft oran- gengelb. —

Ausmessung: Länge 5" — Breite 3" 2"^u
 — Länge d. Schnabels 7 $\frac{1}{4}$ " — Br. d. Schn. 3 $\frac{1}{2}$ "^u
 — Höhe d. Schn. 1 $\frac{1}{2}$ "^u — L. d. Flügels 2" 6"^u
 — L. d. Schwanzes 1" 6"^u — Höhe d. Ferse 3"^u
 — L. d. Mittelzehe 5"^u — L. d. äußeren Z. 3 $\frac{1}{2}$ "^u
 — L. d. inneren Z. 3"^u — L. d. Hinterzehe 3"^u
 — L. d. Mittelnagels 2 $\frac{1}{2}$ "^u — L. d. äußeren N. 1 $\frac{1}{2}$ "^u — L. d. Hinternagels 3"^u. —

Junges Männchen: Schnabel, Beine und Iris wie am alten Vogely Stirn, Seiten des Kopfs und Halses, Brust, Bauch, After und

und Flüsse in jenen Gegenden in der Nähe des Meeres einfassen, und in diesen Hinsicht dort die Stelle unserer europäischen Weidengebüsche vertreten. Diese sumpfigen von unzähligen Krabben bewohnten Ufer sind mit *Rhizophora*, *Conocarpus* und *Avicennia* bewachsen, südlich, wie bei Rio, mehr mit ersterem Strauche, welcher meist niedere, lichte Gebüsch bildet, auf deren Zweigen, in einer Höhe von zwei bis vier Fuß, man den weißköpfigen Fliegenfänger häufig sitzen sieht. Er ist still, phlegmatisch, sitzt meist unbeweglich, giebt auch selten einen Laut von sich, bewegt öfters den Schwanz, fliegt nach einem Insect auf die Erde hinab und wieder auf seinen Standort zurück. In seinem Magen findet man beinahe nur Blattläuse.

Da diese Vögel sich immer paarweise hielten, so suchte ich ihr Nest, und fand auch eins derselben im Monat December. Es stand in der Gabel eines niederen Sumpfbäumchens, war groß und rundlich von Pflanzenwolle, Federn und Halmen zusammengesetzt und mit etwas *Tillandsia* sparsam durchwirkt, inwendig war es mit Federn und Wolle sehr weich und warm ausgefüttert, und da es von allen Seiten gänzlich verschlossen war, so befand

sich nur vorn an der oberen Höhe ein kleiner runder Ringang; es hatte folglich etwa die Gestalt des Nestes unseres Zaunkönigs (*Troglodytes*). Ich fand in diesem Neste zwei gänzlich weiße Eier.

Diese Vögel sind nichts weniger als scheu; man kann ihnen sehr nahe kommen. Ich habe keine Stimme von ihnen gehört. Spix giebt die Iris des Vogels auf seiner Tafel weiß an, welches unrichtig ist, auch ist die Zeichnung des Vogels nicht gut. Tab. 30. Fig. 2. ist ein weiblicher Vogel, und *Muscicapa* *hiventer* ist das junge Männchen, worüber ich genau urtheilen kann, da sich in meiner Sammlung Exemplare von allen Altern und Geschlechtern befinden. In der Provinz Parí nennt man diesen Vogel *Viuva*, wie uns Spix sagt.

12. *M. caesia*.

Der aschblaue Fliegenfänger.
Fl. Ganzes Gefieder dunkel aschblau; Schwanz und Schwungfedern schwärzlich-braun; blaugrau überlaufen und gerandet.

Gobe-mouche plombé, Temm. et de Läng. pl. col. 23.

Beschreibung des männlichen Vogels.
Schnabel stark, gerade, etwas kürzer als der Kopf, hinter der Spitze zusammengedrückt, et-

wa um ein Dritttheil breiter als hoch; Firste etwas kantig, mälsig erhaben, Haken stark, fein und mit kleinem, leichtem Ausschnitte; Kinnwinkel kurz, abgerundet, vorn sparsam befiedert, die Federn etwas vorstrebend und horstig endend; Dille am Kinnwinkel abgeflacht, dann abgerundet, nach der Kuppe hin ein wenig kantig; das röhrlche Nasenloch steht an der Spitze der Nasenhaut, mit vorstrebendem Rosten leicht bedeckt; die schwarzen Bartborsten am Mundwinkel sind mälsig lang; Zunge halb so lang als der Schnabel, an der Spitze getheilt; die Flügel erreichen etwa ein Dritttheil der Schwanzlänge, sind ziemlich zugespitzt, die vierte und fünfte Feder die längsten; Schwanz mälsig lang, abgestuft, ausgebreitet abgerundet, äußerste Feder fünf Linien kürzer als die mittleren; Ferse ziemlich kurz, länger als die Mittelzehe, mit fünf bis sechs Tafeln belegt und ein wenig unter der Felsbeuge befiedert; Hinternagel größer als der mittlere; Gefieder zart und weich.

Färbung: Schnabel hornschwarz, am Unterkiefer weißlich-bleifarben; Iris graubraun; Beine bleifarben; ganzes Gefieder dunkel bläulich-achgrau, an den inneren Flügeldeckfedern weißlich-achgrau; Schwung- und große Flügel-

deckfedern schwärzlich-braun, mit blaugrauen Rändern; mittlere Schwanzfedern bläulich überlaufen, die übrigen schwarzbraun; Bauch kaum merklich blässer als der Rücken.

Ausmessung: Länge ungefähr 5" 9"¹⁰ — Breite 8" 2"¹⁰ — L. d. Schnabels 6¹⁴/₁₀" — Brust Schn. 3"¹⁰ — Höhe d. Schn. 2³/₁₀" — L. d. Flügels 2" 7¹/₂" — L. d. Schwanzes 2" 3"¹⁰ — Höhe der Ferse 6¹/₂" — L. d. Mittelnahe 4³/₁₀" — L. d. äußeren Z. 3¹/₂" — L. d. inneren Z. 2³/₁₀" — L. d. Hinterzehe 3"¹⁰ — L. d. Mittelnagels 2¹/₂" — L. d. äußeren N. 1¹/₂" — L. d. Hinternagels 2¹/₂".

Weibchen: Schnabel bläulich-braun, Unterkiefer bleifarben, eben so die Beine; alle Obertheile olivenbraun, Flügel etwas rostroth überlaufen; Schwungfedern rostroth gerandet; Steiß, Aftergegend und Mittelbauch rostroth; Seiten und Brust graulich-gelbbraun; Kehle grau mit hellgelb gefleckt; innere Flügeldeckfedern bläs rostroth, von eben dieser Farbe ist der Hintersaum der Schwungfedern.

Ausmessung: Länge ungefähr 5" 6". —

Dieser Fliegenfänger hat die Lebensart der übrigen Geschlechtsverwandten und hält sich in den großen Wäldern auf. Er ist mir selten vorgekommen. Ich erhielt ihn zuerst süd-

lich am Flusse *Iritiba*, in den Waldungen von *Villa Nova de Benevento*, später auch im Sertong der Provinz *Bahia*.

Die Hrrn. *Temminck* und *de Laugier* haben ihn auf ihrer 17ten Tafel abgebildet, man wird dieselbe mit meiner nach dem Leben entworfenen Beschreibung vergleichen können.

13. *M. aurifrons*.

Der Fliegenfänger mit gelbwurzeligen Stirnfedern.

Fl. Oberkörper lebhaft olivengrün; Kopf aschgrau überlaufen; Federn der Stirn und des Vorderscheitels an der Wurzel citrongelb; Flügel und Schwanz graubraun mit olivengrünen Rändern; Kinn, Kehle und Brust olivengrau, gelblich gemischt und gestrichelt, übrige Untertheile limonengelb.

Beschreibung des männlichen Vogels nach einem ausgestopften Exemplare: Kopf dick, Schnabel stark, Schwanz ziemlich kurz, Gestalt im Allgemeinen etwas den Manakin's ähnlich. Schnabel gerade, stark, ziemlich kurz, andert-halbmal so breit als hoch, an den Seiten geradlinig; Firste kantig, nach der Kuppe sanft hinab gewölbt, mit deutlichem Hähchen und kleinem Ausschnitte dahinter; Nasenloch mit

verstreubenden Borstfedern bedeckt; Kinnwinkel beinahe halb Schnabellänge, mit borstig endenden Federn besetzt; Bartborsten am Mundwinkel etwa zwei und eine halbe Linie lang; Augenlid am Rande befiedert; die Flügel fallen etwas über die Schwanzmitte hinaus, sind sehr zugespitzt, die erste Feder kurz, die dritte die längste; Schwanz mälsig lang, schmal, die Federn kurz zugespitzt; Beine schlank, mälsig hoch, Ferse mit fünf Tafeln belegt, etwa anderthalbmal so lang als die Mittelzehe; Mittel- und Hinternagel groß, der letztere größer. —

Färbung: Schnabel dunkel horngraubraun, Wurzel des Unterkiefers weißlich; Beine blaugraubräunlich, im Leben vielleicht bleifarben; Zügel weißlich-grau; alle Obertheile zeisigrün, der Oberkopf überall stark aschgrau überlaufen; hebt man die Federn des Vorderkopfs auf, so sind sie an der Wurzel gelb, welches man bei der ruhigen Lage der Federn nicht bemerkt; Flügel und Schwanz graubraun, mit grünen Rändern der Schwungfedern und grüner Vorderfahne an den Deckfedern; hinterer Rand der Schwungfedern weißlich; innere Flügeldeckfedern hellgelb; Seiten des Kopfs, Kinn, Kehle, Unterhals und Brust sind olivengrau, gelblich gemischt und gestrichelt; Unterbrust,

Bauch, After und Steiß lebhaft limonengelb, in den Seiten olivengrau.

Ausmessung: Länge etwa 4" 6''' — L. d. Schnabels 4½''' — Höhe d. Schn. 1½''' — Br. d. Schn. 2⅔''' — L. d. Flügels 2" 7''' — L. d. Schwanzes 1" 10''' — Höhe d. Ferse 6¼''' — L. d. Mittelzehe 3¼''' — L. d. äußeren Z. 3¼''' — L. d. inneren Z. 2⅓''' — L. d. Hinterzehe 2⅓''' — L. d. Mittelnagels 2⅓''' — L. d. äußeren N. 1¼''' — L. d. Hinternagels 2⅓'''.

Dieser Vogel hat auf den ersten Anblick Aehnlichkeit mit einer weiblichen oder jungen *Pipra*, sowohl in Gestalt als Färbung; allein der Schnabel ist verschieden gebildet. Ich habe nur das männliche Geschlecht kennen gelernt. Das in meiner Sammlung befindliche Exemplar stammt aus der Gegend von *Cama-má* und *Bahia*.

14. *M. brevipes*.

Der kurzbeinige Fliegenfänger.

Fl. Körper zeisiggrün, Rücken am lebhaftesten; Schwungfedern graubraun mit grünem Vordersaume; Kinn, Kehle, Unterhals und Brust hellgrau,

gelblich gestrichelt; Unterbrust, Bauch und Steiß limonengelb; Beine klein und schwach. —

Beschreibung des männlichen Vogels:

Kopf und Körper dick und gedrungen, Schwanz ziemlich kurz, Beine sehr kurz und schwach. Schnabel gerade, nach dem feinen Haken hin hinabgewölbt, hinter diesem mit kleinem Zähnen, etwa zweimal so breit als hoch, die Fiste mälsig kantig; Nasenloch an dem vorderen Ende der befiederten Nasenhaut, länglich; Dille an der Wurzel flach, an der Spitze ein wenig kantig, sanft aufsteigend; vor der Spitze befindet sich am Rande des Unterkiefers ein kleiner Ausschnitt; Kinnwinkel nicht halb so lang als der Schnabel, breit, abgestumpft, borstig befiedert, so wie die Nase; Mundwinkel mit feinen horizontalen Bartborsten; Zunge ziemlich kurz, an der Spitze ein wenig getheilt; Flügel etwas zugespitzt, erreichen etwa ein Dritttheil des Schwanzes, die dritte Schwungfeder ist die längste, die vierte nur sehr wenig kürzer; Schwanz mälsig lang, aus zwölf ziemlich gleichen, kurz zugespitzten Federchen bestehend; Beine klein und schwach, Ferse mit fünf glatten Tafeln belegt, kaum andert-halbmal so lang als die Mittelzehe; Hinter-nagel größer als der mittlere.

Färbung: Iris graubraun; Beine bleifarben; Schnabel am Oberkiefer dunkel horngrau-braun, Unterkiefer röthlich-grau; Rachen und Zunge orangengelb; alle Obertheile zeisiggrün, am Kopfe in's Olivengraue ziehend, am Mittel- und Unterrücken hell und am lebhaftesten grün; Flügeldeckfedern graubräunlich mit grünen Rändern; Schwung- und Schwanzfedern dunkel graubraun mit grünen Rändern, die mittleren Schwanzfedern mehr grün; Kinn, Kehle und Brust olivengrau, gelblich gestrichelt; Seiten olivengrau; Mitte der Brust und übrige Untertheile hell limonengelb; innere Flügeldeckfedern und Flügelrand hell gelb, wie der Unterleib.

Ausmessung: Länge 4" 8''' — Breite 7" 6'''
— L. d. Schnabels $3\frac{4}{5}$ ''' — Br. d. Schn. 3''' —
Höhe d. Schn. $1\frac{2}{5}$ ''' — Höhe d. Ferse $5\frac{4}{5}$ ''' —
L. d. Mittelzehe 4''' — L. d. Hinterzehe 2''' —
L. d. Mittelnagels 2''' — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{5}$ ''' —

Von dieser Art der Fliegenfänger habe ich nur einmal den männlichen Vogel erhalten, der in der Farbe viel Aehnlichkeit mit unsern Laubvögelchen und auch mit der von mir beschriebenen *Muscicapa Asilus* hat, von denen er sich hingegen wieder durch die Gröfse und den

Schnabelbau unterscheidet. — Ich fand diese Species in den inneren großen Urwaldungen.

F. Gabelschwänzige Fliegenfänger.

Schnabel stark, etwas kantig, an der Spitze geradlinig, Schwanz stark, gabelförmig; Ferts ziemlich kurz; Scheitelfedern gelb oder orangefarben.

15. *M. Tyrannus*, Linn., Gm., Lath.

Der Savanna.

Fl. Oberkopf schwarz, die Federn an der Wurzel gelb; Rücken aschgrau; Flügel graubraun; Schwanz sehr lang, schwarzbraun, die äußere Feder mit weißem Saume; Untertheile weiß.

Fork tailed Flycatcher, Bonaparte suppl. to Wilson
Vol. I. p. 1.

Le Savana ou Tyran à queue fourchue de Cayenne,
Buff. pl. enl. No. 571. Fig. 2.

Tyrannus Savana, Vieill. tabl. encycl. et méth. pag.
353.

Le petit ciseau d'Azara, Fey. Vol. III. pag. 220.

Beschreibung des weiblichen Vogels:

Schnabel stark, kurz, mälsig breit, die Firste nur sehr wenig concav, die Kuppe des Oberkiefers sanft herabgebogen, mit einem kleinen Zähnchen, sie tritt nicht bedeutend über den Unterkiefer herab; Nasenloch eiförmig, mit er-

höhem Rande umgeben; Nasenfedern wenig vortretend, aber in Borstspitzen endigend; Dille abgerundet, sehr sanft aufsteigend; Kinnwinkel mälsig abgerundet, an der Spitze sparsam besiedert, die Federn endigen in Borsten; Bartborsten am Mundwinkel; Kopf ziemlich dick; Flügel ziemlich lang und zugespitzt, die zweite Schwungfeder ist die längste; Schwanz sehr lang, tief gabelförmig, aus zwölf Federn bestehend, die äußerste zwei Zoll vier Linien länger als die nachfolgende, und beinahe vier Zoll länger als die mittelsten, dabei schmal, nach der Spitze hin an Breite abnehmend, am Ende mälsig zugespitzt, ihre äußere Fahne sehr schmal; Beine ziemlich kurz; Ferse mit fünf Tafeln belegt; Hinternagel etwas aufgerichtet.

Färbung: Iris dunkel braun; Schnabel und Beine schwarz; Federn der Nase, Stirn, des ganzen Oberkopfs, des Zügels, der Augen- und Ohrgegend bis in den Nacken schwarz; auf der Mitte des Scheitels sind die Federn schön hell citrongelb mit schwarzen Spitzen, daher kann der Vogel die gelbe Farbe gänzlich verbergen; Oberhals und Rücken aschgrau; Flügel graubraun, die Federn mit bläueren, die hinteren Schwungfedern mit weißlichen Rändern; Schwanz schwarzbraun, die äußere

Feder mit weißer äußerer Fahne; alle Untertheile rein weiß.

Ausmessung: Länge $9'' 9'''$ — Breite $18'''$
 $3'''$ — L. d. Schnabels $6'''$ — Br. d. Schn. $3\frac{1}{2}'''$
 — Höhe d. Schn. $2\frac{1}{2}'''$ — L. d. Flügels $8''$
 $11\frac{1}{2}'''$ — L. d. Schwanzes $6'''$ — Höhe d. Ferse
 $7'''$ — L. d. Mittelzehe $5\frac{1}{2}'''$ — L. d. äusseren Z. $8\frac{1}{2}'''$ — L. d. inneren Z. $3\frac{1}{2}'''$ — L. d. Hinterzehe $2\frac{1}{2}'''$ — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{2}'''$ — L. d. äusseren N. $1\frac{1}{2}'''$ — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{2}'''$. —

Männchen: Die schwarze Farbe des Kopfs ist mehr ausgedehnt und tritt nach allen Seiten weiter hinab, die gelben Scheitelfedern haben eine lebhaftere Farbe, und der Schwanz ist weit länger als am Weibchen.

Ausmessung einiger Theile: Länge etwa $13''$ — L. d. Schnabels $6\frac{1}{2}'''$ — L. d. Flügels $4'' 1'''$ — L. d. Schwanzes $8'' 6\frac{1}{2}'''$ —, dessen äußerste Feder ist länger als die mittleren um $6''$ — Höhe d. Ferse $7\frac{1}{2}'''$ — L. d. Mittelzehe $5'''$. —

Dieser schöne Fliegenfänger ist über den größten Theil von Südamerica verbreitet, und man hat ihn, nach *Bonaparte's* Zeugniß, selbst in der Provinz *Neu-Yersey* im nördlichen America erlegt, dessen südliche Provinzen er wahr-

scheinlich bewohnt. In *Cayenne* ist er nicht selten, *Azara* beschreibt ihn für *Paraguay*, *Montevideo* und *Buenos Ayres*, und mir ist er in Brasilien nicht selten vorgekommen. Meine Jäger erlegten das erste hier beschriebene weibliche Individuum in den Mangué-Gebüsch, welche die Ufer des Flusses *Belmonte* an seiner Mündung einfassen, und später habe ich diese Vögel im Inneren des Landes, an den Gränzen der Provinzen *Minas* und *Bahia*, in den großen *Campos Geraës* wieder gefunden. Sie fliegen, wie *Azara* sagt, zwar ziemlich leicht, doch giebt der lange, gewöhnlich etwas ausgebreitet getragene Gabelschwanz ihnen immer ein ungeschicktes Ansehen. Eine Stimme habe ich von ihnen nicht gehört, auch nie das Nest gefunden. In ihren Mägen fanden sich Ueberreste von Insecten.

Buffon's Abbildung ist nicht ganz schlecht, allein zu schlank, der Kopf zu klein. Dieser Naturforscher belegte unseren Vogel mit der Benennung *Savanna*, weil er sich in *Cayenne* in den überschwemmten Savannen aufhalten soll; allein dergleichen Benennungen müssen mit Vorsicht angewandt werden, sie passen oft nur sehr wenig, z. B. für die von mir bereiste Gegend; denn dort giebt es keine Savannen. —

Bonaparte, in dem 1sten Theile seiner Nachträge zu *Wilson's* americanischer Ornithologie, hat uns die beste Abbildung von *Muscicapa Tyrannus*, Linn. gegeben.

G. Starkschnäbeliche oder würgerartige Fliegenfänger.

Schnabel meist groß, stark, gerade, oft dick, zuweilen kurz; *Kuppe* etwas herabgebogen; *Flügel* ziemlich stark und lang; *Ferse* meist kurz.

16. *M. Pitangua*, Licht.

Der Bentavi oder Tictivi.

Fl. Scheitel in der Mitte hochgelb, Seiten desselben, so wie der Hinterkopf und ein breites Feld durch die Augen schwarz; Obertheile röthlich-graubraun; Untertheile schön citrongelb, Kinn, Kehle und ein Streifen über dem Auge weiß; Schnabel kantig und mäfsig breit.

Pitangus guacu, *Maregr.* pag. 215.

Lanius Pitangus, Linn., Gmel., Lath.

Bientee ou Puitaga, d'Azara Voy. Vol. III. pag. 395.

Buff., Sonn. Vol. III. pag. 36.

Buff. pl. enl. No. 296. Fig. 249.

Meine Reise nach Bras. B. I. pag. 47, 110. II. 179.

Tejaktia *) botocudisch.

Beschreibung des männlichen Vogels: Größer, besonders dicker als Lanius excubitor.

*) sie ausgesprochen wie cha im Deutschen.

Kopf stark, mit langen schmalen Federn auf dem Scheitel; Schnabel stark, beinahe so lang als der Kopf, eckig, gerade, dick, um mehr als ein Dritttheil breiter als hoch; Firste gerade, mäßig scharf, an der Spitze mit starkem, feinem Haken, der zwei Dritttheil Linie über den geschlossenen Unterkiefer herabtritt, hinter demselben ein kleines Zähnchen; Nasenloch elliptisch, von den borstigen Nasenfedern leicht bedeckt; Dille vor dem beinahe halbe Schnabellänge haltenden, grossen, breiten, mäßig abgerundeten und sparsam mit borstig endenden Federn besetzten Kinnwinkel, ein wenig abgeflacht, bald aber bis zur Spitze kantig sanft aufsteigend; Tomienrand des Unterkiefers vor der Kuppe mit kleinem Ausschnitte; Bartborsten am Mundwinkel fein und zart, die längsten von drei und einer halben Linie; Flügel stark, mäßig zugespitzt, erreichen etwa die Mitte des Schwanzes, die dritte und vierte Feder ziemlich gleich und die längsten des Flügels; Schwanz stark, ziemlich gleich, ausgebreitet kaum merklich abgerundet; Beine stark und mäßig hoch, Ferse beinahe anderthalbmal so lang, als die Mittelzehe, mit sechs bis sieben glatten Tafeln belegt, Mittel- und Hinternagel ziemlich gross.

Färbung: Iris graubrau *); Schnabel von außen und innen schwarz; der Rachen lebhaft orangengelb; Beine schwarz; Federn auf der Mitte des Scheitels hoch gummiguttgelb, an beiden Seiten desselben und am Hinterkopfe schwarz, eben so ist ein breites Feld, welches vom Mundwinkel durch das Auge zieht, und das Ohr bedeckt; Stirn weißgrau, zuweilen schwärzlich gemischt; an diesem Theile beginnt ein weißer Streifen, der breit über dem Auge hinzieht und sich am Hinterkopfe mit dem der andern Seite vereint, wodurch ein schöner weißer Kranz rund um den Kopf entsteht, und unter welchem man auch eine dunkel graue Vereinigung der schwarzen Ohrstreifen bemerkt; alle übrigen Obertheile sind angenehm röthlich-graubraun, zuweilen mit etwas olivenfarbenem Anstriche, Unterrücken mehr röthlichbraun; Deck- und Schwungfedern der Flügel mehr schwärzlich-graubraun, aber am Vorder- saume rothbraun gerandet, eben so der Schwanz; innere Flügeldeckfedern schön hochgelb; Kinn und Kehle weiß; Oberbrust und alle übrigen Untertheile schön lebhaft gummigutt- oder citrongelb, an Bauch und After am lebhaftesten.

*) Azara nennt sie gelb, welches unrichtig ist.

Die gelben Scheitelfedern kann der Vogel auf-
richten, und auch durch die schwarzen Seiten-
federn dieses Theils verbergen.

Ausmessung: Länge 9" 4''' — Breite 14"
4''' — L. d. Schnabels 1" — Höhe d. Schn.
3½''' — Br. d. Schn. 5''' — L. d. Flügels 4" 3½'''
— L. d. Schwanzes etwa 3''' — Höhe d. Ferse
11''' — L. d. Mittelzehe 7½''' — L. d. äußeren
Z. 5½''' — L. d. inneren Z. 4½''' — L. d. hin-
teren Z. 3½''' — L. d. Mittelnagels 3½''' — L.
d. äußeren N. 2''' — L. d. hinteren N. 3½'''.

Weibchen: Auf den ersten Anblick nicht
von dem andern Geschlechte zu unterscheiden;
allein genauer betrachtet erscheinen seine hin-
tern Schwungfedern mehr weißlich gerandet,
der weiße Augenstreifen ist von diesem Theile
bis zur Nase aschgrau, auch ist die Stirn mehr
dunkel grau, und bei dem Männchen mehr
weißlich, auch hatte der zur Vergleichung sich
vor mir befindende recht vollständige, alte
weibliche Vogel einen kürzeren Schnabel als
das Männchen; denn er hielt nur zehn Linien
in der Länge, welches aber vielleicht nur zu-
fällig war. Beide Geschlechter haben die Schei-
telfedern gleich lebhaft gefärbt.

Junge Vögel: Die Hauptzeichnung ist die
der alten, nur sind ihre Farben matt, mehr

unrein, und Flügel und Schwanz stärker gerandet.

Dieser Vogel ist von den Ornithologen verwechselt worden, wovon ich vollkommen überzeugt bin. Ich werde versuchen, zuerst diesen Irrthum aufzuklären, und dann von der Lebensart des Bentavi reden. *Marcgrave* beschreibt seinen *Pitangua guaçu* etwas undeutlich, und da *Lanius Pitangua* und *sulphureus* in der Färbung und Gröfse sich so vollkommen ähnlich sind, daß sie nur durch ihren abweichenden Schnabelbau unterschieden werden können, so hatte man allerdings recht, den *Pitangua guaçu* des *Marcgrave* für den dickschnäbeligsten der beiden Arten zu halten, indem jener Schriftsteller, pag. 216, sagt: „*rostrum habet crassum, latum etc.*“ — Wenn man aber weiter lies't, und die Stimme des Vogels angegeben findet, so bleibt durchaus kein Zweifel möglich, daß *Marcgrave* von dem *Bienteveo* oder *Puitaga* des *Azara* redet, der einen schmälern, weniger bauchigen Schnabel hat, als der *Nei-Nei* des spanischen Ornithologen, der der *Lanius sulphuratus* der Schriftsteller ist. *Sonnini*, der doch selbst in America war, begeht ebenfalls diesen Fehler. *Azara's Nei-Nei*, sagt er in der Note, sey sehr

gemein in *Guiana* und rufe beständig *tictivie!* und gerade hierin liegt der Irrthum. *Azara* beschreibt beide Vögel, auf einander folgend, sehr gut und ganz unverkennbar, er giebt beiden Arten die Benennung nach ihrer Stimme. Den *Lanius sulphuratus* nennt er *Nei-Nei*, weil er vollkommen diesen Ruf hat, dagegen ruft *Margrave's Pitangua* sehr deutlich *tictivie!* oder wie die Brasilianer sagen — *Bintivi!* oder *Bentavi!* Dieselbe Verwechselung findet in den Citaten der *planches enluminees* statt; denn ganz deutlich ist No. 212 (mit sehr dickem, bauchigem Schnabel) der *Nei-Nei* des *Azara*, also *Lanius sulphuratus*, *Linn.*, und No. 296 hat den wahren Schnabelbau von *Azara's Bienteveo*, obgleich die Färbung der Platte No. 249 (des gelbbauchigen Hehers) dem *Bentavi* auch sehr nahe kommt, wenn gleich bei No. 296 der Schnabelbau besser dargestellt ist. Ich glaube jetzt gezeigt zu haben, daß *Sonnini* *) die

*) Die Verwechselung des *Bentavi* mit dem *Nei-Nei* ist auch neuerdings im *Diction. d. sciences natur.* (Vol. 56. pag. 198) geschehen. Sie hätte längst vermieden werden können, wenn man dasjenige berücksichtigt hätte, was *Azara* über diese beiden Vögel sagt, und welches ich in der Beschreibung meiner brasilianischen Reise, B. II. p. 179 der deutschen, und Vol. III. p. 99 der französischen Uebersetzung bestätigt habe.

Stimme meiner beiden Vögel verwechselt, und werde nun die Lebensart des Bentavi oder *Bienteveo* in der Kürze beschreiben.

Dieser Vogel ist in allen von mir bereis'ten Gegenden in Brasilien gemein, besonders da wo offene Triften mit Gebüsch abwechseln, und man sieht ihn in der Nähe der Wohnungen, in den Pflanzungen, am Rande der Gebüsch und Waldungen, zwischen dem grasenden Rindvieh auf den Triften, wo er gern auf der Erde sitzt, auf einem dicken Steine, einer Erdscholle, alten Stocke, Pfahle, einem isolirten Baume, Strauche oder Aste, auch selbst in dichten dunkeln Gebüsch, und überall läßt er seine laute klingende Stimme *tictivi! tictivi!* hören, aufser welcher er noch manche andere Töne besitzt. Er ist ein unruhiger, lebhafter, neugieriger und zänkischer Vogel, verfolgt unter lautem Rufen eifertig sein Weibchen und streitet sich in dieser Hinsicht öfters mit seines Gleichen. Sie fliegen öfters von dem Strauche oder Aste, auf welchem sie sitzen, zur Erde, wenn sie ein Insect bemerken. In ihren Mägen fand ich Ueberreste von Käfern, Heuschrecken (*Gryllus*) u. s. w. — Besonders in der Paarzeit hört man überall ihre laute Stimme und bemerkt,

dass sie alsdann mehr in Bewegung sind. Männchen und Weibchen fliegen einander alsdann beständig nach und rufen um die Wette, wobei sie die schönen gelben Scheitelfedern aufrichten.

Das Nest des Bentavi ist künstlich gebaut. Ich fand es im Frühjahr, also Ende August oder Anfang Septembers in der Gabel eines dicken Strauches oder mässig hohen Baumes. Es bestand in einem dicken, grossen, runden Ballen von Moos, Blättern, Halmen und Federn, an welchem sich vorn ein kleiner runder Eingang befand, vier bläuliche, violet und schwärzlich punctirte Eier lagen darin. Dieses Nest vertheidigt der Bentavi sehr kühn gegen weit grössere Feinde, auch wird er nie fehlen, wenn es darauf ankommt, einen Raubvogel zu necken oder zu verfolgen, eine Gelegenheit, wobei diese Vögel ihre laute, hohe Stimme unaufhörlich hören lassen, indem sie den Accent sehr stark auf die letzte Sylbe legen. Die Bewohner des östlichen Brasilien's kennen unseren Vogel allgemein unter der Benennung *Bentavi*, die Indianer haben andere Namen für ihn.

Buffon's pl. enl. No. 296 giebt eine gute Idee des Bentavi. Der Schnabel ist hier gut

genähert; allein der Scheitel müßte gefärbt seyn wie an Tab. 249, welche überhaupt in der Färbung unserm Vogel mehr gleicht; auch *Sonnini* hält diese letztere Abbildung für die des Bentavi. *Vieillot* endlich in seiner Naturgeschichte der nordamerikanischen Vögel bildet einen *Tyrannus sulphuratus* ab (pl. 47.), mit *Tyran jaune ou le Tictivie*, welchen ich für meinen Bentavi halte, doch irrt *Vieillot*, wenn er (T. I. pag. 78) sagt: „der Tictivie rufe auch zuweilen *gnai-gnai-gnai*.“ —

17. *M. cayennensis*, Linn., Gml., Lath.

Der Fliegenfänger mit gelbem Bauche und Scheitel. Fl. Obertheile graubraun, Untertheile citrongelb; Kehle und ein breiter Streifen von der Nase nach dem Hinterkopfe weiß; Federn auf der Mitte des Scheitels gelb, die an den Seiten desselben, an den Backen und der Ohrgegend schwarz.

Geb. mouche à ventre jaune de Cayenne, Buffon pl. enl. No. 569. Fig. 2.

Beschreibung des männlichen Vogels: Schnabel stark, gerade, beinahe so lang als der Kopf, etwas breiter als hoch, mit etwas kantiger, an der Spitze mit feinem Haken herabgehegener Firste und einem kleinen Zäh-

ehen hinter der Kuppe beider Kiefer; Nasenloch dem Rande des Oberkiefers nahe, in der Mitte der etwas vertieften Nasenhaut länglich-eiförmig, etwas von den borstig verstrehenden Nasenfedern bedeckt; Dille an der Mitte abgeflacht, bald aber etwas kantig; Kinnwinkel mehr als ein Dritttheil der Schnabellänge, breit, mäÙig zugespitzt, besiedert, mit einzelnen Borsthaaren gemischt; Mundwinkel mit steifen, zum Theil beinahe vier Linien langen Barthorsten besetzt, eben so der Zügel; Flügel stark, ziemlich lang, erreichen etwa die Mitte des Schwanzes und ihre dritte und vierte Feder sind die längsten; Schwanz mittelmäÙig stark, die äußeren Federn etwas kürzer, er ist also sanft abgerundet; Beine ziemlich kurz, Ferse etwa um ein Dritttheil länger als die Mittelzehe, mit fünf Tafeln belegt; Hinterzehen größer als der mittlere.

Färbung: Iris graubraun; Rachen bleich gelb; Schnabel bräunlich-schwarz; Beine schwärzlich-grau; Stirnfedern an der Wurzel weißlich, an der Spitzenhälfte schwarz; auf der Mitte des Scheitels stehen schöne, lange, hoch glänzend gammigtgelbe, zuweilen ein wenig in's Orangerothene fallende Federn, an den Seiten des Scheitels und am Hinterkopfe

aber glänzend schwarze, welche in der Ruhe gewöhnlich das Gelbe verbergen; von der Nase zieht über dem Auge hin ein breiter weißer Streifen, der sich an der Seite des Hinterkopfs etwas ausbreitet und endigt; Zügel und ein breiter Streifen, der die untere Seite des Auges umfaßt, alsdann aber die Ohrgegend bedeckt und sich an der Seite des Hinterkopfs verliert, sind bräunlich-schwarz; Kinn und Kehle mit dem Obertheile des Unterhalses weiß, alle übrigen Untertheile bis zum Schwanze lebhaft gummitguttgelb; Oberhals, Rücken, Flügel und Schwanz graubraun, die Schwungfedern rothröthlich gerandet, mit gelbröthlichem Hinterrsaume; Schwanzfedern an beiden Seiten fein röthlich gerandet; Rücken ein wenig olivenfarben, Flügel mehr röthlich überlaufen; obere Schwanzdeckfedern rothbräunlich.

Ausmessung: Länge 7" — Breite 11¹/₄" — L. d. Schnabels 9¹/₄" — Höhe d. Schn. 2" — Br. d. Schn. 3²/₃" — L. d. Flügels 3" 4¹/₄" — L. d. Schwanzes 2" 9 bis 10" — Höhe d. Ferse 7¹/₂" — L. d. Mittelzehe 5¹/₂" — L. d. Äusseren Z. 8¹/₂" — L. d. inneren Z. 2¹/₄" — L. d. Hinterzehe 3¹/₂" — L. d. Mittelnagels 2¹/₄" — L. d. Hinternagels 3". —

Weibchen: Alle Farben blässer und mehr

verloschen, besonders das Gelbe; Scheitel mehr blafagelb, der weisse Augenstreif am Hinterkopfe stärker und beinahe vereint; Flügel- und Schwanzfedern stärker rothbraun gerandet.

Dieser schöne Fliegenfänger scheint über den grölsten Theil von Südamerica verbreitet, da er in *Guiana* so gut wie in allen von mir in Brasilien bereis'ten Gegenden vorkommt. Er ist mir am *Rio Doce*, *Mucuri*, *Belmonte* und südlich bei *Cabo Frio*, besonders an den Fluszufern nicht selten vorgekommen, und wir fanden ihn nicht blofs in den grofsen Waldungen, sondern auch in offenen, mit Gebüsch abwechselnden Gegenden. Er hat etwa die Lebensart der übrigen Fliegenfänger, doch scheint er nicht besonders träge zu seyn. Seine Stimme ist ein heller, feiner Pfiff. Er nährt sich von Insecten. Sein Nest erbaut er in der Gabel eines Astes in gewöhnlicher, halbkugelförmiger Gestalt, oben offen. Im Monat Februar sah ich die jungen Vögel aus einem solchen Neste zum erstenmale ausfliegen.

... *Buffon's* Abbildung (*pl. enl. No. 569. Fig. 2.*) ist nicht schlecht, das Braun der oberen Theile ist ein wenig zu dunkel, Schnabel und Beine unrichtig colorirt, man sieht nichts von den gelben Scheitelfedern, welche der Vogel

häufig zeigt, und die Federn des Scheitels und der Backen sollten, anstatt braun, schwarz gefärbt seyn.

18. *M. Miles*, Licht.

Der gelbbäuchige Fliegenfänger mit feuerfarbigem Scheitel.

Fl. Körper fahl röthlich-graubraun, Scheitel ebenso, allein dessen mittlere Federn feuerfarben, oder feurig orangeroth; Untertheile gelb; äußere Schwanzfedern mit bläsgelben Spitzen.

? *Muscicapa similis*, Spix Av. Tom. II. pag. 18.
Tab. 25.

Beschreibung des weiblichen Vogels: Gestalt und Größe, so wie auch in der Färbung viel Aehnlichkeit mit der vorhergehenden Art. Schnabel stark, kürzer als der Kopf, gerade, auf der Firste mit kleinem, zusammengedrücktem Haken herabgekrümmt, dahinter ein kleiner Zahn; Nasenlöcher in der etwas vertieften Nasenhaut eiförmig, die borstig vorstrebenden Federn treten bis dahin vor; Unterkiefer gerade, Dille nur höchst wenig aufsteigend; an seiner Spitze kein bedeutend sichtbarer Ausschnitt; Kinnwinkel groß und lang, halb so lang als der Unterkiefer, mäßig abgerundet,

starke, blafs sanft gelbe Spitzen; Kinn, Kehle und Unterhals blafs gelb, welches an der Brust schon dunkler wird, so dafs Bauch, After und Steifs lebhaft gummiguttgelb gefärbt sind; innere Flügeldeckfedern und vorderer Flügelrand schön hell citrongelb.

Ausmessung: Länge 7" 9''' — Breite 11" 6''' — L. d. Schnabels $7\frac{1}{6}$ ''' — Höhe d. Schn. 2''' — Breite d. Schn. 3''' — L. d. Flügels 3" $7\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Schwanzes über 2" 6''' — Höhe d. Ferse 1" $\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Mittelzehe $7\frac{1}{3}$ ''' — L. d. äufseren Z. $5\frac{1}{6}$ ''' — L. d. inneren Z. 5''' — L. d. Hinterzehe 4''' — L. d. Mittelnagels $3\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äufseren N. 2''' — L. d. hinteren N. 4'''.

Männchen: Ich habe dieses nicht erhalten, wahrscheinlich ist es lebhafter und schöner gefärbt.

Dieser schöne Fliegenfänger hat sehr viel Aehnlichkeit mit der vorhergehenden Art, und man könnte ihn für eine verloschen gefärbte Varietät desselben halten, so lange man ihn blofs oberflächlich betrachtet; allein die Verhältnisse des Körpers, besonders die völlige Verschiedenheit der Beine, zeugen sogleich für das Gegentheil. Er ist uns nur sehr selten vorgekommen, in der Gegend von *Bahía* scheint

er schon weniger selten zu seyn, und *Spix* bildet ihn höchst wahrscheinlich (Tab. 25) ab. Das in meiner zoologischen Sammlung aufgestellte Exemplar stammt aus der Gegend von *Nazareth das Farinhas* am Flusse *Jagoaripa*, wo diese Art nicht häufig seyn soll. Sie hält sich viel in offenen freien Gegenden auf.

19. *M. cinerea*, Linn., Gmel.

Der grauköpfige Fliegenfänger.

Fl. Körper rostgelb, Kopf aschgrau; Grösse eines Staars.

Spix Av. spec. nov. T. II. pag. 19. Tab. 26. Fig. 2.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel gerade, dick, stark, etwas rundlich-walzenförmig, Firste abgerundet, vorn mit haakenförmiger Kuppe, dahinter ein kleiner sehr undeutlicher Zahn, oder vielmehr ein Ausschnitt; Dillenkante abgeflacht, sanft aufsteigend gewölbt; Kinnwinkel sehr groß, breit, beinahe halb Schnabellänge, nach vorn sparsam befiedert; Nasenloch länglich-eiförmig, die Nasenfedern streben vorwärts und endigen in schwarzen Borsten; Mundwinkel mit beinahe vier Linien langen Borsten; Augenlid mit kleinen Federchen besetzt; die Flügel reichen

etwas über ein Drittel des Schwanzes hinaus, die vierte und fünfte Feder die längsten; Schwanz abgerundet, die mittleren Federn also etwas länger als die äußeren, erst ist stark und mächtig lang; Beine mächtig stark und hoch; Ferse mit sieben glatten Tafeln belegt; Mittel- und Hinternagel groß, der letztere größer und mehr gekrümmt.

Färbung: Iris graubraun; Oberkiefer schwarzbraun, der untere heller; Beine bleifarben; Kopf, Hals, Kinn und Kehle aschgrau, der Scheitel, besonders die Stirn, mit schwärzlich-grauen Schaftstrichen; Seiten des Kopfs und Kehle weißlich gemischt oder gestrichelt; Rücken und Flügel röthlich-olivengrün; Deck- und Schwungfedern der Flügel dunkel grünlich-braun mit breiten roströthen Rändern, die letztern mit breitem, rostgelbem Hinterräume; Untertheile lebhaft rostgelb, Brust nur röströthlich; Schwanz lebhaft und glänzend gelblich-roströth.

Ausmessung: Länge 7" 4¹/₂ — L. d. Schnabels 9¹/₂ — Höhe d. Schn. 2¹/₂ — Breite d. Schn. 4¹/₂ — L. d. Flügel 8" 6¹/₂ — L. d. Schwanzes 8¹/₂ — Höhe d. Ferse 4¹/₂ — L. d. Mittelzahn 6¹/₂ — L. d. äußeren Z. 4¹/₂ — L. d. inneren Z. 4¹/₂ — L. d. Mittelnagels 3¹/₂

— L. d. äußeren N. $2\frac{1}{2}''$ — L. d. hinteren N. $4\frac{1}{2}''$. —

Weibchen: Vom Männchen sehr wenig verschieden, ja es ist bei genauer Vergleichung kaum ein Unterschied zu entdecken; das erstere scheint an der Kehle mehr weißlich, d. i. heller gefärbt zu sein.

Dieser Vogel lebt in den großen brasilianischen Urwäldern, wo man ihn auf Baumästen umherhüpfen und den Insecten nachstellen sieht. Er ist einsam und still, nie habe ich eine Stimme von ihm gehört, auch sitzt er oft lange unbeweglich still, um zu lauern. Man sieht ihn zuweilen im Laube an der Erde und selbst in den Schlingpflanzen (*Cipó*) der Wälder umherhüpfen.

Splax hat ihn auf seiner 26ten Tafel (Fig. 2.) ziemlich richtig abgebildet; allein die Iris ist daselbst aschgrau angegeben, die Schwanzfedern ein wenig zu schwarz und die Beine zu klein und schwach. —

20. *M. ferox*, Linn., Gmel., Lath.

Der Fliegenfänger mit aschgrauem Unterhabe.
Fl. Oberkörper graubraun, olivenfarben überlaufen;
Kinn, Kehle und Brust aschgrau, Bauch limonete

und stark, erreichen die Mitte des Schwanzes, die erste Feder kurz, die dritte am längsten; Schwanz mälsig stark, die Federn schmal und unten abgerundet, ziemlich gleich; Beine mälsig lang und stark, Ferse etwas mehr als anderthalbmal so lang als die Mittelzehe, mit sechs bis sieben etwas rauhen Tafeln belegt; Hinter- und Mittelnagel grofs, der hintere am gröfsten.

Färbung: Iris graubraun; Schnabel schwärzlich, Unterkiefer an der Wurzel bräunlich; Rachen orangengelb; Beine schwärzlich; alle Obertheile des Vogels haben ein in's Olivenfarbene ziehendes Graubraun, am dunkelsten auf dem Kopfe; Flügel und Schwanz dunkel graubraun, der letztere mehr schwärzlich; grofse Flügeldeckfedern mit breiten, blässeren Rändern; hintere Schwungfedern breit gelblich-weiß gerandet, die mittleren mit rothbraunem, schmalen Vordersaum, alle haben am hinteren Rande der inneren Fahne einen fahl gelbröthlichen breiten Saum; Schwanzfedern, blofs die mittleren ausgenommen, an ihrer inneren Fahne mit einem breiten, rothbraunen Längstreifen; Bart, Ohrgegend, Kinn, Kehle, Unterhals und Oberbrust hell aschgrau, alle übrigen Untertheile blass limonengelb; Seiten aschgrau überlaufen.

Ausmessung: Länge 7" — Breite 9" 10"
L. d. Schnabels 8" — Höhe d. Schn. 2½" —
Br. d. Schn. 4½" — L. d. Flügels 3" 1½" —
L. d. Schwanzes etwa 3" — Höhe der Ferse
8½" — L. d. Mittelzehe 5" — L. d. äußeren
Z. 3½" — L. d. inneren Z. 3½" — L. d. hinteren
Z. 2½" — L. d. Mittelnagels 2½" — L.
d. Hinternagels 3". —

Weibchen: Bloß dadurch von dem Männchen abweichend, daß ihm die rostrothen Zeichnungen an Flügeln und Schwanz fehlen.

Dieser Fliegenfänger ist ein in allen von mir bereisten Gegenden von Brasilien gemeiner Vogel, ich glaube ihn jedoch südlich in der Gegend von Rio, Cabo Frio, Campos dos Goytacases u. s. w. häufiger als mehr nördlich angetroffen zu haben. Man sieht ihn in jenen Gegenden überall, gleich dem gabelschwänzigen mit orangefarbigem Scheitel (*Tyrannus furcatus*), auf einzelnen Bäumen, Aesten und isolirten Gegenständen, besonders am Saume der Wälder und Gebüsche sitzen und auf Insecten lauern. In den Manguesümpfen am Ufer der Flüsse sitzt er häufig in Gesellschaft des Bentavi (*M. Pitangus*) und lauert auf Insecten und kleine Gewürme. Eine Stimme habe ich nicht von ihm gehört. Mit der Flinte

konnte man ihm sehr nahe kommen; er war also durchaus nicht schüchtern. Das Nest habe ich nicht gefunden, doch scheinen die meisten dieser großen Fliegenfänger ein kunstloses offenes Nest zu erbauen. —

21. *M. velata*, Licht.

Der große weißgraue Fliegenfänger.

Fl. Oberkopf weißgrau; Rücken und Deckfedern der Flügel dunkelgrau; Untertheile weiß; Flügel schwarzbraun, hintere und mittlere Schwungfedern an der Wurzel weiß; Schwanz an der Spitzenhälfte schwarz, an der Wurzel weiß.

Lichtenstein Verz. d. Doubl. pag. 64.

Muscipapa velata, Spix Av. T. II, pag. 17. Tab. 22.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt und Größe des *Lanius excubitor*, mit dickem Kopfe und langen Scheitelfedern. Schnabel mälsig groß, gerade, mälsig breit, Kuppe herabgebogen, mit kleinem Zähnechen dahinter; Nasenloch eiförmig, ein wenig von den weißen Endborsten der Nasenfedern bedeckt; Bartborsten des Mundwinkels nicht besonders stark; Kinnwinkel mälsig groß, etwas mehr als ein Drittheil der Schnabellänge haltend, befiedert, und die Federn in weißliche Borsten endigend;

Zunge an ihrer Spitze ein wenig gespalten; die Flügel falten beinahe auf der Schwansmitte, sind stark und zugespitzt, die dritte Schwungfeder scheint die längste; Schwanz ziemlich stark, in der Ruhe etwas schmal, aus zwölf ziemlich gleich langen Federn bestehend, welche ausgebreitet eine sehr sanft abgerundete Gestalt geben; Ferse ziemlich hoch, mit sechs glatten Tafeln belegt.

Färbung: Schnabel und Beine glänzend schwarz; Rachen hell orangengelb; Iris graubraun; alle Untertheile, so wie der Unterrücken sind höchst rein weiß; Rücken und Flügeldeckfedern dunkel aschgrau, welche Farbe nach dem Kopfe hin immer blässer wird, so daß die Stirn weißlich-ashgrau gefärbt ist, aber mit einigen dunkeln Schaftstrichen, eben so der Scheitel; Seiten des Kopfs weißlich; Flügeldeck- und Schwungfedern schwarzbraun mit etwas helleren Rändern; vordere Schwungfedern beinahe schwarz, die mittleren an Wurzel und Hinterfahne etwas weiß, welches an den vorletzten immer zunimmt, so daß diese beinahe gänzlich weiß sind, und auf dem Flügel in der Mitte einen langen Fleck von dieser Farbe bilden; hinterste Schwungfedern schwarzbraun, mit breitem weißlichem Vordersaume;

Schwanz mit weißer Wurzel- und schwarzer Spitzenhälfte; die mittleren Federn sind mehr schwarz, indem nach jeder Seite hin die weiße Farbe an der Wurzelhälfte der Federn in der Zunahme ist.

Ausmessung: Länge 7" 10''' — L. d. Schnabels 7½''' — Breite d. Schn. 3½''' — Höhe d. Schn. 2''' — L. d. Flügels 4" 3½''' — L. d. Schwanzes 3" — Höhe d. Ferse 1" — L. d. Mittelzehe 6½''' — L. d. äußeren Z. 4½''' — L. d. inneren Z. 3½''' — L. d. Hinterzehe 3½''' — L. d. Mittelnagels 3½''' — L. d. äußeren N. 2''' — L. d. Hinternagels 4''' —

Weibchen: Von dem Männchen nicht bedeutend verschieden, seine Stirn und Scheitel sind aber mehr dunkel, und etwas bräunlich beschmutzt.

Diesen schönen Fliegenfänger habe ich in den inneren hohen Gegenden von Brasilien, an den Gränzen der Provinzen *Minas* und *Bahia*, in den trockenen *Catinga*-Waldungen angetroffen; in der Nähe der Seeküste ist er mir nie vorgekommen, eben so wenig in den grossen Urwäldern der niedrig gelegenen Provinzen. — *Spix* fand ihn südlich in der Provinz *St. Paulo*, woher ihn auch das Museum zu Berlin erhielt. Er hat etwa die Lebensart ei-

nes Würgers (*Lanius*), scheint aber weniger lebhaft, und wie unsere Würger durch ihren weissen Bauch schon von Ferne in's Auge fallen, wenn sie auf einem isolirten Baume oder Strauche sitzen, so auch dieser Vogel. Eine Stimme habe ich von ihm nicht gehört, auch ist er mir nicht häufig vorgekommen. —

Die Spixische Abbildung ist gut, allein der Kopf ist zu klein dargestellt, auch die Stellung nicht gut; überhaupt mufs bemerkt werden, dass in diesem Werke die Gestalt der Vögel, besonders die Stellung ihrer Füfse, weit weniger richtig ist, als die Färbung. —

22. *M. polyglotta*, Licht.

Der schwarzgraue Fliegenfänger.

Fl. Grofs, Stirnrand vor dem Auge, Kehle, Bauch, Steifs, Wurzeltheil der Schwungfedern und Spitzenrand der hinteren weifs; Spitzen der Schwangfedern weifsgrau; Obertheile dunkel aschgrau; Flügel, grösster Theil des Schwanzes, Zügel und ein Streifen an jeder Seite der Kehle hinab schwarz.

Lichtenstein's Verzeichnifs u. s. w. pag. 54

M. polyglotta, Spix Av. T. II. pag. 18. Tab. 22.

Pepoza propinqua dit, Azara Voyag. Vol. III. pag. 399.

Beschreibung: Er hat die Gröfse des *La-*

mus excubitor, ist aber dicker und stärker, auch die Färbung hat Aehnlichkeit, ist aber dunkler. Kopf dick, Schnabel gerade, stark, an der Spitze sanft hinab gekrümmt, um etwas mehr als ein Dritttheil breiter als hoch, Firste etwas kantig erhaben; Nasenloch länglich-rund in der etwas vertieften Nasenhaut, mit einigen Borsten überlegt, die Federn treten bis zu demselben vor; Dille vor dem etwa ein Dritttheil der Schnabellänge haltenden, mälsig abgerundeten, an der Spitze sparsam befiederten Kinawinkel abgeflächt, nach der Spitze hin kantig; über dem Mundwinkel stehen zarte, beinahe sechs Linien lange Bartborsten; Flügel stark und ziemlich lang, sie scheinen über die Mitte des an meinem beschriebenen Exemplare nicht gänzlich ausgefederten Schwanzes hinaus zu reichen; Schwungfedern schmal, zugespitzt, an der inneren Fahne vor der Spitze mit einem Ausschnitte; Schwanz gleich, er hatte an meinem Exemplare, so wie die Schwungfedern, noch nicht die vollkommene Länge erreicht; Ferse ziemlich hoch und schlank, mit sechs bis sieben glatten Tafeln belegt, beinahe doppelt so lang als die Mittelzehe; Hinternagel etwas aufgerichtet.

Färbung: Schnabel und Füße schwarz; Iris graubraun; Nasenfedern, ein kleiner Strai-

fen von ihnen über dem Zügel weg bis zum Auge, Kinn, Kehle, Bauch, Schenkel, After und Steifs weiß; Zügel schwärzlich; ein schwarzer Streifen zieht vom Unterkiefer an jeder Seite der weissen Kehle hinab; Backen und Ohrgegend weißlich; alle Obertheile dunkel aschgrau, Unterhals, Brust und Oberbauch ebenfalls, aber ein wenig blässer; kleine obere Flügeldeckfedern bräunlich-dunkelgrau, mit weisssgrauen Rändern; mittlere vordere Flügeldeckfedern schwarz, zum Theil mit weislichem Spitzenrande; vorderer Flügelrand weißlich; Schwungfedern schwarz, die vorderen bloß an der Wurzel ein wenig weiß, diese Farbe nimmt aber nach hinten immer zu, so daß die mittleren Schwungfedern allmählig immer mehr weiß, und einige von ihnen gänzlich weiß, und nur an der Spitze noch ein wenig schwarz sind; hierdurch entsteht ein großer weißer Fleck in der Mitte des Flügels, auch ist der Spitzenrand der mittleren Schwungfedern weiß; hintere Schwungfedern schwarzbraun, rundum weißlich gerandet; Schwanzfedern bräunlich-schwarz, mit starken weisssgrauen Spitzen; die äußere Feder an der äußeren Fahne mit weißem Saume.

Ausmessung: Länge 8" — Der vollkommen ausgefederte Vogel, nach *Azara*, 9" —

L. d. Schnabels 9''' — Höhe d. Schn. $2\frac{1}{2}$ ''' —
Br. d. Schn. $3\frac{1}{2}$ ''' — Höhe d. Ferse 12''' — L.
d. äusseren Z. $4\frac{1}{2}$ ''' — L. d. inneren Z. $4\frac{1}{3}$ ''' —
L. d. Mittelzehe 7''' — L. d. Hinterzehe $3\frac{1}{2}$ ''' —
L. d. Mittelnagels 3''' — L. d. äusseren N. $1\frac{1}{3}$ '''
— L. d. Hinternagels über 3''' — L. d. Flü-
gels 5'' 2'''.

Dieser Vogel hat in der Färbung einige Aehnlichkeit mit *Muscicapa velata*, ist aber dunkler von Farben, die Gestalt ist in der Hauptsache dieselbe. Ich erhielt von dieser Species nur ein einziges Exemplar in den trockenen, dürren Gebüschchen der Gegend von *Ressaque*, unweit *Varede* im Sertong der Provinz *Bahia*, wo dieser Vogel, gleich den übrigen verwandten Arten, den *Suiriris* und *Pe-poazas* des *Azara*, auf der Spitze eines Strauchens auf Insecten lauert.

Dr. v. Spix hat ihn mittelmässig gut abgebildet, Kopf und Schnabel der Abbildung sind zu klein, dabei trägt der Vogel den Schwanz selten so breit geöffnet. Der von dem gelehrten Reisenden beschriebene Vogel stammt aus *St. Paulo*, diese Art scheint also über den grössten Theil von Brasilien verbreitet zu seyn, auch das Museum in Berlin erhielt ihn aus jener Provinz. Weshalb der Vogel *polyglotta* ge-

nannt wurde, weiß ich nicht, da mir diese Art, wie die andern, ziemlich stumm scheint, und wir wenigstens keine Stimme von ihr vernommen haben.

23. *M. rustica*, Licht.

Der grünlich-graue Fliegenfänger.

Fl. Ganzer Körper olivengrau, am Bauche heller und gelblich überlaufen; Weibchen und jüngere Vögel an Flügeln und Schwanz roströthlich gerandet.

M. cinerascens, Spix T. II. pag. 16. Tab. 21.

? *Le Souiriri commun d'Azara.*

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel stark, etwa halb so lang als der Kopf, gerade, mäßig breit, kaum um ein Dritttheil breiter als hoch; Firste gerade, zuweilen kaum merklich concav, an der Spitze mit feinem, etwas zusammengedrücktem Häkchen herab gebogen; Nasenloch weit, rundlich, in der vertieften Nasenhaut, mit borstigen Federn leicht bedeckt; Dille vor dem breiten, etwas mehr als ein Dritttheil der Schnabellänge haltenden, abgerundeten und mit borstigen Federn bedeckten Kinnwinkel abgeflächt, nachher etwas kantig; Kopf dick; der ganze Vogel sehr dicht befiedert, Bartborsten am Mundwinkel fünf Linien

lang; Flügel stark, zugespitzt, erreichen die Mitte des Schwanzes, die erste Schwungfeder ist kurz, die dritte und vierte etwa gleich lang und die längsten; Schwanz ziemlich lang und stark, gleich. — Beine kurz; Ferse mit sieben Tafeln belegt, an der oberen Hälfte ihrer Sohle mit vielen scharf sägenförmig vortretenden Längsfalten bedeckt, beinahe zweimal so lang als die Mittelzehe; Hinternagel größer als der mittlere.
Färbung: Iris orangefarben; Schnabel schwarzbraun; Beine fleischbraun; ganzes Gefieder schmutzig grau, etwas olivengrünlich überlaufen, an Brust und Unterleib bläulich-grünlich oder gelblich-grau, besonders neigt sich diese Farbe am Bauche; Flügel und Schwanz graubraun, an den Schwung- und Schwanzfedern mit rothbraunen Schäften; innere Flügeldeckfedern fahl grünlich-grau.

Ausmessung: Länge 7" 6''' — Breite 12" 8''' — Länge d. Schnabels 7 $\frac{1}{3}$ " — Br. d. Schn. 4''' — Höhe d. Schn. 2 $\frac{2}{3}$ " — L. d. Flügels 3" 8 $\frac{1}{3}$ " — L. d. Schwanzes etwa 3" — Höhe d. Ferse 8 $\frac{1}{3}$ " — L. d. Mittelzehe 5''' — L. d. äußeren Z. 3 $\frac{1}{4}$ " — L. d. inneren Z. 8 $\frac{1}{3}$ " — L. d. Hinterzehe 3''' — L. d. Mittelnagels 2 $\frac{1}{2}$ " — L. d. äußeren N. 1 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinternagels 2 $\frac{1}{2}$ ".

Weibchen: Wahrscheinlich nicht bedeu-

tend verschieden, und wie die jüngeren männlichen Vögel an den Schwungfedern rothbräunlich gerandet.

Junger Vogel: An allen größeren Flügel-
federn, so wie an denen des Schwanzes, sehr
stark rothbraun gerandet, auch der hintere
Saum der Schwungfedern ist von dieser Farbe;
Steifs gewöhnlich fahl röthlich-grau, mit ver-
loschenen dunkleren Flecken.

Dieser Fliegenfänger ist ein starker gedrun-
gener Vogel, der, wie ich vermuthe, bloß den
großen Urwäldern angehört, wenigstens habe
ich ihn nur da beobachtet. Er ist still und
einsam, wie seine Geschlechtsverwandten. *Spix*
fand ihn bei *Rio de Jansiro*, mir ist er auch
weiter nördlich vorgekommen.

24. *M. uropygiata.*

Der Fliegenfänger mit gelbem Unterrücken und
Steifs.

*Fl. Kopf und Hals olivenbräunlich, dunkler gestri-
chelt; Obertheile olivenbraun; Unterrücken und
Steifs limonengelb; Schwanz röthlich-braun; Flü-
gel schwärzlich-braun, die Deckfedern breit gelb-
lich-weiß bespitzt; Bauch weiß.*

Beschreibung des männlichen Vogels:
Schnabel stark, Firste gerade, abgerundet, mit

starker, winklig hakenförmig herabgebogener Kuppe, welche eine halbe Linie lang über die Unterkieferkuppe herabtritt und mit einem kleinen Zahne versehen ist; Schnabel von der Mitte an zusammengedrückt; Tomienränder eingezogen; Dille abgerundet, sanft, jedoch ziemlich stark gewölbt aufsteigend; Nasenloch eiförmig, und die dichten, in Borsten endigenden und vorwärts strebenden Nasenfedern treten bis zur Oeffnung vor; Kinnwinkel groß, breit, halb so lang als der Schnabel, vorn abgerundet, mit Federn besetzt, deren Spitzen in schwarze Borsten endigen; Rachen weit, und sein Rand, wie Zügel und Nasengegend, mit schwarzen Bartborsten besetzt, indem die Federn sich in solche endigen; unteres Augenlid von borstig endigenden Federn eingefalt; Flügel ziemlich stark, sie fallen bis auf die Mitte des Schwanzes, die dritte und vierte Feder die längsten; Schwanz stark, breit, ziemlich gleich, in der Mitte kaum bemerkbar ausgerandet; Beine hoch; Ferse mit sechs bis sieben glatten Tafeln belegt; Zehenrücken getäfelt; Mittel- und Hinternagel groß.

Färbung: Alle Obertheile olivenbraun, Kopf, Hals und Brust mehr graulich-olivengrün, auf dem Scheitel dunkler gestrichelt; Zü-

gel- und Nasenfedern mehr olivengrün; Kinn, Kehle und Unterhals graulich-olivengrün, die Federn an ihren Seitenrändern mehr hell graugrün, wodurch ein gestricheltes Ansehen entsteht; Unterbrust und Oberbauch weiß, graugrün längs gefleckt; After, Bauch und Schenkel weiß; Steiß und *uropygium* limonengelb; Flügel dunkel röthlich-graubraun, mittlere und große Deckfedern mit breitem, gelblich-weißem Spitzenrande, wodurch über diesen Theil zwei oder drei helle Querbinden entstehen; Schwungfedern dunkel graubraun, mit röthlich-olivengrünem Vorder- und gelblich-weißem Hintersaume; hintere Schwungfedern mit röthlich-weißem Spitzensaume; Schwanz röthlich-braun, mehr röthlich als alle übrigen Theile, an der Unterseite blässer; Seiten olivengelblich gestrichelt; Schnabel schwärzlich, am Unterkiefer weißlich hornfarben, mit dunklerer Spitze und Wurzel; Beine dunkel bräunlich-fleischfarben. —

Ausmessung: Länge 6" 7''' — L. d. Schnabels 8''' — Br. d. Schn. $3\frac{5}{8}$ ''' — Höhe d. Schn. $2\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Flügels 3" $3\frac{7}{8}$ ''' — L. d. Schwanzes 2" 6''' — Höhe d. Ferse $9\frac{3}{5}$ ''' — L. d. Mittelzehe 6''' — L. d. äußeren Z. $4\frac{3}{4}$ ''' — L. d. inneren Z. 4''' — L. d. Hinterzehe $4\frac{1}{2}$ ''' — L.

d. Mittelnagels 3''' — L. d. äusseren N. 1½''' —

L. d. Hinternagels 8½''' —

Dieser starke Fliegenfänger, mit ziemlich hohen Beinen, dabei mit gedrungener würgerartiger Gestalt und dickem Kopfe, ist mir während der Dauer meiner Reise nur einmal vorgekommen, und zwar ziemlich weit südlich, am Rio Doce in den grossen Urwaldungen.

25. *M. trivirgata.*

Der Fliegenfänger mit dreistreifigem Kopfe.

Fl. Mitte des Kopfs und ein breites Feld durch jedes Auge schwarz-bräunlich; von der Nase über dem Auge hin ein breiter weisser Streifen; Rücken olivengrün; Flügel und Schwanz schwärzlich-braun, mit helleren Rändern; Untertheile schwefelgelb.

Beschreibung des weiblichen Vogels:

Schnabel ziemlich kurz, stark, gerade, um den vierten Theil breiter als hoch, Firste mässig erhaben, beinahe gerade; an der Spitze schwach hakenförmig herab geneigt, mit kleinem Ausschnitte dahinter; Unterkiefer an der Wurzel abgeflächt, dann aber die Dille ein wenig hervortretend, nur sehr sanft aufsteigend, mit sehr kleinem Ausschnitte vor der Kuppe am Tomienrande; Nasenloch in der glatt angespannten Na-

senhaut, rundlich-eiförmig, die etwas borstigen Nasenfedern treten bis dahin vor; Kinnwinkel etwa ein Dritttheil der Schnabellänge, breit, abgerundet, befiedert; Mundwinkel mit drei und zwei Dritttheil Linien langen Bartborsten besetzt; Federn des Scheitels dicht und etwas verlängert, sie können im Affecte etwas aufgerichtet werden; die Flügel erreichen etwa ein Dritttheil des Schwanzes, die erste Feder ist kurz, die dritte am längsten; Schwanz mäfsig lang, die äusseren Federn nur wenig kürzer als die mittleren; Ferse nicht hoch, etwa um ein Dritttheil länger als die Mittelzehe, mit fünf bis sechs glatten Tafeln belegt; Mittelnagel gröfser als der hintere.

Färbung: Kopf rufsbraun oder fahl bräunlich-schwarz, aber von der Nase zieht ein breiter weifser Streifen über den Auge weg nach dem Hinterkopfe, wo er sich etwas ausbreitet, hierdurch erhält der Kopf, von vorn betrachtet, drei schwärzliche Streifen; denn sein Scheitel ist von dieser Farbe, und ein ähnliches breites Feld zieht vom Mundwinkel durch das Auge, und bedeckt die Ohrgegend; Obertheile bis zum Schwanze graulich-olivengrün; Flügel und Schwanz schwärzlich-graubraun; Schwung- und grofse Deckfedern blässer, zum Theil grünlich,

zum Theil weißlich gerandet; innere Flügeldeckfedern blaß limonengelb; Kinn, Kehle und übrige Untertheile bis zum Schwanze schwefelgelb, an Bauch, After und Steiß sehr lebhaft, an der Brust ein wenig graulich überlaufen; Schnabel und Beine schwarz. —

Ausmessung: Länge 6" — L. d. Schnabels 5" — Br. d. Schn. $3\frac{1}{3}$ " — Höhe d. Schn. 2" — L. d. Flügels 2" $6\frac{1}{2}$ " — L. d. Schwanzes etwas über 2' — Höhe d. Ferse $6\frac{1}{8}$ " — L. d. Mittelzehe $4\frac{3}{4}$ " — L. d. äußeren Z. $2\frac{5}{8}$ " — L. d. inneren Z. $2\frac{3}{8}$ " — L. d. Hinterzehe 3" — L. d. Mittelnagels $2\frac{2}{5}$ " — L. d. äußeren N. $1\frac{1}{5}$ " — L. d. Hinternagels 2". —

Von dieser Species besitzt meine ornithologische Sammlung nur ein weibliches Exemplar, welches aus der Gegend von *Bahía* stammt, von dem ich aber nichts weiter hinzufügen kann, da ich diesen Vogel nicht selbst beobachtete. —

senhaut, rundlich-eiförmig, die etwas borstigen Nasenfedern treten bis dahin vor; Kinnwinkel etwa ein Dritttheil der Schnabellänge, breit, abgerundet, befiedert; Mundwinkel mit drei und zwei Dritttheil Linien langen Bartborsten besetzt; Federn des Scheitels dicht und etwas verlängert, sie können im Affecte etwas aufgerichtet werden; die Flügel erreichen etwa ein Dritttheil des Schwanzes, die erste Feder ist kurz, die dritte am längsten; Schwanz mälsig lang, die äusseren Federn nur wenig kürzer als die mittleren; Ferse nicht hoch, etwa um ein Dritttheil länger als die Mittelzehe, mit fünf bis sechs glatten Tafeln belegt; Mittelnagel grösser als der hintere.

Färbung: Kopf rufsbraun oder fahl bräunlich-schwarz, aber von der Nase zieht ein breiter weisser Streifen über den Auge weg nach dem Hinterkopfe, wo er sich etwas ausbreitet; hierdurch erhält der Kopf, von vorn betrachtet, drei schwärzliche Streifen; denn sein Scheitel ist von dieser Farbe, und ein ähnliches breites Feld zieht vom Mundwinkel durch das Auge, und bedeckt die Ohrgegend; Obertheile bis zum Schwanze graulich-olivengrün; Flügel und Schwanz schwärzlich-graubraun; Schwung- und grosse Deckfedern blässer, zum Theil grünlich,

zum Theil weißlich gerandet; innere Flügeldeckfedern blafs limonengelb; Kinn, Kehle und übrige Untertheile bis zum Schwanz schwefelgelb, an Bauch, After und Steifs sehr lebhaft, an der Brust ein wenig graulich überlaufen; Schnabel und Beine schwarz. —

Ausmessung: Länge 6" — L. d. Schnabels 5" — Br. d. Schn. $3\frac{1}{3}$ " — Höhe d. Schn. 2" — L. d. Flügels 2" $6\frac{1}{2}$ " — L. d. Schwanzes etwas über 2' — Höhe d. Ferse $6\frac{1}{2}$ " — L. d. Mittelzehe $4\frac{3}{4}$ " — L. d. äufseren Z. $2\frac{5}{8}$ " — L. d. inneren Z. $2\frac{2}{3}$ " — L. d. Hinterzehe 3" — L. d. Mittelnagels $2\frac{2}{3}$ " — L. d. äufseren N. $1\frac{1}{5}$ " — L. d. Hinternagels 2". —

Von dieser Species besitzt meine ornithologische Sammlung nur ein weibliches Exemplar, welches aus der Gegend von *Bahía* stammt, von dem ich aber nichts weiter hinzufügen kann, da ich diesen Vogel nicht selbst beobachtete. —

auf dem Flügel entsteht; vordere kleine Flügeldeckfedern schwarz mit grauem Spitzensaume; Schwungfedern bräunlich-schwarz, die mittleren an der Wurzel und dem Vorderrande der Vorderfahne weiß; Schwanz schwarz; Iris graubraun; Schnabel schmutzig hell bräunlich, am Unterkiefer heller; Beine dunkelbraun.

Ausmessung: Länge 5" 5''' — Breite 8" 8''' — L. d. Schnabels 4''' — Br. d. Schn. 3 $\frac{1}{4}$ ''' — Höhe d. Schn. 2''' — L. d. Flügels 2" 6 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Schwanzes etwas 2" — Höhe d. Ferses 8 $\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Mittelzehe 5 $\frac{1}{3}$ ''' — L. d. äußeren Z. 3 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. inneren Z. 3 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinterzehe 2 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Mittelnagels 2 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Hinternagels 3 $\frac{1}{6}$ ''' —

Das *Weibchen* besitze ich nicht, Hr. *Temminck* hat es aber abgebildet und kurz beschrieben.

Unter den mannichfaltigen neuen Entdeckungen, womit *Azara* unsere Kenntniß der süd-americanischen Thiere vermehrt hat, steht dieser niedliche Vogel oben an. Dennoch liefs uns dieser Schriftsteller in Ungewissheit über die Stelle, welche diese Species im Systeme einzunehmen habe, und ich gab über diesen Gegenstand, nach meiner Rückkehr aus Brasilien, eine kurze Nachricht in der *Isis*. Eine

sehr gute Abbildung, die nichts zu wünschen übrig läßt, und besser als die des *Bialetti* ist, hat uns später *Temminck* in seinem schönen ornithologischen Werke gegeben. Die Exemplare dieses Vogels, welche sich in meiner zoologischen Sammlung befinden, stammen zum Theil aus der Gegend von *S. Romão am Rio S. Francisco*, zum Theil verdanke ich sie der Güte des Reisenden, Herrn *Sellow*, aus der Provinz *Rio Grande do Sul*, (ein Beweis, daß diese Species über einen großen Theil von Süd-america verbreitet ist.)

2. *M. psaltria*, Temm. und Schlegel.
Die *G. Guirapata* ist eine Art, die in der Provinz *Guirapata* vorkommt.

Pl. Obertheile schwarz mit röthlich-braunen Feder-
rändern; Kehle, Unterleib und Scapularfedern
weiß; Brust schwarz mit röthlich-braunen Feder-
rändchen; Schwungfedern schwärzlich-braun mit
weißem Vordersaume; Schwanz mit schwachen zu-
gespitzten Federn, die äußerste an jeder Seite
dreimal so lang als die übrigen, an der Wurzel
ohne Bart, an ihrem übrigen Theile bloß an der
äußeren Seite mit einer Fahne.

Le Guirapata d'Atara, Voy. Vol. III. pag. 449.

Temminck pl. col. 286. 296.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Schnabel stark, gerade, mäßig lang und breit,

die Firste etwas abgerundet, an der Kuppe sanft hinab gebeugt, mit einem kleinen, jedoch sehr deutlichen Zahne dahinter; Kiefferrand an den Seiten geradlinig, im Mundwinkel etwas austretend; Nasenloch frei, eiförmig, an der Spitze der Nasenhaut, welche bis dahin befiedert ist; Kinnwinkel groß, mälsig abgerundet, tritt beinahe so weit vor als das Nasenloch, ist mit zerschlossenen lockeren Federn besetzt, welche Borstspitzen haben; Mundwinkel und Zügel mit starken, schwarzen Bartborsten versehen, deren längste fünf Linien in der Länge messen; der Unterkiefer des Schnabels ist an der Dille sehr abgeflacht, nur an der Spitze derselben etwas kantig; Flügel ziemlich kurz, mälsig zugespitzt, die erste Feder ist kurz, die dritte die längste; Schwanz schwach und, mit Ausnahme der äußeren Federn, ziemlich kurz, die Federn schmal und zugespitzt; die äußerste Feder an jeder Seite ist etwa dreimal so lang als die übrigen; an der Wurzel, etwa auf ein Dritttheil ihrer Länge, ist sie ein bloßer dünner Schaft ohne Fahne; an ihrem übrigen Theile hat der Schaft an der inneren Seite ebenfalls keinen Bart, dagegen trägt die äußere Seite einen solchen, der etwa vier und eine halbe Linie breit und auf vier Zoll neun Linien in

der Länge ausgedehnt ist; Beine mässig hoch, ziemlich schlank, Ferse mit sechs bis sieben glatten Tafeln belegt; Zehen schlank, die äusseren an der Wurzel ein wenig vereint; Nägel schlank, sanft gewölbt, ziemlich lang und zugespitzt, der mittlere und hintere sehr gross.

Färbung: Schnabel fahl graubräunlich, am Unterkiefer weisslich; Beine schwarzbräunlich; Oberkopf, Oberhals und Rücken schwarz, aber alle Federn mit starken röthlich-braunen Rändern; Federn des Unterrückens locker, aschgrau mit bräunlichen Spitzen; Seiten des Halses, Ohrgegend und Seitenfedern des Rückens schwarz; Scapularfedern weiss; Deckfedern der Flügel schwärzlich, mit weissen Rändern und Spitzen; hintere grosse Flügeldeckfedern mit rothbraunem Rande; Schwungfedern schwärzlich graubraun, an ihrem Wurzeltheile mit weissem Vordersaume, an dem Spitzentheile röthlich-braun gerandet; an der Hinterfahne mit weislichem Hintersaume; Schwanzfedern schwärzlich graubraun, mit weislichem inneren Saume; die beiden verlängerten Federn haben eine kupferbraun und violet schillernde dunkle Färbung, Kehle und Untertheile weiss, in den Seiten und an den Schenkeln durch die Federwur-

zeln grau; Brust schwarz mit schmalen röthlich-bräunlichen Federrändchen. —

Ausmessung: Länge (nach Azara) 11" 6"
— Breite 9" — Länge d. Schnabels 5" — Br. d. Schn. $3\frac{3}{8}$ " — Höhe d. Schn. 2" — L. d. Flügels 2" 8" — L. d. Schwanzes 6" 3" — Die beiden äusseren Federn treten über um 4" 3" — Höhe d. Ferse $9\frac{1}{4}$ " — L. d. Mittelzehe $5\frac{5}{8}$ " — L. d. äusseren Z. $3\frac{1}{2}$ " — L. d. inneren Z. $3\frac{3}{4}$ " — L. d. Hinterzehe $3\frac{1}{4}$ " — L. d. Mittelnagels $3\frac{1}{8}$ " — L. d. äusseren N. $1\frac{7}{8}$ " — L. d. inneren N. $2\frac{1}{8}$ " — L. d. hintern N. $3\frac{1}{8}$ ". —

Aus der brasilianischen Provinz *Rio Grande do Sul*.

3. *M. coronata*, Linn., Gmel., Lath.

Der Fliegenfänger mit rother Haube und Unterkörper.

Fl. Scheitel mit verlängerten Federn, und so wie alle Untertheile vom Kinn bis zum Schwanz lebhaft scharlachroth; ein Strich durch das Auge, Ohrgegend und alle Obertheile dunkel graubraun.

Churrinche d'Azara, Voyag. Vol. III. pag. 364.

Buff. pl. enl. No. 675. Fig. 2.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt sängerartig, die eines ächten Fliegenfängers. Schnabel mässig stark und groß, ziem-

lich platt gedrückt, auf der Firste stark abgeflacht, beinahe doppelt so breit als hoch, gerade, an der Kuppe mit feinem Häckchen hinabgebogen, dahinter ein kleines Zähnchen; Nasenlöcher länglich, die Nasenfedern treten bis dahin vor; Dille an ihrer Wurzel abgeplattet, an ihrer Spitze etwas kantig und sanft aufsteigend; Kinnwinkel kaum über die Stirnfedern vortretend, mälsig abgerundet, an der Spitze leicht befiedert; schön rothe Federn des Kinnwinkels endigen in schwarze Borsten; Barthorsten über dem Mundwinkel zart und die längsten drei und zwei Dritttheil Linie lang, andere stehen über den Nasenlöchern; Flügel mälsig stark; ziemlich zugespitzt, erreichen beinahe die Mitte des ziemlich gleichen, mälsig starken Schwanzes; die zweite Schwungfeder ist die längste, die dritte giebt ihr wenig in der Länge nach; Beine mälsig hoch, schlank und zierlich; Ferse mit sechs glatten Tafeln belegt; Zehen schlank und zierlich, die äufsern, wie bei allen übrigen Fliegenfängern, an der Wurzel ein wenig vereint; Nägel ziemlich schlank und gewölbt, mälsig groß.

Färbung: Schnabel dunkelbraun am ausgestopften Vogel, an der Wurzel etwas heller; Beine schwarzbraun; Federn des Scheitels ver-

längert, die längsten sechs Linien lang, treten nur sehr wenig über den Hinterkopf hinaus, wenn sie in Ruhe liegen, bilden aufgerichtet eine Haube, welche jedoch *Buffon* unrichtig abbildet, und die man fälschlich mit der der *Rupicola* verglichen hat. — Die Federn der genannten Haube vom Schnabel bis zum Auge und bis in den Nacken, und alle Untertheile des Vogels vom Schnabel bis zum Schwanz sind von einem sehr schönen lebhaften Scharlachroth, am Bauch und After etwas blässer, weil hier die weißliche Mitte der Federn etwas durchleuchtet, Wurzel dieser Federn dunkelgrau; Zügel, Rand des Auges, Seite des Kopfs, Ohrgegend, Seite des Halses, alle Obertheile, Flügel und Schwanz ziemlich dunkel graubraun, bloß an den Rändern der Schwungfedern, und an der äußeren Fahne der äußeren Schwanzfeder etwas heller; innere Flügeldeckfedern wie die Obertheile.

Ausmessung nach dem ausgestopften Vogel: Länge ungefähr 5" (nach *Azara* $5\frac{1}{3}$ ") — L. d. Schnabels $4\frac{1}{2}$ " — Br. d. Schn. $2\frac{1}{4}$ " — Höhe d. Schn. $1\frac{1}{8}$ " — L. d. Flügels 2" 10" — L. d. Schwanzes 2" — Höhe d. Ferse $6\frac{1}{8}$ " — L. d. Mittelzehe $3\frac{7}{8}$ " — L. d. äußeren Z. $2\frac{1}{3}$ " — L. d. inneren Z. $2\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinterzehe

1½''' — L. d. Mittelnagels 2''' — L. d. Hinternagels 2'''.

Aus der Provinz *Rio Grande do Sul*; Lesson fand ihn bei *Lima* *).

Gen. 27. Tyrannus, Briss.

T y r a n n.

Ich habe für dieses Geschlecht aus der grossen Familie der *Muscicapidae* oder *Laniadae* blofs diejenigen Arten der Tyrannen ausgeschieden, welche etwa folgenden Schnabelbau zeigen:

Schnabel: Gross, stark, dick, etwas bauchig aufgetrieben, an den Seiten ein wenig bauchig austretend; Firste wenig scharfkantig erhaben, Kuppe ein ziemlich starker, ein wenig zusammengedrückter Haken.

Flügel lang und zugespitzt, erreichen etwa die Mitte des Schwanzes.

Beine kurz.

Betrachtet man die Schnäbel aller der gewöhnlich zu den Tyrannen gezählten Vögel genau von oben, so wird man finden, daß sie nur bei einigen an der Seitenlinie bogig austre-

*) Lesson, Zool. de la Coquille, Vol. I. pag. 252.

ten, diese allein habe ich unter der Benennung *Tyrannus* zu vereinigen versucht.

A. Gabelschwänzige Tyrannen.

Schwanz gabelförmig oder stark ausgerandet.

1. *T. furcatus.*

Der gabelschwänzige Tyrann mit orangenrothem Scheitel.

T. Scheitel in der Mitte feuerroth, an den Seiten, so wie Kopf und Hals aschgrau; Rücken olivengrün; Flügel und der stark ausgerandete Schwanz schwärzlich-braun, mit helleren Rändern; Kehle und Unterhals weißgrau; Brust und Untertheile schön gelb.

Muscicapa Despotus, Illig.

Muscicapa furcata, Spix T. II. pag. 15. Tab. 19.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel beinahe so lang als der Kopf, stark, dick, gerade, an der Spitze mit feinem Haken und kleinem Zähnchen dahinter; beinahe doppelt so breit als hoch, Firste sanft abgerundet, Seitenlinie des Schnabels nur kaum merklich vor der Kuppe austretend; Nasenloch eiförmig, in der glatt angespannten Nasenhaut vor den kurzen, etwas borstig vorstrebenden Nasenfedern gelegen, Unterkiefer gerade, vor der Spitze

mit sehr kleinem Ausschnitte; Dille an der Wurzel flach abgewölbt, gegen die Spitze hin ein wenig kantig; Kinnwinkel etwa ein Drittheil der Schnabellänge, breit abgerundet, an der Spitze sparsam befiedert; Bartborsten am Mundwinkel mälsig lang; unteres Augenlid ziemlich nackt, nur am Rande mit Federchen besetzt; Flügel stark, zugespitzt, erreichen beinahe die Mitte des Schwanzes, ihre erste Feder ist kurz, die dritte die längste, die vierte nur höchst wenig kürzer; Schwanz stark, ziemlich lang, in der Mitte stark ausgerandet, daher etwas gabelförmig; Beine ziemlich kurz, Ferse dick, mit fünf bis sechs Tafeln belegt; Zehen kurz, der Mittelnagel stärker als der hintere.

Färbung: Iris graubraun; Schnabel und Beine bräunlich-schwarz; in der Ruhe scheint der ganze Kopf und Hals aschgrau, im Affecte aber, wenn die Scheitelfedern gesträubt werden, oder wenn man diese auseinander streicht, zeigt es sich, daß die Federn auf der Mitte des Scheitels an ihrer Wurzelhälfte sehr schön lebhaft feuerroth gefärbt sind, welches man in der Ruhe nicht bemerkt; Gegend des Zügels, und des Ohres etwas schwärzlich-grau; Rücken bis zum Schwanze graulich-olivengrün, oft aschgrau gemischt; Flügel und Schwanz schwärz-

lich-graubraun, Ränder der Deckfedern grügrün, oder blass graubraun; die der Schwungfedern gelblich-weiß; Schwanzfedern mit blässerem Spitzensaume; innere Flügeldeckfedern hell limonengelb; Kinn, Kehle und Unterhals hell weißgrau; übrige Untertheile schön lebhaft citrongelb; an der Brust graulich-grün überlaufen.

Ausmessung: Länge 8" — L. d. Schnabels $9\frac{1}{2}$ " — Breite d. Schn. 5" — Höhe d. Schn. $3\frac{1}{4}$ " — L. d. Flügels 4" $\frac{5}{8}$ " — L. d. Schwanzes 3" 6" — Höhe der Ferse $6\frac{2}{3}$ " — L. d. Mittelzehe $5\frac{1}{4}$ " — L. d. äußeren Z. $8\frac{1}{4}$ " — L. d. inneren Z. $3\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinterzehe 3" — L. d. Mittelnagels $2\frac{2}{3}$ " — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{2}$ ". —

Weibchen: Von dem Männchen nicht verschieden, nur scheint die rothe Scheitelfarbe etwas weniger, und die grauen Spitzen der Scheitelfedern mehr bräunlich beschmutzt oder gerandet, Rücken mehr grau gemischt.

Dieser Tyrann oder Fliegenfänger ist unter allen Vögeln in den von mir bereis'ten Gegenden einer der gemeinsten. Er ist besonders häufig in den südlichen Gegenden, bei *Rio de Janeiro*, *Cabo Frio*, am *Parahyba*, *Espirito Santo* u. s. w. — Ueberall fand ich ihn auf einem

isolirten Baume oder Strauche sitzend, wo er auf Insecten lauerte, und man beobachtete ihn sowohl in der Nähe der Seeküste, als auch in den inneren Gegenden des Landes, wo er besonders die mit Gebüsch abwechselnden Triften liebt. Er ist ein stiller, melancholischer Vogel, der einen großen Theil des Tages unbeweglich sitzend hinbringt, wie die meisten Arten der großen Fliegenfänger oder Tyrannen. Oefters fliegt er auf, fängt ein Insect, und fällt wieder auf seinem Standorte ein, läßt dabei auch seine mehrmals wiederholte helle Stimme hören. Gewöhnlich war dieser Vogel der erste, der uns bei unseren Jagdexcursionen aufstieß, auch konnte man sich ihm sehr nähern, bevor er abflog. Den menschlichen Wohnungen kommt er sehr nahe; denn es beunruhigt ihn niemand. Raubvögel werden stets von diesen und anderen verwandten Vögeln, nach Art der Elstern ge-neckt und verfolgt, hierin ist aber besonders der Bentavi (*Muscic. Pitangua*) geübt, sie lassen alsdann ihre Stimme häufig hören, auch sind bei solchen Gelegenheiten, besonders wenn es über eine Eule hergeht, alle diese Vögel sehr kühn.

Das Nest unseres Vogels fand ich zu *Villa de S. João da Barra* an der Mündung des Pa-

rahyba im Monat November, in dem mit Orangenbäumen bepflanzten Hofraume unseres Hauses. Es stand sechs bis acht Fufs hoch von der Erde in der Gabel eines Orangenbaumes, war halb kugelförmig, flach, oben offen, sehr einfach gebaut, aus Reischen zusammengelegt, inwendig mit *Tillandsia*-Fäden ausgefütert. Die in dem Neste befindlichen beiden Eier waren weifs, am stumpfen Ende mit einem dunkelbraunen Fleckenkranze.

Dr. v. Spix bildet diesen Vogel *Tom. II. Tab. 19.* ab, er ist nicht zu verkennen, allein die rothe Farbe auf dem Kopfe ist nicht gut getroffen. Er sagt, man nenne diesen Tyrannen *Pendivim* (Pendivi), welches aber wahrscheinlich auf den früher beschriebenen Bentavi bezogen werden mufs. Bonaparte beschreibt seinen *Muscicapa verticalis* (*amer. orn. vol. I. pag. 18*) unserem Vogel sehr ähnlich, doch scheinen beide verschieden zu seyn.

B. Tyrannen mit gleichem Schwafze
 Schwanz gleich. (Schwanz gleich.)

2118 *T. audax*, Vieill. (Schwanz gleich.)

Der gekürzte Tyrann

**T. Körper gelblich-weiß und stark dunkel grau-
 braun gestrichelt oder längsgefleckt; über und un-
 ter dem Auge ein starker gelblich-weißer Strei-
 fen; Scheitel auf seiner Mitte hochgelb; Schwanz-
 federn rothbraun gerandet.**

Muscicapa audax, Linn., Gm., Leth., Licat.

Le Caudec, Buff., Sonn. Vol. 14, p. 241.

Buff. pl. enl. No. 453, Fig. 2.

De Souvéri tout tacheté d'Azura, Voyag. Vol. 113.

PAG. 388.

Beschreibung des männlichen Vogels: Ge-
 stalt schlank; Schnabel dick, beinahe so lang
 als der Kopf, beinahe um ein Dritttheil breiter
 als hoch, rundlich aufgetrieben, an den Seiten
 etwas bogig austretend; der Haken zusammen-
 gedrückt, dünn, um zwei Dritttheil Linie über
 den Unterkiefer herabtretend, mit einem klei-
 nen Zahne dahinter; Firste etwas flach abge-
 rundet; Nasenloch rundlich, etwas unter den
 borstigen Nasenfedern verborgen; Unterkiefer
 breit, vor dem kurzen, breiten, abgerundeten,
 und mit borstig endenden Federn bedeckten
 Kinnwinkel rundlich abgeflacht, die Dille nach

der Spitze ein wenig kantig allmählig aufsteigend; Tomienrand des Unterkiefers vor der Kuppe mit einem kleinen Ausschnitte; Zunge mit sehr dünner, platter, hornartiger, an den Seiten gefranster Spitze; Augenlid am Rande mit kleinen Federchen besetzt; Borsten des Mundwinkels fein, zart, und nicht besonders lang; Flügel stark, lang und zugespitzt, sie erreichen etwa die Mitte des Schwanzes, die erste Feder ist kurz, die dritte die längste, alle Schwungfedern schmal und zugespitzt; Schwanz stark, aus schmalen, an der Spitze abgerundeten Federn zusammengesetzt, sie sind gleich lang, und die äußerste hat eine sehr schmale äußere Fahne; Ferse zusammengedrückt, mit fünf glatten Tafeln belegt, nicht viel länger als die Mittelzehe; Hinter- und Mittelnagel groß und stark gewölbt.

Färbung: Iris graubraun; Schnabel bräunlich-schwarz; Beine schwärzlich-bleifarben; über der Nase entspringt ein gelblich-weißer Streifen, der über dem Auge weg nach dem Hinterkopfe zieht; ein ähnlicher entspringt am Unterkiefer und endet unter dem Ohre; Zügel und ein breites Feld, in welchem das Auge steht und welches das Ohr deckt, schwarzbraun, eben so ist der Scheitel, dessen Federn indes

sen auf der Mitte nur braune Spitzen haben, und übrigens schön citrongelb gefärbt sind, wie bei vielen der verwandten Vögel; an jeder Seite des Scheitels sind die Federn gänzlich braun, weshalb der Vogel die gelbe Farbe gänzlich verbergen kann; Federn des Rückens und der Schultern schwärzlich-braun mit weißgelblichen Seitenrändern, wodurch ein gestricheltes Ansehn entsteht; eben so Deck- und Schwungfedern, sämmtlich aber gelblich weiß, auch einige röthlich-braun eingefalst; Schwungfedern an der hinteren Fahne mit blaßgelbem Hinterrande; innere Flügeldeckfedern blaßgelb, mit feinen schwarzbraunen Längsstrichen; Unterrücken graubraun, rostroth gefleckt, alle Federn rostroth eingefalst; Kehle weißlich mit schmalen, schwarzbraunen Längsstrichen; Brust und übriger Unterleib blaßgelblich, mit starken, schwarzbraunen Längsflecken, die an der Brust am stärksten und längsten sind; Schwanz schwärzlich-braun, die Federn an der äußeren Fahne rothbraun eingefalst.

Ausmessung: Länge 8" 2''' — Breite 12" 4''' — L. d. Schnabels 9''' — Br. d. Schn. 5''' — Höhe d. Schn. 3½''' — L. d. Flügels 4" 2½''' — L. d. Schwanzes über 8" — Höhe d. Ferses 7¼''' — L. d. Mittelzehe 6''' — L. d. äu-

äusseren Z. $4\frac{1}{2}'''$ — L. d. inneren Z. $3\frac{1}{2}'''$ — L. d. Hinterzehe $3\frac{2}{3}'''$ — L. d. Mittelnagels $3'''$ — L. d. äusseren N. $1\frac{1}{4}'''$ — L. d. Hinternagels $3\frac{1}{5}'''$.

Junges Männchen: Gleicht dem alten vollkommen, nur fehlt ihm die gelbe Farbe auf dem Scheitel; die Federn sind an diesem Theile dunkelbraun mit helleren, röthlich-braunen Einfassungen, die weisslichen Zeichnungen am Oberleibe sind weniger deutlich und nett, die weissen Kopfstreifen mehr schmutzig, der Unterleib mehr weisslich und weniger gelb, und der Schwanz breiter und stärker rostroth gerandet.

Weibchen: Nur wenig von dem Männchen verschieden.

Dieser grosse Fliegenfänger hat die Lebensart und Manieren der übrigen Tyrannen. Raubvögel werden von ihm verfolgt, und er sitzt gewöhnlich still und isolirt da, bis eine Gelegenheit zum Raube sich darbietet. Er hält sich in offenen, mit Gebüsch abwechselnden Gegenden, und nicht blofs am Wasser auf, wie man gesagt hat. Den ersten Vogel dieser Art erhielt ich zu *Muribeca* am Flusse *Itabapua-na*, er kommt aber auch weiter südlich vor; denn *Azara* beschreibt ihn für *Paraguay* und

Buffon aus Cayenne, woraus sich ergibt, daß
er über den größten Theil von Südamerika ver-
breitet ist.

Buffon giebt (No. 453. Fig. 2.) eine gute
Abbildung dieser Species, die ist aber in den
Farben zu hell gehalten, der brasilianische Vor-
gel hat an Unterrücken und Schwanz weniger
Rostroth, der Rücken ist weißlich, und nicht
braun gefleckt, die Beine sind anders ge-
färbt u. s. w.

Gen. 28. *Muscipeta*, Cuv.

Fliegenschnäpper.

In den vorhergehenden Geschlechtern habe
ich der Fliegenfänger mit schmälern Schnabel
erwähnt, welche mir auf meiner Reise vorge-
kommen sind, ich fasse nun unter der Benen-
nung *Muscipeta*, die mehr platt- und breit-
schnäbligen zusammen, die sich durch ihre
Schnabelbildung allmählig immer mehr an die
wahren *Platyrynchos* anschließen. Auch hier
zeigt sich wieder, wie bei *Muscicapa*, eine
Reihe von Uebergängen, und da hier die Na-
tur keine scharfen Gränzlinien zog, so muß
die Willkühr bei der Bildung dieser verwand-

mit sechs glatten Tafeln belegt; Hinternagel gröfser als der mittlere.

Färbung: Iris dunkelbraun, Schnabel schwarzbraun; Beine schwarz; Obertheile graulich-olivengrün; Scheitel, besonders die Stirn aschgrau überlaufen; von der Nase zieht eine undeutliche, weißliche Linie nach dem Auge hin, und setzt hinter demselben noch ein wenig fort; an der Umgebung des Auges stehen weißliche Federn; Kehle graulich-weiß; Flügel schwärzlich-graubraun, die Deckfedern breit hell gelbgraulich gerandet, wodurch zwei etwas undeutliche Querstreifen auf diesem Theile entstehen; hintere Schwungfedern breit weißlich gerandet, die mittleren mit gelblichem, die vorderen mit olivengrünlichem Saume; Schwanz, wie die Flügel, mit olivengrünlichem Außensaume der Federn; Brust hell graugelb, etwas limonengelb gestrichelt; Unterbrust, Bauch und Steiſs von einer angenehmen blassen Limonfarbe.

Ausmessung: Länge 4^u 6^u $\frac{1}{2}$ ^u — Breite 5^u 8^u $\frac{1}{2}$ ^u — L. d. Schnabels 2^u $\frac{3}{4}$ ^u — Br. d. Schn. 2^u $\frac{3}{4}$ ^u — Höhe d. Schn. 1^u — L. d. Flügels 2^u 3^u $\frac{1}{2}$ ^u — L. d. Schwanzes 1^u 7^u $\frac{1}{2}$ ^u — Höhe d. Ferses 6^u $\frac{1}{2}$ ^u — L. d. Mittelzehe 3^u — L. d. äußeren Z. 2^u $\frac{3}{4}$ ^u — L. d. inneren Z. 2^u $\frac{1}{4}$ ^u — L.

d. Hinterzehe 2^{1/2} — L. d. Mittelfingers 1 1/2 —

L. d. Hinternagels 2^{1/2} —

Männlicher Vogel: Auf dem Kopfe sind die Federn grünlich wie auf dem Rücken, allein der ganze Zügel, so wie ein starker deutlicher Streifen über dem Auge sind weiß, auch unter dem Auge befinden sich einige weiße Federn; Rücken ein wenig mehr lebhaft grün, die Brust dunkler grau als am Weibchen, auch die gelbe Bauchfarbe etwas lebhafter. Das Männchen scheint um einige Linien größer zu seyn. Dieser kleine Fliegenfänger hat auf den ersten Anblick viel Aehnlichkeit, besonders wenn man ihn im Profil betrachtet, mit unserm Laubvögelchen (*Sylvia sibilatrix* oder *Pittis*), bis man seinen Schnabel von oben ansieht, wo alsdann dessen Breite sogleich auffällt. Er ist ein ziemlich gebauchtes Vögelchen, das mir aber nur selten vorgekommen ist. Ich erhielt ihn in den südlichen Gegenden, bei Rio de Janeiro und Cabo Frio. Er scheint *Spiz's Platyrhynchus brevirostris* zu seyn; dessen Abbildung ist aber alsdann ziemlich schlecht, die Färbung nicht tübel, die Flügelränder nicht hell genug, Gestalt und Stellung schlecht. Auch *Spiz* erhielt diese Art bei Rio de Janeiro.

2. *M. incanescens.*

Der kleine weifsgraue Fliegenschnäpper.
Fl. Obertheile aschgrau, olivenfarben überlaufen;
ein Strich bis zum Auge; Kinn, Kehle, Unterhals
und Brust weifsgrau; Flügel und Schwanz dunkel
graubraun, die Federn der ersten stark weifs-
grau gerandet; Bauch bei dem Männchen weifs-
lich, am Weibchen gelblich; ist kaum gröfser als
Sylvia rufa. —

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel kurz, ohne eigentlichen Haken, aber
mit sehr kleinem Zähnchen; Firste kantig sanft
gewölbt, die Dillenkante ebenfalls und etwas
aufsteigend; am Mundwinkel tritt der Schna-
belrand etwas breiter gewölbt aus als die Stirn,
und ist zweimal so breit als hoch; Nasenlöcher
länglich-rund, in der Mitte der grossen, ver-
tiefsten Nasenhaut, die Nasenfedern bedecken
sie zum Theil, ihre Borstenfedern streben vor;
Klauenwinkel grofs, breit, abgerundet, mit bor-
stig endigenden Federn bedeckt; Flügel etwa
die Mitte des Schwanzes erreichend, mäfsig zu-
gespitzt, die zweite Feder die längste; Schwanz
mäfsig stark, die Federchen abgerundet; Beine
mäfsig hoch, Ferse mit fünf bis sechs
mäfsig anderthalbmal so
— hinternagel der gröfste.

Färbung: Schnabel bräunlich-schwarz;
Iris gelblich-braun; Beine dunkelgrün; Ober-
theile grau, bräunlich überlaufen; auf dem
Kopfe braun gefleckt; Flügel und Schwanz dunkel
graubraun, mit starken weißlich-großen
Rändern an den Deck- und Schwungfedern, wof-
durch auf erstem zwei weißes Quersbänder ent-
stehen; innere Flügeldeckfedern weiß; Kinn,
Nasenstreif bis zum Auge, Kehle, Unterhals
und Brust blafs, weißgrau, an Kinn und Kehle
mehr weißlich; Unterleib weißlich, kaum merk-
lich gelblich überlaufen.

**Ausmessung nach einem ausgestopften Ex-
emplare:** Länge 4" 3''' — Breite 6" 11''' —
L. d. Schnabels 3½''' — Br. d. Schn. 2¼''' —
Höhe d. Schn. 1''' — L. d. Flügels 2" — L.
d. Schwanzes etwa 1" 6''' — Höhe d. Ferse 6'''
— L. d. Mittelzehe 3¼''' — L. d. äußeren Z.
2½''' — L. d. inneren Z. 2¼''' — L. d. Hinter-
zehe 2''' — L. d. Mittelnagels 1½''' — L. d.
Hinternagels 1½'''.

Weibchen: Oberkopf aschgrau, graubraun
gestrichelt; Rücken olivengrau, also mehr grün-
am Männchen; Brust sehr blafs grau,
gelblich überlaufen; Unterleib stär-
ker als am Männchen, wo

er beinahe weiß ist; Ränder der Flügeldeckfedern weit breiter als am Männchen.

Dieser kleine Fliegenschnäpper, wovon sich eine Paar in meiner zoologischen Sammlung befindet, lebt in Brasilien, und ich erhielt ihn aus der Gegend von Bahia, wo er nicht häufig vorkommt. Er hat in der Färbung viel Aehnlichkeit mit dem von mir unter der Benennung des *Hylophilus cinerascens* beschriebenen Vogel, ist aber dennoch sehr verschieden von ihm.

B. Schlankschnäblige Fliegenschnäpper.

Schnabel zwar breit, aber etwas verlängert, daher mehr schlank erscheinend.

3. *M. strigilata*.

Der gestrichelte Fliegenschnäpper.

Fl. Oberkörper fahl braungrau, Flügel Federn mit feinen blässerem Rändchen; Untertheile weißlich, stark mit graubraunen Längsstrichen bezeichnet; Steiße schön hell gelbröthlich.

Beschreibung des weiblichen Vogels:

Schnabel stark, gerade, an der Spitze mit feinem, starkem Haken und kleinem Ausschnitte oder Zähnchen dahinter; Nasenlöcher rundlich, klein, an der Spitze der vertieften Nasen-

haut, die mit vorstrebenden Borsten bedeckt ist; Schnabel nicht ganz noch einmal so breit als hoch, an seinen Seiten etwas bogig austretend, vor der Spitze wieder zusammengedrückt; Unterkiefer an der Spitze nur sehr sanft aufsteigend; Kinnwinkel etwa ein Drittel der Schnabellänge haltend, abgerundet, und mit borstig endenden Federn bedeckt; Bille vor dem Kinnwinkel abgeflacht, vor der Unterkieferkuppe kantig; Bartborsten am Zügel zwischen drei und vier Linien lang; Flügel ziemlich lang und zugespitzt, die dritte Feder die längste; Schwanz ziemlich kurz, in der Mitte nur sehr wenig ausgerandet; Beine mäßig hoch, schlank; Ferse schlank, mit fünf bis sechs glatten Tafeln belegt, etwa anderthalbmal so lang als die Mittelzehe; Mittel- und Hinternagel schlank und ziemlich gewölbt, beinahe gleichgroß, mit

Färbung: Schnabel und Beine bräunlich-schwarz; alle Obertheile fahl graubraun, die Federn auf der Mitte ein wenig dunkler, an den Rändern etwas blässer; Flügel graubraun, alle Federn mit feinen blässeren Rändern; Gesicht, Zügel, Kinn, Kehle und alle Untertheile weißlich, graubraun gefleckt; an Unterhals, Brust und Bauch stehen sehr viele starke, graubraune Längsstreifen, die sich in den Seiten in

einen graubraunen Ueberzug vereinigt; Unterbauch und Steiſs blässer und sparsamer gefleckt; Steiſs von einem angenehmen, saftigen Gelbroth; Schenkel grau-bräunlich; innere Flügeldeckfedern fahl weifsgrau-bräunlich.

Ausmessung: Länge, nach einem abgestopften Exemplare, 5" 3^{mm} — L. d. Schnabel 4¹/₂" — Breite d. Schn. 2¹/₂" — Höhe d. Schn. 1¹/₂" — L. d. Flügels 2" 7¹/₂" — L. d. Schwanzes 2". — Höhe der Ferse 6^{mm} — L. d. Mittelzehe 3¹/₂" — L. d. äusseren Z. 3" — L. d. inneren Z. 2¹/₂" — L. d. hinteren Z. 2¹/₂" — L. d. Mittelnagels 2" — L. d. äusseren N. 1¹/₂" — L. d. Hinternagels 2". —

Dieser Vogel ist mir nur im weiblichen Geschlechte vorgekommen. Das Exemplar, welches sich in meiner zoologischen Sammlung befindet, stammt aus der Gegend von *Camamá*, südlich von *Bahia*.

4. *M. fuscata*.

Der braune limonenbüschige Fliegenschwapper.

Fl. Obertheile olivenbraun: Flügel schwärzlich-graubraun: zwei starke rüthlich-braune Querstreifen auf den Flügeldeckfedern; Schwanz dunkel graubraun: Kehle. Untertheil und Seiten olivengrün;

Mitte des Halses und der Brust: Halslinienangeth; ein bläugellicher Strich über den Augen; eine Beschreibung des männlichen Vogel; Schnabel ziemlich verlängert, doppelt so breit als hoch, an den Seiten kaum merklich bogig austretend, die kleine Hakenkuppe ein wenig zusammengedrückt mit kleinen, Zähnen oder Haken dahinter, fächerförmig kantig erhaben; Nasenloch leiförmig rund, die etwas beständig endenden Federn treten bis dahin vor; Nasenhaut nicht vertieft; Unterkiefer abgeflacht, tritt vor der Kuppe kantig, ein Umrundungsrund vor der Spitze ein wenig ausgeschüßten; Kinnwinkel breit, groß, abgerundet, mit beständig vordem Federn bedeckt; Backenröhre am Mundwinkel zum Theil flach; Linien lang; Augenlid bedeckt; Flügel ziemlich lang, erreichen etwa die Mitte des Schwanzes, die erste Feder ist die dritte die längste; Schwanz ziemlich stark, Federn kurz zugespitzt, die mittleren etwas länger, daher dieser Theil sanft abgerundet; Beine mäßig hoch, Ferse nicht völlig zweimal so lang als die Mittelzehe, mit sechs glatten Tafeln belegt; Hinternägel viel größer als der mittlere; **Färbung:** Schnabel am Oberkiefer und der Spitze des unteren schwarzbraun, Wurzel des

unteren: weißlich-gelb; Beine schwarzbraun; Iris graubraun; Augenlid gelblich; hinter den Nasenlöchern beginnt ein blaß-gelbliches Streifen, der über dem Auge hindläuft, das obere theils so wie die dichten, etwas verlängerten Federn des Oberkopfs dunkel bräunlich-schwarz bräun, am Mittel- und Unterrücken mehr röthlich-braun; neben ihm die kleinen oberen Flügeldeckfedern; mittlere und größere Flügeldeckfedern; die Schwungfedern und Schwanz dunkel graubraun, mit Schwärzliche ziehend; die Spitzen der großen Deckfedern mit breiten, fast rosträhnlichen Spitzen, wodurch auf dem Schnaberte zwei starke gelbbüchliche Querstreifen entstehen; kleinere Flügeldeckfedern blaß himmelsgelb; Kehle schmutzig weißgelblich-grau; Unterhals und Oberbrust blaugrau, gelb; so die Seiten des Körpers; Mitte der Brust und des ganzen Unterleibes bis zum Schwanz blaß himmelsgelb; Steiß ein wenig graubräunlich überlaufen; die Längs der Ferse daher länger, Längen völlig nicht erreicht, aber gleich und

Messung: Länge 5¹¹/₁₆ — Breite 6¹¹/₁₆ — L. d. Schnabels 5¹¹/₁₆ — L. d. Schn. 6¹¹/₁₆ — H. d. Schn. 1¹/₂ — L. d. Flügels 2¹¹/₁₆ — L. d. Schwanzes beinahe 2¹¹/₁₆ — Höhe d. Ferse 6¹/₂ — L. d. Mittelzehe 4¹¹/₁₆ — L. d. äußeren

Z. $2\frac{1}{2}'''$ — L. d. Hinterzehe $2\frac{1}{2}'''$ — L. d. Mittelnagels $2'''$ — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{2}'''$. —

Weibchen: Von dem Männchen kaum bemerkbar verschieden, die Brust ist vielleicht etwas blässer gefärbt. Der Streifen über dem Auge scheint bei dem Männchen deutlicher zu seyn.

Junger Vogel: Er ist kleiner, die Federn noch unansehnlich, die Färbung aber die der alten, nur in allen Theilen heller und mehr gelbröthlich-braun, die Flügel mehr hell röthlich-bunt, Kehle graugelblich, Bauch weißlich.

Dieser Vogel hat bei dem ersten Anblicke viel Aehnlichkeit mit *Muscicapa chrysoceps*, doch ist er größer, und es fehlt ihm gänzlich der gelbe Scheitel, er ist also nicht zu verwechseln. Beide leben in einerlei Gegend und haben selbst dieselben Manieren und Eigenheiten, doch ist mir *fuscata* viel häufiger vorgekommen. Ich habe von diesem viele junge Vögel erhalten, das Nest aber nie gefunden.

*G. Dick schnäbelige Fliegenschnäpper mit
abgestuften Schwanze.*

*Schnäbel ziemlich kurz, dick, breit. Schwanz stark
abgestuft.*

5. M. splendens.

Der Fliegenschnäpper mit stahlglänzendem Scheitel.

*Fl. Oberkörper schwärzlich, der untere aschgrau;
Flügel schwarz, überall weiß gerandet, hierdurch
drei weiße Querstreifen auf den Deckfedern;
Schwanz schwarz mit weißen Spitzen; Scheitel
mit verlängerten, dunkel stahlglänzenden Federn.*

Beschreibung des männlichen Vogels:
Gestalt etwas mit *Lanius* verwandt. Schnäbel
stark, breit, mit deutlichem Haken und Zäh-
chen, nicht zusammengedrückt, sondern kaum
merklich an den Seiten ausgebreitet; Unterkie-
fer mit flach gedrückter Dille, breit, sanft nach
der Spitze aufsteigend; Nasenlöcher klein, rund,
von den Nasenfedern beinahe bedeckt; Kinn-
winkel breit, abgerundet, borstig befiedert;
Mundwinkel mit mäsig starken Borsten besetzt;
Augenlid nur am Rande befiedert; Flügel mä-
sig lang, zugespitzt, fallen über das erste Dritt-
theil des Schwanzes hinaus, die dritte Feder
scheint die längste; Schwanz mäsig stark, sehr
abgestuft, die äußere Feder um sechs Linien

kürzer als die mittleren; Ferse ziemlich hoch, anderthalbmal so lang als die Mittelzehe; äussere Zehe länger als die innere; Mittel- und Hinternagel stärker als die übrigen.

Färbung: Iris graubraun; Schnabel bleifarben; Beine dunkelgrau; Scheitel mit verlängerten, breiten, festen, am Ende abgerundeten, schön dunkel stahlblau glänzenden Federn bedeckt, welche zu einer Haube aufgerichtet werden können; Oberhals, Rücken, Flügeldeck- und Schwanzfedern schwarz; Scapularfedern weiss; mittlere und grosse Flügeldeckfedern mit starken weissen Spitzen, wodurch drei schiefe weisse Queerstreifen auf dem Oberflügel entstehen; Schwungfedern schwarzbraun, mit gelblich-weissem Vordersaume; mittlere Schwanzfedern ungefleckt, die übrigen mit weissen Spitzen, welche an den äusseren Fahnen am breitesten sind; Seiten des Kopfs und Halses schwärzlich-ashgrau, alle Untertheile ashgrau, Bauch, Steiss und After blässer.

Ausmessung: Länge 6" 2''' — Breite 9" 2''' — L. d. Schnabels $5\frac{1}{3}$ ''' — Höhe d. Schn. $2\frac{1}{3}$ ''' — Br. d. Schn. $3\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Flügels 2" 10''' — L. d. Schwanzes 2" 3 bis 4''' — Höhe d. Ferse $7\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Mittelzehe $4\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äusseren Z. $3\frac{1}{3}$ ''' — L. d. inneren Z. $2\frac{1}{2}$ ''' — L.

di Hinterkehe 3''' — L. d. Mittelnagels 2½''' —
L. d. äußeren N. 1½''' — L. d. Hinternagels
2½''' —

Dieser Fliegenschnäpper ist ein schöner Vo-
gel, der mit mehreren Arten des Geschlechts
Myiothera, so wie mit *Lanius* in Farbe und
Gestalt Aehnlichkeit zeigt, durch seinen Schna-
belbau aber zu *Muscipeta* gehört. Ich habe
ihn nicht häufig erhalten, und kann über sei-
ne Lebensart nichts hinzufügen.

Noch befindet sich ein anderer sehr ähn-
licher männlicher Vogel in meiner Sammlung,
welchen ich für einen jungen der eben be-
schriebenen Art halte. Er ist etwas kleiner,
seine Zehen scheinbar ein wenig kürzer, übrig-
ens alles gleich, bis auf die hellere Färbung
der aschgrauen Theile. Der Schnabel scheint
ein wenig mehr breit und bauchig, der Rücken
viel blässer aschgrau, die Untertheile sind weiß-
lich-aschgrau, so wie die Seiten des Kopfes und
Halses; Scheitel metallglänzend, aber nicht so
lebhaft. —

M. marginata.

Der Fliegenschnäpper mit gelbgerandeten Flügelfedern.

Fl. Obertheile gräulich-olivengrün, *Scheitel* braun überlaufen; *Untertheile* bläß grüngelblich; *Flügel* schwarzbraun mit breiten, gelbröthlichen Federräumen; *mittlere Schwanzfedern* olivengrün, die übrigen schwarzbraun mit rostgelben Spitzen.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel dick, sehr breit, nicht völlig, jedoch beinahe noch einmal so breit als hoch, an dem Kiefferrande ein wenig büchtig austretend, die Spitze als kleiner Haken hinabgekrümmt, mit einem kleinen Zahne; Nasenloch rund, offen, die Nasenfedern treten bis zu demselben vor; Unterkiefer breit und flach, die Dille nur an der Spitze kantig; Kinnwinkel sehr breit, abgerundet, mehr als ein Dritttheil der Schnabellänge, befiedert; Bartborsten über dem Mundwinkel drei und ein Viertheil Linie lang; Zunge sehr kurz, breit, vorn ein wenig gespalten; die Flügel erreichen etwa ein Dritttheil der Schwanzlänge, die dritte Feder scheint die längste; Schwanz abgestuft; die äußeren Federn etwa sechs Linien kürzer als die mittleren; Beine mäßig hoch, Ferse beinahe zweimal so lang als die Mittelzehe, mit sieben bis acht glat-

ten Tafeln belegt, ihre Sohle chagrinartig gekörnt.

Färbung: Oberkiefer schwärzlich, der untere bleifarben; Iris dunkel-graubraun; Beine bleifarben; der dicke Kopf an den Seiten, so wie alle oberen Theile hell graulich-olivengrün, zuweilen mehr grünlich, zuweilen mehr graulich; Scapularfedern gelblich-olivengrün, eben so, doch mehr olivengrün, sind Stirn und Scheitel; Schultern oder Deckfedern der Flügel schwärzlich-braun, mit schönen breiten röthlich-gelben Rändern, die den Vogel sehr kenntlich machen; Schwungfedern eben so, allein auch an ihrer inneren Hinterfahne mit gelbem Saume; Schwanz sehr nett gezeichnet; mittlere Federn schmutzig bräunlich-olivengrün, gegen das Ende schwärzlich und mit rostgelber Spitze; übrige Federn schwarzbraun mit breiter, rostgelber Spitze, und diese rostgelbe Zeichnung nimmt nach der äußeren Seite des Schwanzes immer an Breite zu; äußere Fahne der Schwanzfedern an der Wurzel etwas olivengrün; alle unteren Theile sind ohne Ausnahme blaß olivengelblich, an Bauch, After und Steiß am reinsten; Seiten des Körpers olivengrün überlaufen.

Weibchen: In der Hauptsache dem Männ-

chen durchaus ähnlich, allein alle seine Farben matt, weniger nett, lebhaft und regelmässig, besonders sind die Flügelränder schmutzig rothbraun und nicht von der schönen hell rostgelben Farbe; die Stirn dagegen ist bei dem Weibchen mehr röthlich-braun, bei dem Männchen aber mehr olivenbraun.

Ausmessung des weiblichen Vogels: Länge 5" 6''' — Breite 8" 2''' — L. d. Schnabels 5''' — Br. d. Schn. 4''' — Höhe d. Schn. 2''' — L. d. Flügels 2" 5''' — L. d. Schwanzes etwa 2" — Höhe d. Ferse 7 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Mittelzehe 4''' — L. d. äusseren Z. 3 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. inneren Z. 2 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Hinterzehe 3 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelnagels 2''' — L. d. Hinternagels 2 $\frac{1}{4}$ ''' —

Dieser schöne Vogel lebt in allen großen von mir besuchten brasilianischen Waldungen einsam und still, indem er den Insecten nachstellt. Ich habe weder eine Stimme von ihm gehört, noch seinen Nestbau kennen gelernt.

7, *M. aurantia*.

Der grauscheitliche Fliegenschnapper.
Fl. Oberkörper röthlich-braun, Flügel und Schwanz rothbraun; Untertheile gelbröthlich; Seiten des

Kopfs und des Nackens aschgrau; Scheitelfedern aschgrau mit röthlich-braunen Spitzen.

Muscicapa aurantia, Linn., Gm., Lath.

Gobe-mouche roux à poitrine orangée de Cayenne,

Buffon pl. enl. No. 831. Fig. 1.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Kopf dick, Schnabel stark, am Kiefferrande an der Seite ein wenig bogig austretend, etwa um ein Dritttheil breiter als hoch, die Firste nach der etwas hakenförmigen Kuppe sanft hinab gewölbt, hinter welcher eine sehr sanfte Ausrandung sich befindet; Nasenloch nahe über dem Kiefferrande, rundlich, die Nasenfedern treten bis zu demselben vor; Dille sehr abgeflacht, dennoch der Unterkiefer etwas abgerundet, nach seiner Kuppe nur sehr wenig aufsteigend, aber mit einem kleinen Ausschnitte seines Randes vor derselben; Kinnwinkel etwa ein Dritttheil der Schnabellänge, breit, abgerundet, befiedert; Bartborsten am Mundwinkel mälsig lang; Zunge kurz, vorn an der Spitze ein wenig gespalten; Flügel mälsig lang, erreichen etwas mehr als ein Dritttheil des Schwanzes, zugespitzt, die dritte Feder ist die längste; Schwanz ein wenig abgestuft, mälsig lang und stark; Ferse ziemlich hoch, nicht völlig zweimal so lang als die Mittelzehe, mit etwa sechs glatten Tafeln belegt; Hinternagel ein wenig aufgerichtet; Ge-

fieder zart und weich, die Scheitelfedern ein wenig verlängert, sie können im Affecte zu einer Haube aufgerichtet werden.

Färbung: Oberkiefer bräunlich - hornschwarz, der untere bleifarben, mit weißlichen Rändern; Iris dunkel graubraun; Beine schwärzlich-grau; Federn des Scheitels bis zum Hinterkopfe aschgraubraun, mit röthlich-braunen Spitzen, eben so die Stirn; Zügel, Nacken, Augen- und Ohrgegend aschgrau; übrige Obertheile röthlich-braun; Flügel und Schwanz lebhaft rothbraun; Schwungfedern dunkel graubraun, mit rothbraunem Vorder- und Hinter- saume; Untertheile von einer angenehm röthlich-gelben Farbe, an Unterhals und Brust lebhafter, an Kehle, Brust, After und Steiß blässer.

Ausmessung: Länge 5" 6" — Breite 8" 11" — L. d. Schnabels $4\frac{1}{2}$ " — Br. d. Schn. 3" — Höhe d. Schn. 2" — L. d. Flügels 2" $7\frac{1}{4}$ " — L. d. Schwanzes 2" 2" — Höhe d. Ferse $7\frac{1}{3}$ " — L. d. Mittelzehe 4" — L. d. äußereren Z. $2\frac{1}{4}$ " — L. d. inneren Z. $2\frac{2}{3}$ " — L. d. Hinterzehe $2\frac{1}{2}$ " — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{3}$ ". —

Weibchen: Scheitel mehr aschgrau durchblickend und weniger braun; Ober- und Unter-

leib blässer, mehr unansehnlich oder verloschen gefärbt.

Der niedliche Fliegenschnäpper dieser Beschreibung lebt in den grossen inneren Waldungen des östlichen Brasilien's, und gehört, für die von mir bereiste Gegend, nicht zu den gemeinsten Arten. —

Er ist ohne Zweifel *Buffon's Gobe-mouche roux à poitrine orangée de Cayenne*, und allerdings ist *Buffon's* Figur sehr schlecht, Kehle und Bauch viel zu weiss, auch die Gestalt verfehlt.

D. Fliegenschnäpper mit dickem Schnabel und gleichem Schwanz.

Schnabel kurz, dick, ziemlich breit. Schwanz nicht abgestuft.

8. *M. nigriceps*.

Der gelbbrüstige Fliegenschnäpper.

Fl. Oberleib olivengrün: Hinter- und Seitenhals aschgrün: Kehle weiss: Brust gelb; Bauch röthlich-weiss; Männchen mit schwarzem Scheitel und grüngrünen Flügeldeckfedern. Weibchen mit grünem Scheitel und rothbraunen Deckfedern.

Musc. nigriceps, Lichtenstein's Verz. d. Doubl. p. 96.
Paris Carniv. Sorex. Zool. illustr. Vol. I. Tab. 33.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt kurz und gedrungen, Kopf dick, Schwanz

kurz; Schnabel dick, ziemlich kurz, stark, nicht ganz noch einmal so breit als hoch; Kieferränder beinahe geradlinig und wenig austretend; Kuppe ein wenig herab gebogen, mit kleinem Ausschnitte dahinter; Firste rundlich erhaben; Nasenloch rundlich, halb unter den Nasenfedern verborgen; Unterkieferlag der Dille flach abgerundet, beinahe gerade, hinter der Kuppe am Tomienrande mit sehr kleinem Ausschnitte; Bartborsten am Mundwinkel sehr kurz; Nase und Kinn ohne Borsten; Zunge hornartig, zugespitzt, ein wenig getheilt; Flügel mäßig lang, erreichen die Mitte des Schwanzes, die dritte Feder scheint die längste; Schwanz kurz, in der Mitte nur wenig ausgerandet; Beine mäßig lang, Perse um etwas mehr als ein Drittheil länger als die Mittelzehe, mit fünf etwas aufgeworfenen Tarsen belegt; Hinternagel ein wenig aufgerichtet.

Färbung: Schnabel dunkel bleifarben, am Oberkiefer oft schwärzlich; Fäul im Alter wahr scheinlich bleifarben; Nasenfedern, Stirnrand bis zum Auge, Kinn und Kehle weiß; Brust und innere Flügeldeckfedern citrongelb; Bauch, Schenkel und Steiß angenehm sanft röthlich-weiß; Seiten des Kopfs, Ober- und Seitenhals schön rein aschgrau; Schenkel bis zum Hinter-

kopfe dunkel stahlblau glänzend schwarz; übrige Obertheile zeisig grün; Flügelrand gelb; Schwungfedern schwärzlich; mit grünem Vorder- und weißlichem Hinterrande; Schwanz graubraun mit grünen Rändern.

Ausmessung nach ausgestopften Exemplaren: Länge ungefähr $5'' 6'''$ — L. d. Schnabels $5\frac{1}{3}'''$ — Breite d. Schn. $8\frac{1}{2}'''$ — Höhe d. Schn. $2\frac{1}{4}'''$ — L. d. Flügels $2'' 6'''$ — L. d. Schwanzes nicht völlig $2''$ — Höhe d. Ferse $6\frac{2}{3}'''$ — L. d. Mittelzehe $4\frac{1}{2}'''$ — L. d. äußeren Z. $3\frac{1}{3}'''$ — L. d. inneren Z. $3'''$ — L. d. Hinterzehe $2\frac{5}{8}'''$ — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{4}'''$ — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{4}'''$.

Weibchen: Völlig gebildet und gefärbt wie das Männchen, nur ist der Scheitel grün wie der Rücken, die vordern und mittleren kleinen Flügeldeckfedern lebhaft rothbraun; Stirn- und Nasenfedern sind nicht weiß, sondern grün wie der Oberkopf, und der Zügel aschgrau; innere Flügeldeckfedern und Flügelrand schön gelb.

Junge Vögel: Aus den im Uebergange des Gefieders begriffenen Vögeln ersieht man, daß sie im ersten Jahre an allen Obertheilen aschgrau, und nicht grün gefärbt sind.

Dieser Vogel ist mir nicht selbst vorgekommen, ich erhielt Männchen und Weibchen

aus der Gegend von *Camamu* und *Bahia*. Er soll mit den übrigen verwandten Vögeln einerlei Lebensart haben.

Lichtenstein beschreibt in seinem Verzeichnisse der Doubletten des Berliner Museums ein Paar dieser Vögel in der Kürze, und *Swainson* bildet den männlichen Vogel ziemlich gut ab.

9. *M. citrina*.

Der kleine gelbschüttliche Fliegenschnäpper.

Fl. Scheitelfedern an der Wurzel gelb, an der Spitze schwärzlich-braun; Obertheile dunkel graubraun, Flügel mit helleren Rändern; Kehle fahl bräunlich-grau; Unterhals und Brust grau-bräunlich und olivengelblich gestrichelt; übrige Untertheile blafs gelblich.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Schnabel stark, sanft gewölbt, mit mäßigem Häkchen am oberen, und einem kleinen Ausschnitte an jedem Kiefer; Oberkiefer an der Seite seiner Wurzel bogig austretend, breiter als die Stirn, mehr als doppelt so breit als hoch, also sehr breit, ziemlich platt, die Firste wenig erhaben, Haken zusammengedrückt; die große weite Nasenhaut saft vertieft, das längliche Nasenloch steht am unteren Theile, ein wenig von

borstigen Nasenfedern bedeckt; Kinawinkel sehr groß, er nimmt zwei Dritttheile der Schnabellänge ein, ist breit, abgerundet, mit buschigen, borstig endenden, etwas vorwärts strebenden Federn besetzt; Dille abgeflacht, sanft aufsteigend, nur vor der Spitze ein wenig kantig; Flügel stark und lang, ziemlich zugespitzt, sie erreichen drei Viertheile des Schwanzes, die dritte Feder ist die längste, die zweite nur unbedeutend kürzer; Schwanz ziemlich kurz, in der Ruhe schmal; Beine kurz, Ferse mit fünf bis sechs Tafeln belegt, um ein Viertel (ihrer Länge) länger als die Mittelzehe; Hinternagel größer als der mittlere.

Färbung: Iris graubraun; Schnabel und Beine bräunlich-schwarz; Stirn weißgrau gemischt; alle Obertheile dunkelgraubraun, auf dem Scheitel in's Schwarzbraune fallend, allein die Federn sind an der Wurzel citrongelb; über dem Auge zieht ein undeutlicher weißlicher Streifen nach dem Hinterkopfe; Schwanz und Flügel wie der Rücken, die Federn der letzteren blass, etwa weißgraulich gerandet; Schwungfedern am hintern Rande der inneren Fahne fahl gelbröthlich; Kehle schmutzig weißgrau, eben so die Mitte des Unterhalses; Brust graugelblich, graubraun überlaufen und gefleckt;

Seiten graubräunlich überlaufen; unterer Theil der Brust weißlich, mit graubraunen länglichen Flecken; Bauch blafs gelb, eben so Schenkel und Steifs, aber graulich überlaufen und graubraun gefleckt.

Ausmessung: Länge etwas über 6" 2''' — Breite 10" 2''' — L. d. Schnabels $3\frac{4}{5}$ ''' — Br. d. Schn. 4''' — Höhe d. Schn. $1\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Flügels 3" $1\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Schwanzes beinahe 2" — Höhe d. Ferse $6\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Mittelzehe $4\frac{1}{3}$ ''' — L. d. äusseren Z. $3\frac{1}{4}$ ''' — L. d. inneren Z. $2\frac{5}{8}$ ''' — L. d. Hinterzehe 3''' — L. d. Mittelnagels 2''' — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{2}$ ''' —

Weibchen: Von dem Männchen wenig verschieden, die Brust und Kehle sind mehr weisslich oder gelblich gefleckt, indem die Seitenränder der Federn von dieser Farbe sind; Bauch weniger gelb oder mehr weisslich als am Männchen; Steifs gelblich mit dunkeln Flecken, auch die gelbe Farbe auf dem Kopfe ist blässer; Rücken etwas blässer und ein wenig olivengrünlich überlaufen; Kehle des Weibchens dunkler gefleckt.

Dieser Fliegenschnäpper hat so viel Aehnlichkeit mit der nachfolgenden Art (*Musc. ruficauda*), dass man ihn für einen jungen Vogel

derselben halten könnte, er giebt wieder ein Beispiel von der häufigen Wiederholung der Thierformen in Brasilien. Bei genauer Ansicht findet man, daß *M. citrina* mit breiterem, mehr buchtig austretendem Schnabel versehen, daß sie kleiner ist, nichts von der rostrothen Farbe am Schwanze zeigt, anderer kleiner Unterschiede nicht zu gedenken. Beide leben in ein und derselben Gegend, das in meiner Sammlung aufgestellte Paar stammt aus der Gegend von *Nazareth das Farinhas* am Flusse *Jagoaripa*.

10. *M. ruficauda*.

Der kleine Fliegenschnäpper mit gelbem Scheitel und rostrothen Schwanzrändern.

*Fl. Scheitel in der Mitte gelb mit braunen Feder-
spitzen, an der Seite schwarzbraun; Obertheile
graubraun, an den Flügeln überall weißlich ge-
säumt; Schwanz und dessen obere Deckfedern stark
rothbraun eingefasst; Untertheile weißlich-gelb,
Brust und Unterhals graulich, dabei graubraun
gefleckt.*

*Beschreibung des männlichen Vogels: Größe einer Lerche; Schnabel kurz, stark, andert-
halbmal so breit als hoch, gerade, mit star-
kem, feinem Haken und höchst kleinem Aus-*

schnitte vor der Spitze eines jeden Kiefers; Fir-
ste nicht sehr erhaben, aber etwas kantig; Na-
senloch rundlich in der etwas vertieften Nasen-
haut, mit Borstfedern etwas bedeckt; Seiten-
linie des Schnabels gerade, vor der Spitze ein
wenig zusammengedrückt; Kinnwinkel ein Dritt-
theil der Schnabellänge haltend, breit, mälsig
abgerundet, vorn sparsam mit borstig enden-
den Federn bedeckt; Dille rundlich abgeflächt,
nach der Spitze aufsteigend und wenig kantig;
Federn des Scheitels dicht und etwas lang, wer-
den im Affecte gesträubt; Flügel stark, zuge-
spitzt, reichen über die Mitte des Schwanzes
hinaus, die dritte Feder die längste, sie sind
stark zugespitzt; Schwanz mälsig stark, in der
Mitte nur wenig ausgerandet; Beine kurz, Fer-
se beinahe um ein Viertel länger als die Mit-
telzehe, mit fünf Tafeln belegt; Mittelnagel
größer als der Hinternagel.

Färbung: Iris graubraun; Schnabel und
Beine schwärzlich-braun; Federn auf der Mitte
des Scheitels citrongelb, mit schwarzbraunen
Spitzen, weshalb erstere Farbe verdeckt wer-
den kann. Seitenfedern des Scheitels schwarz-
braun, eben so Zügel und Ohrgegend; von der
Nase über dem Auge hin ein weißlicher Strei-
fen, der sich an der Seite des Hinterkopfs aus-

breitet und endet; vom Unterkiefer zieht ein weißlicher Streifen unter dem Ohre hin; Obertheile dunkel graubraun, an den Rändern der Federn zum Theil heller; eben so alle Flügel Federn, sie haben sämmtlich weißliche Ränder; vordere Schwungfedern mit röthlich-weißem feinem Vordersaume; hintere Schwungfedern mit sehr starken gelblich-weißen Rändern; innere Flügeldeckfedern sehr blaß limonengelb; Schwanz und dessen obere Deckfedern dunkel graubraun mit rostrothen Rändern; Kehle, Kinn und Unterhals bräunlich-grau, eben so die Brust, diese ist aber mehr graubraun dunkler gestrichelt, so wie die Seiten des Leibes; Mitte des Bauchs, After und Schenkel fahl weißlich-gelb; Steiß verloschen graulich-braun gefleckt.

Ausmessung: Länge 6" 10''' — Breite 11" 4''' — L. d. Schnabels 5''' — Br. d. Schn. 3½''' — Höhe d. Schn. 2''' — L. d. Flügels 3" 6½''' — L. d. Schwanzes 2¾''' — Höhe d. Ferse beinahe 6''' — L. d. Mittelzehe 4¾''' — L. d. äußeren Z. 3''' — L. d. inneren Z. 2½''' — L. d. Hinterzehe 2½''' — L. d. Mittelnagels 2½''' — L. d. Hinternagels 2'''.

Weibchen: Die gelben Scheitelfedern sind blässer, die rothbraunen Einfassungen am

Schwänze sind stärker, der blafs gelbe Bauch ist weniger rein, mehr graulich überlaufen und graubraun gefleckt.

Dieser Fliegenschnäpper hat in der Vertheilung seiner Farben auf den ersten Anblick viel Aehnlichkeit mit *Muscicapa audax*, Linn., allein er ist am Oberkörper weniger gefleckt, hat ganz verschiedenen Schnabel und weit geringere Gröfse. Noch mehr Aehnlichkeit hat er mit der vorhergehenden Art, *M. citrina*, so dafs man ihn für identisch mit demselben halten könnte, wenn beide nicht in der Gröfse sehr verschieden wären. Diese Art scheint in der Gegend von *Bahia* und *Camamu* vorzukommen, ich erhielt sie nicht selbst, sondern die Jäger des Herrn *Freireifs* brachten sie in den von mir ebenfalls besuchten schönen Urwäldern am Flusse *Jiquiriçá* ein, wo sie übrigens nicht sehr häufig zu seyn scheint. Männchen und Weibchen befinden sich in meiner zoologischen Sammlung.

11. *M. modesta*.

Der olivengraue Fliegenschnäpper.
Fl. Obertheile olivengrau; Flügel und Schwanz fahl
'graubraun mit blässerem Rändern; Kehle weifs-

grau; Untertheile sehr blafs limonengelblich, Brust grau überlaufen und gelblich gestrichelt.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel stark, ziemlich kurz, vorn ohne Haken, mit höchst kleinem Ausschnütschen; etwas kegelförmig, breiter als hoch, an der Stirn hoch, mit nach der Spitze nur sanft hinab geneigter Firste; Oberkieferrand unter den Nasenlöchern etwas bogig austretend, nachher verschmälert und an der Kuppe ein wenig zusammengedrückt; Kinnwinkel halb Schnabellänge, mälsig zugespitzt, mit borstig endenden Federn bedeckt, Dille sanft aufsteigend; Bartborsten über dem Mundwinkel etwa drei Linien lang; Flügel mälsig lang, erreichen beinahe die Mitte des Schwanzes; Ferse mälsig hoch, mit fünf bis sechs glatten Tafeln belegt, nicht völlig anderthalbmal so lang als die Mittelzehe.

Färbung: Schnabel hornbraun, an der Wurzel des Unterkiefers weisslich; Beine horngraubraun; Obertheile olivengrau; Flügel und Schwanz graubraun, mit blässerem, sehr schmalen, an den Schwungfedern weisslichen Rändern; Schäfte der grossen Flügel- und Schwanzfedern röthlich-braun; innere Flügeldeckfedern blafs weissgelblich; Kehle und Unterhals weissgrau; Zügel olivenfarben; Brust hell aschgrau,

etwas limonengelb gemischt und gestrichelt; Federn des Unterleibes an der Wurzel grau, welches gewöhnlich verborgen bleibt, an der Spitzenhälfte hellweißgelb.

Ausmessung nach dem ausgestopften Vogel: Länge 5" 4'" — L. d. Schnabels 4 $\frac{1}{2}$ " — Br. d. Schn. 2 $\frac{1}{2}$ " — Höhe d. Schn. 1 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Schwanzes 2" 6'" — Höhe d. Ferse 7 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Mittelzehe 4'" — L. d. Hinterzehe 3'" — L. d. Hinternagels 2 $\frac{1}{2}$ ".

Von dieser Species besitze ich nur den männlichen Vogel, der durch *Freireis* aus der Gegend von *Camamu* und *Bahia* gebracht wurde. Er ist ein unansehnlicher Vogel, der aber durch seinen Schnabelbau kenntlich ist.

E. Plattschnäbeliche Fliegenschnäpper.

Schnabel sehr abgeplattet, an den Seiten buchtig austretend.

12. *M. Monacha.*

Der schwarze Fliegenschnäpper mit zwei verlängerten Schwanzfedern.

Fl. Körper schwarz; Scheitel weißgrau; Stirn weiß, eben so der Unterrücken; zwei mittlern Schwanzfedern mehr als doppelt so lang als die übrigen.

- Id. Colon, Azara Ver. Vel. III. pag. 369.*
Muscicapa Monacha, Lichtenst. Verz. d. Doubl. p. 53.
Muscicapa Colonus, Vieill.
Platyrhynchus filicauda, Spiz. Ab. Tem. II. pag. 12.
Tab. 14.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel kurz, ziemlich breit, etwas plattgedrückt, Firste sanft rundlich erhaben, nach der Kuppe sanft hinab gewölbt, mit einem kleinen Zahne versehen; die Oberkieferkuppe tritt ein wenig über die untere herab; Kinnwinkel kurz, breit, abgerundet und befiedert; Dille nur höchst sanft aufsteigend, völlig platt, ohne Kante; Nasenlöcher rundlich-eiförmig, groß, weit, dicht vor den Nasenfedern gelegen; Bartborsten am Mundwinkel zwei und eine halbe Linie lang; Augenlid befiedert; Flügel stark, ziemlich lang und zugespitzt, sie fallen über ein Dritttheil der Schwanzlänge hinaus, die dritte Schwungfeder ist die längste; Schwanz mälsig lang, gleich, seine Federn abgerundet; die mittleren zeichnen sich sehr aus, sie sind schon an ihrer Wurzel schmaler als die übrigen, verlieren aber gegen das Ende der übrigen Schwanzfedern allmähig ihre Fahnen, treten, beinahe als bloßer Schaft, über den Schwanz vor, den sie um drei und einen halben Zoll an Länge übertreffen, allein unmittelbar nach ihrem Austritte nehmen ihre Fah-

nen allmählig an Breite wieder zu, dergestalt, daß sie an ihrer breitesten Stelle, vor dem sanft abgerundeten, spatelförmigen Ende, drei Linien in der Breite messen; Beine ziemlich kurz, Ferse mit fünf bis sechs Tafeln belegt, Zehen kurz und schwach, die äusseren an der Wurzel vereint; Mittel- und Hinternagel bedeutend grösser als die übrigen.

Färbung: Schnabel schwarz; Iris sehr dunkel braun; Beine glänzend schwarz; der ganze Vogel ist kohlschwarz, an den Obertheilen etwas bläulich-stahlglänzend, an Flügeln und Schwanz etwas in's Bräunliche ziehend; der ganze Oberkopf hell aschbläulich, Stirn rein weiss, allein man bemerkt in der grauen Scheitelfarbe häufig einzelne weisse Federn; innere Flügeldeckfedern schwärzlich; Unterrücken gänzlich oder theilweise weiss.

Ausmessung: Länge ohne die beiden mittleren Schwanzfedern 5" 5''' — mit denselben gemessen 8" 11''' — Breite 9" 2''' — L. d. Schn. 3''' — Br. d. Schn. 2 $\frac{1}{2}$ ''' — Höhe d. Schn. 1 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Flügels 3" $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Schwanzes ohne die verlängerten Federn 2" — L. d. Schw. mit denselben 5" 6''' — Die Federn treten oft vor um 3" 6''' — Höhe d. Ferse 5 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelzehe 4''' — L. d. äusseren Z. 3'''

— L. d. inneren Z. $2\frac{1}{2}'''$ — L. d. Hinterzehe $2\frac{1}{2}'''$ — L. d. Mittelnagels $2'''$ — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{4}'''$.

Weibchen: Nicht bedeutend von dem Männchen verschieden, doch scheint der Schnabel dunkler grau und der Unterleib oft etwas in's Bläulichgraue zu fallen; beide Geschlechter behalten die langen Schwanzfedern zu allen Jahreszeiten, wenn sie nicht gerade mausern.

Dieser niedliche Vogel ist in den von mir bereisten Gegenden von Brasilien sehr gemein, und da ihn *Azara* in *Paraguay* traf, so ist er über einen grössern Theil von Südamerika verbreitet. Er kommt nördlich noch bei *Bahia* vor. *Azara* sagt, er sey in *Paraguay* selten, auch habe er ihn nur im Winter daselbst gesehen. Schon bei *Rio de Janeiro* habe ich unsern Vogel beobachtet. Im Monat Januar fand ich ihn in den Waldungen der Provinz *Bahia* stark in der Mauser, so wie die meisten Vögel. Man sieht ihn in der Brütezeit gepaart, später familienweise oder einzeln, das letztere scheint am häufigsten vorzukommen. Gewöhnlich bemerkte ich diese Vögel am Rande des Waldes oder der Pflanzungen und Holzschläge auf einem isolirten Baume oder Aste sitzend, sie flogen zuweilen nach einem Insect in die Höhe,

und fielen auf ihrem Standorte wieder ein. Sie sind durchaus nicht schüchtern, und verjagt man sie, so nehmen sie sogleich, wo möglich, den alten Standort wieder ein. Sie sind höchst stille, melancholische Vögel, sitzen stundenlang unbeweglich, auch habe ich keine laute Stimme von ihnen gehört. Ihre Nahrung besteht in Insecten. Ob ich gleich eine große Anzahl dieser Vögel beobachtet habe, so konnte ich doch nie ein Nest derselben finden.

Die Abbildung, welche Spix von dieser Species giebt, ist nicht zu verkennen, dennoch aber in der Stellung sehr verfehlt, da sie zu sehr niedergedrückt und in die Länge gezogen ist, auch die Stellung der Beine unrichtig zeigt.

18. *M. flaviventris*.

Der gelbgrüne Fliegenschläpper.

Ht. Obertheile olivengrün; Untertheile röthlich-gelb; Flügel und Schwanz schwärzlich-braun, überall mit sehr starken, lebhaft grünlich-gelben Rändern; Zügel und ein Strich über dem Auge röthlich-gelb.

? *Platyrhynchus flaviventris*, Spix Av. T. II, pag. 12.

Tab. 15. Fig. 1.

Beschreibung des männlichen Vogels: Schnabel stark, dick, mälsig lang, noch ein-

mal so breit als hoch, am Seitenrande bogig austretend, die Kuppe etwas zusammengedrückt, wenig herabtretend, dahinter ein kleiner Ausschnitt; Firste mälsig erhaben; Nasenloch rundlich, am vorderen Ende der bedeckten Nasenhaut; Kinnwinkel breit, groß, bedeckt, mehr als die Hälfte der Schnabellänge einnehmend; Dille an den Kinnwinkel spitze stark vortretend, und nach ihrer am Kieferrande nur sehr seicht ausgeschnittenen Spitze stark aufsteigend, sie ist am Kinnwinkel abgeflacht, nach der Spitze hin etwas kantig; die Nasen- und Kinnwinkelfedern endigen in Borsten, die des ersteren streben über den Unterkiefer beinahe bis zu dessen Spitze vor; Zunge kurz, etwas herzförmig, an der Spitze ein wenig getheilt; Flügel ziemlich lang, erreichen nicht völlig die Mitte des Schwanzes, die dritte Schwungfeder ist die längste; Schwanz gleich, mälsig stark; Beine mälsig hoch, Ferse etwas mehr als anderthalbmal so lang als die Mittelzehe, mit fünf bis sechs glatten Tafeln belegt; Mittel- und Hinternagel groß.

Färbung: Iris graubraun; Schnabel am Oberkiefer schwärzlich-hörnbraun, Unterkiefer röthlich-weiß; Rachen schwärzlich; Zunge weißlich; Beine schmutzig bleifarben; alle

Obertheile des Vogels olivengrün; auf dem Scheitel mit einem rüthlich-gelben Aufzuge; Stirn und Federn von der Nase bis über das Auge, sowie das Augenlid selbst rüthlich-gelb; in's Orangenfarbene ziehend; Kehle, Seiten des Kinn, Mitte des Unterhalses, der Brust und des Bauches rüthlich-gelb; an den Seiten dieser Theile olivengrün überlaufen; Flügeldecken schwärzlich-braun, sämtlich mit lebhaft-grün gelben; hier und da sogar orangefarbenen Rändern, welches eine sehr nette Zeichnung giebt; Flügelrand hoch orangengelb oder schön rüthlich-gelb; innere Flügeldeckfedern hellgelb; Schwanz schwärzlich-braun mit gelbgrünen äußeren Rändern.

Ausmessung: Länge 4" 11" — Breite 7" 2" — L. d. Schnabels 4" — Br. d. Schn. 3½" — Höhe d. Schn. 1½" — L. d. Flügels 2" 3" — L. d. Schwanzes 1" 9" — Höhe d. Ferse 6" — L. d. Mittelzehe 3½" — L. d. äußeren Z. 2½" — L. d. inneren Z. 2½" — L. d. Hinterzehe 3" — L. d. Mittelnagels 1½" — L. d. Hinternagels 2½".

Waboken: Von dem Männchen wenig verschieden; allein alle Farben blässer und weniger lebhaft; der rothgelbe Nasenstreif ist vorhanden; alle gelben Theile sind aber blässer

und weniger rötlich; die Einfassungen der Deck- und Schwungfedern sind nicht orangegelb, sondern citrongelb.

Diesen Vogel erhielt ich ein paarmal in der Gegend der Flüsse *Mucuri* und *Alcobaça*, wo er in den großen Waldungen lebt, und die Lebensart und Manieren der übrigen Fliegenfänger zeigt. — Dr. v. Spix giebt *Tab. 15* seines zweiten Bandes, *Fig. 1*. eine Abbildung unsers Vogels, die aber in Gestalt und Stellung verfehlt ist. —

14. *M. platyrynchos*

Der olivengraue Fliegenschnäpper mit weißlicher Augeneinfassung.

Fl. Schnabel mäfsig breit; Obertheile olivengrau, Flügel und Schwanz graubraun; die ersteren mit weißlichen Rändern; Kehle, Unterhals und Brust blafs weißgrau; Bauch blafs gelblich-weiß; Steiß und die das Auge einfassenden Federn weißlich.

Beschreibung: Schnabel über noch einmal so breit als hoch, an dem Seitenrande gleichartig bis gegen die Spitze bogig austretend; Firste sehr wenig erhaben; Nasenloch rundlich, an der Spitze der Nasenhaut, welche mit Borstenfedern bedeckt ist; Kinnwinkel mit

lang und breit, mäßig zugespitzt, mit büschlig entsetzten Federn bedeckt; Unterkiefer abgeflacht; Bartborsten am Mundwinkel fein, zum Theil drei Linien lang; Flügel etwa die Mitte des Schwanzes erreichend, zugespitzt, die zweite Feder die längste, die dritte nur sehr wenig kürzer; Schwanz ziemlich lang, gleich; Beträgmäßig hoch, etwas mehr als anderthalbmal wie die Mittelzehe, mit sechs ziemlich glatten Tafeln belegt.

Färbung: Schnabel röthlich-braun, Unterkiefer röthlich-weiß; Beine fleischbräunlich; Obertheile olivengrau, am Kopfe mehr dunkelgrau; am Unterrücken mehr grünlich; Flügel und Schwanz dunkelgraubraun, große Flügeldeckfedern mit schmutzig weißen starken Spitzen; mittlere und hintere Schwungfedern mit starken weißgrünlichen Rändern; Flügelrand sehr blafs gelblich; Schwanzfedern grünlich gerandet; die das Auge einfassenden Federn sind weißlich; Kinn, Kehle, Unterhals und Brust hell weißgrau, die letztere hier und da ein wenig gelblich überlaufen; Bauch blafs gelblich; Schenkel olivengrau; After und Steiß weißlich.

Ausmessung: Länge etwa 5 1/2 — 6 — L. d. Schnabels (bis zur Spitze ein wenig abgebrochen war) 3 1/2 — 4 — Breite d. Schnabels 1 1/2 — 2 —

Schwanz 24 1/2" — L. d. Schwanzes etwas über 2"
 — Höhe der Ferse 5 1/2" — L. d. Mittelsche 3 1/2"
 — L. d. äußeren Z. 2 1/2" — L. d. hinteren Z.
 2 1/2" — L. d. Mittelhügels 1 1/2" — L. d. Hinter-
 nagels 2 1/2". — Dieser Vogel ist mir nur einmal in die
 lichen Brasilien, ich glaube in der Gegend von
 Rio, vorgetrieben, und ich kann das Ge-
 schlecht, das hier beschriebenen Exemplar nicht
 angeben.

15. *M. h a r h a t a*.
 Der Fliegenschnäpper mit langen Bartborsten;
 Fl. Schnäbel breit und platt mit sehr langen Bart-
 borsten; Scheitelfedern gelb mit olivengrauen Sp-
 tzen; Obertheile graulich-olivengrün; Flügel und
 Schwanz dunkel graubraun; Bauch und Unterrücken
 limonengelb; Brust und Unterhals röthlich-gelb.

Le Barbichon de Cayenne, Buff. pl. enl. No. 830.
 Fig. 1.

Muscicapa barbata, Linn., Gmel., Lath.
 Buff., Senn. Vol. 14. p. 88.

Meine Reise nach Bras. B. II. p. 151.
 ? *Platyrhynchus xanthopygius*, Spiz.

Platyrhynchus Barbichon, Vieillot.
 Swainson Zool. illustr. Vol. II. pl. 116.

Beschreibung des männlichen Vogels:
 Schnäbel noch etwas so breit als hoch, mit

etwas erhabener Firste, die an der Spitze mit einem feinen Haken um eine halbe Linie über den Unterkiefer herab tritt, hinter der Kuppe zusammengedrückt und mit einem kleinen Ausschnitte oder Zähnchen; Seitenrand des Schnabels in einem Bogen austretend, hinter der Spitze etwas zusammengedrückt; Dille sehr flach gedrückt, nach der Spitze nur sehr wenig aufsteigend; Nasenlöcher von den vortretenden Stirnfedern bedeckt; Kinnwinkel beinahe bis zur halben Schnabellänge vortretend, mäßig zugespitzt, befiedert, die Federn in Borsten endend und vorwärts strebend; Mundwinkel und Nase sehr stark mit dicken, langen Bartborsten besetzt, deren Spitzen bis zur Schnabelspitze vortreten, die also zum Theil fünf Linien lang sind; die Flügel erreichen beinahe die Mitte des Schwanzes, die erste Feder ist kurz, die vierte die längste; Schwanz ziemlich stark, die äußern Federn nur sehr wenig kürzer als die mittlern; in der Ruhe scheint der Schwanz in der Mitte nur sehr wenig ausgerandet; Ferse nicht völlig zweimal so lang als die Mittelzehe, mit fünf bis sechs glatten Tafeln belegt; Hinter- und Mittelfuß ziemlich gleich groß.

Färbung: Iris braun; Ober- und Unterflügel schwarz;

braun; Unterschnabel weißlich mit schwarzer Spitze; Beine bräunlich, bleifarben; Obertheile dunkelgraulich-olivengrün, Unterrücken und obere Schwanzdeckfedern limonengelb; Federn des Scheitels lebhaft gelb, mit olivengrauen Spitzen, die Seitenfedern des Scheitels gänzlich wie jene Spitzen, der Vogel kann die gelbe Scheitelfarbe verdecken; Flügel dunkel graubraun mit röthlich-olivengrauen Rändern, wodurch ein solcher Anstrich entsteht; Schwungfedern am hintern Rande breit röthlich-weiß gesäumt; Schwanz schwärzlich-braun; innere Flügeldeckfedern blaß limonengelb; Kehle fahl grangelb; Unterhals und Oberbrust bräunlich gelbroth; Unterbrust, Bauch und Steiß limonengelb, in den Seiten hell graubräunlich überlaufen.

Ausmessung: Länge 5" — Breite 6" $11\frac{1}{2}$ " — L. d. Schnabels 4" — Br. d. Schn. 3" — Höhe d. Schn. $1\frac{1}{4}$ " — L. d. Flügels 2" 5" — L. d. Schwanzes etwas über 2" — Höhe der Ferse 6" — L. d. Mittelzehe $3\frac{1}{2}$ " — L. d. äußeren Z. $2\frac{1}{2}$ " — L. d. inneren Z. $2\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinterzehe $2\frac{1}{2}$ " — L. d. Mittelnagels $1\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinternagels $1\frac{1}{2}$ ".

Weibchen: Von dem Männchen in der Hauptfarbe wenig verschieden, die Brust scheint

weniger lebhaft und mehr schmutzig gelbroth, aber die schön gelben Federn des Scheitels fehlen gänzlich, sind gänzlich olivengrau, welches ein sehr gutes und vollkommen hinlängliches Kennzeichen ist, um beide Geschlechter zu unterscheiden.

Junge Vögel sind an der Brust nur röthlich-graugelb, ihr Unterleib ist sehr beschmutzt, und alle Farben matt und unansehnlich.

Dieser Vogel ist ein ächter Fliegenfänger, mit einer stillen, einförmigen Lebensart, den den ganzen Tag manchmal unbeweglich sitzt, und mit eingezogenem Halse auf Insecten lauert. Er hat einen kurzen schmatzenden Lockton, Tschack! Tschack! Tschack! und lebt bloß in dichten Waldungen. Dort fand ich oft sein künstliches originelles Nest, von dessen abweichendem Baue schon mehrere Schriftsteller oberflächlich geredet haben. Man findet dasselbe an kleinen, freien Stellen im Walde an einer Stängelpflanze künstlich aufgehängt, und wir halten es anfänglich für einen bloßen Ballen von Moos oder Geniste. Ich stieß, während ich durch den Wald ritt, mit meinem Hute an einen solchen schwebenden Ballen, und ein kleiner Vogel flog mir beinahe in's Gesicht; ich gab nun auf diese Nester Acht, und habe nur

immer den oben beschriebenen Fliegenfänger in der Nähe unbeweglich auf einem Aste sitzen gesehen, weshalb ich dasselbe für das seinige halten muß. Die jungen in diesen Nestern im Monat Januar gefundenen Vögel hatten breite Schnäbel, wie die alten, was mich noch mehr in diesem Glauben bestärkte. Mitten in einem alten Pfade oder an einer etwas lichten Stelle im finstern Urwalde bemerkt man also, wie gesagt, an einem von einem hohen Baume herabhängenden Schlinggewächse sein künstliches Gebäude aufgehängt, welches frei in der Luft schwebt, und das Spiel des Windes ist. Die Natur legte indessen in diesen kleinen Vogel den merkwürdigen Instinct, dieses Nest nie unter einer gewissen Höhe der Erde zu nähern, damit ihm von dort aus nichts zustossen könne; denn es hängt immer sieben bis acht Fuß hoch vom Boden entfernt. Anfänglich hält man dasselbe für einen Bündel von schwarzen *Grassäthen* (*Brodiaea*-) Fäden und kleinen Holzwurzeln, untersucht man es aber genau, so findet man eine längliche, nach oben zugespitzte Pyramide, welche unten rundum geschlossen ist, und nur an der einen Seite, umfern ihrer Grundfläche, eine kleine Oeffnung hat, die zu dem Inneren des Nestes führt. Diesen Eingang schützt der

Vogel durch einen darüber angebrachten, von oben schief herabhängenden Schirm, der aus der ineinander gefilzten Masse herabtritt. In diesem Neste selbst fand ich zwei weißliche ungefleckte Eier, von welchen oft nur eins ausgebrütet wird. Ende Januar's beobachtete ich Eier und Junge in diesen Nestern. Will man den Vogel kennen lernen und in seinem Neste überraschen, so muß man sehr vorsichtig seyn; denn er hält sich höchst stille, und fliegt bei dem leisesten Geräusche ab. Die Wilden, welche diese großen, endlosen Wälder bewohnen, nehmen da, wo sie schon Angelhaken von den Europäern erhielten, die jungen Vögel aus diesen und ähnlichen Nestern, um sie als Köder zu gebrauchen.

Buffon's Abbildung *Tab. 830. Figur 1.* scheint mir hierher zu gehören, ist aber alsdann schlecht, die des Weibchens (*Figur 2.*) scheint einer ganz andern Species anzugehören; dagegen bildet *Swainson* diese Vögel etwas besser ab, obgleich ihr Character ebenfalls nicht gehörig ausgedrückt ist. Der *Barbichon* von *Cayenne* wird von *Buffon* und *Sonnini* in der Hauptsache dem von mir beobachteten Vogel ähnlich beschrieben, sie nennen aber die Scheitelfedern orangefarben, da sie an meinem Vo-

gel nur gelb sind; auch beschreibt *Sonnini* das Nest nicht genau, wie ich dasselbe fand; denn er nennt es bloß einen Ballen von Moos, und sagt auch nicht, daß es an dem schlanken Faden einer Schlingpflanze aufgehängt sey. *Spiz* *Platyrynchos xanthopygius* scheint identisch mit dem von mir beschriebenen Vogel.

16. *M. chrysoceps.*

Der rothbraune Fliegenschnäpper mit gelbem Scheitel.
Fl. Oberkörper röthlich-braun, Flügel und Schwanz dunkel graubrau, mit zwei röthlichen Queerbinden auf den Flügeldeckfedern; Scheitelfedern an der Wurzel gelb; Untertheile weißlich-gelb; Brut graubraun, gelblich-weiß gestrichelt.

Platyrynchos chrysoceps, *Spiz* *Av. T. II. pag. 10.*

Tab. 11. Fig. 2.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Schnabel etwas verlängert, beinahe noch einmal so breit als hoch, ziemlich platt, flech, Firste nur mäßig erhaben, Seitenränder ein wenig bogig austretend, die Oberkuppe als ein spitziges Häkchen hinab gebogen, mit einem kleinen Zähnchen dahinter; Nasenloch rund, sein oberer Rand ein wenig erhöht, in der Mitte der etwas vertieften, die bedeutend große

Nasengruben überspannenden Haut, die Nasenfedern treten etwas borstig vorstrebend bis zu der Öffnung vor; Dille des Unterkiefer abgeflacht, nur vor ihrem Ende an der Spitze etwas kantig, Tomienrand des Unterkiefers vor seiner Spitze mit einem kleinen Ausschnitte; Kinnwinkel mehr als ein Dritttheil der Schnabellänge, abgerundet, breit, mit borstig endenden Federn bedeckt; Mundwinkel mit zum Theil vier und ein halb Linien langen Bartborsten besetzt; Augenlid etwas befiedert; Kopf etwas dick; Körper schlank; Flügel mälsig lang, erreichen nicht völlig die Mitte des Schwanzes, ihre dritte Feder die längste; Schwanz mälsig stark, scheint in der Mitte ein wenig ausgerandet, war an dem beschriebenen Exemplare etwas in der Mauser; Beine mälsig hoch, ziemlich schlank; Ferse anderthalbmal so lang als die Mittelzehe, mit fünf bis sechs grossen glatten Tafeln belegt.

Färbung: Oberkiefer schwärzlich-hornbraun, Unterkiefer röthlich-grau; Iris dunkel gelblich-braun; Beine glänzend schwarz; alle Obertheile röthlich-braun, auf dem Rücken etwas graulich-kastanienbraun, auf Kopf und Unterrücken mehr röthlich überlaufen; grosse Flügeldeck- und Schwungfedern schwärzlich-braun, mit breiten röthlich-braunen Spitzen, wodurch

auf den Deckfedern zwei breite, röthlich-braune Queerstreifen entstehen; die Ränder der Schwungfedern sind von derselben Farbe; Schwanzfedern dunkel graubraun; die röthlich-braunen Scheitelfedern sind an der Wurzel, besonders an der Stirn, hoch gummitgelb, geschlossen aber bemerkt man nichts von dieser Farbe; Gegend um das Auge blafs röthlich-braun; Backen, Seiten des Halses und Brust graubraun, die letztere gelblich gestrichelt; Kehle bräunlich-weiß; Unter- und Oberbrust auf graugelblichem Grunde verloschen graubraun längs gestrichelt; Unterbrust und Bauch sehr blafs limonengelb, in den Seiten verloschen blafs graubräunlich gestrichelt; Mitte des Bauchs und Steifs ungefleckt weißlich-limonengelb; innere Flügeldeckfedern blafs gelbröthlich, am Flügelrande etwas lebhafter gefärbt.

Ausmessung: Länge 4" 9''' — Breite 6" 2''' — L. d. Schnabels 4''' — Br. d. Schn. 3''' — Höhe d. Schn. 1½''' — L. d. Flügels 2" 1''' — L. d. Schwanzes 1" 6''' — Höhe d. Ferse 6½''' — L. d. Mittelzehe 3''' — L. d. äußeren Z. 2½''' — L. d. inneren Z. 2⅓''' — L. d. hinteren Z. 2½''' — L. d. Mittelnagels 1½''' — L. d. Hinternagels 2''' —

Weibchen: Das in meiner zoologischen

Sammlung befindliche Weibchen unterscheidet sich von dem Männchen auf den ersten Anblick durch die Farbe seiner gelben Scheitelfedern; denn diese sind nicht gumpiguttgelb, sondern orangengelb, man bemerkt aber weniger Gelb, indem diese Federn zum Theil nur an der Wurzel ein wenig, zum Theil nur an einer Fahne von dieser Farbe sind.

Der hier beschriebene Vogel hat die Lebensart und Manieren eines wahren Fliegenfängers; denn er sitzt still und einsam meistens auf einem isolirten Aestchen und fliegt zuweilen nach einem Insect gerade auf, um wieder auf seinem Standorte einzufallen. Man findet ihn, wie es scheint, überall in Brasilien und vielleicht in ganz Südamerika; denn bei *Rio de Janeiro* ist er nicht selten, und *Spix* fand ihn ebenfalls. Er lebt sowohl in der Nähe der Seeküste in offenen Gebüsch, als im Innern der großen Urwälder. Die *Spix'sche* Abbildung ist nicht besonders, ihre Gestalt gleicht nicht der eines *Muscicapa*, auch sind die Kopffedern nicht gut gezeichnet und gefärbt.

Unbestimmte Arten der Fliegenfänger.

1. *M. regia.*

Der Fliegenfänger mit rostfarbener Federkrone.

Fl. Auf dem Kopfe eine Krone von aufgerichteten rostfarbenen Federn, beinahe wie an *Rupicola*; im Gefieder sehr viel Aehnlichkeit mit *Muscicapa squamata*.

Le Roi des gobe-mouches, Buff. Sonn.

Tyrann huppé de Cayenne, Buff. pl. enl. No. 289.

Todus regius, Linn., Gmel.

Dieser schöne Vogel ist mir in den brasilianischen Wäldern einmal vorgekommen, wo ich ihn indessen nicht genau untersuchen und beschreiben konnte. Ich kann hier also nur sein Vorkommen im östlichen Brasilien, und zwar ziemlich weit südlich bezeugen. Er hatte in der Färbung viel Aehnlichkeit mit *Muscicapa squamata*, am Oberleibe war er grün, unten gelb mit schwarzen Wellenlinien, und eine große, aufrechte, rostfarbene Federkrone zierte seinen Scheitel, deren Spitzen, so viel ich mich erinnere, schwarz gefärbt waren. — Da ich den Schnabelbau dieses Vogels nicht genau angeben kann, so habe ich ihn, als unbestimmt, in keine der verschiedenen Unterabtheilungen des großen *Genus Muscicapa* setzen wollen.

Gen. 29. *Euscarthmus* Tafel 18.

Ich begreife unter dieser Benennung, wenigstens zum Theil, die kleinen, niedlichen Vögel, welche Azara mit der Benennung *Tachuris* belegt. Diese kleinen Thiere sind für die Familie der *Muscicapiadae* gerade das, was *Regulus* für die Familie der *Sylviadae* ist, sie verbinden mit der zierlichen, hochbeinigen Gestalt kleiner Sänger, einen breiten *Muscicapa*-Schnabel. Meine Charactere für dieses Genus sind nachfolgende:

Schnabel: stark, gerade, breiter als hoch, nach der Spitze hin verschmälert, an den Seiten meist geradlinig, zuweilen sehr sanft bogig, Kuppe sanft hinabgewölbt mit kleinem Zähnen; Firste rundlich-kantig, wenig erhaben; Dille an der Wurzel abgeflacht; Nasenloch länglich-eiförmig, oder elliptisch, offen, frei, am unteren vorderen Rande der Nasenhaut gelegen; Bartborsten am Mundwinkel.

Flügel: kurz, schwach, ziemlich abgerundet, Falten auf der Schwanzwurzel, die dritte oder vierte Schwungfeder ist die längste.

Schwanz: schmal, schwach, meist kurz.

Beine: schlank, hoch; Ferse mehr als dop-

pelt, oft ~~beinahe~~ dreimal so lang als die Mittelzehe (ohne ihren Nagel); zwei äußere Zehen am Wurzelgliede vereint.

Schon *Anara* vereinigte, wie gesagt, mehrere kleine hierher gehörige Vögel, welche mit dem Schnabel der Fliegenfänger, die Gestalt kleiner, hochbeiniger Sänger (*Sylvia*) verbinden. Sie bilden zugleich einen vollkommen natürlichen Uebergang zu der nachfolgenden, ebenfalls ähnlich gebauten Familie kleiner Plattschnäbel, welche Einige zu *Platyrynchos*, Andere zu *Todus* gezählt haben. Wenn man diese kleinen Vögel nicht in einem besonderen Geschlechte aufzählen wollte, so hätten sie bei den Fliegenfängern stehen bleiben müssen, von welchen sie sich aber, sowohl in Hinsicht der Körperverhältnisse, als auch der Lebensart merklich unterscheiden; denn sie sind gleich den Sängern (*Sylvia*) mehr beweglich und lebhaft als die wahren Fliegenfänger, mit welchen sie aber mit allen Rechten in ein und dieselbe Familie (*Muscicapidae*) zu stellen sind; sie durchkriechen gewandt die Gebüsche nach Insecten, und haben, wenigstens zum Theil, noch etwas Gesang.

melanophus.

Der Tarsus mit melonengelbem Schüttel.

T. Obertheile fahl gräulichlich, mit blassem Oliven-schimmer; Scheitel melonengelb; Hinterhals und Brust weißgrau; Bauch weiß, hellgelb überlaufen.

Beschreibung des männlichen Vogels: Ein kleiner Vogel, mit hoher, schlanker Fesse, Schnabel ziemlich plattgedrückt, mälsig breit, die Firste etwas kantig, hinter der Kuppe ein kleines Zähnchen; Dille ziemlich flach, nur höchst sanft aufsteigend; Nasenloch frei, offen, am unteren Theile der erhöhten Nasenhaut, eiförmig, die Federn treten bis zu demselben vor; Kinnwinkel etwa halb Schnabellänge; nur mälsig zugespitzt, befiedert; Bartborsten am Mundwinkel; Flügel kurz, sie falten auf den Schwanzwurzel, dritte und vierte Schwungfeder die längsten; Schwanz mälsig lang, in der Mitte nur sehr wenig ausgerandet, schmal; Beine hoch und schlank, Fesse zweimal so lang als die Mittelzehe, mit sechs bis sieben großen, glatten Tafeln belegt.

Färbung: Schnabel oben auf hornbraun; Unterkiefer weißlich-fleischroth; Beine bleifarben blas; Iris gelblich-braun; alle Obertheile von einem blassen Graubraun, hier und da etwas in's Olivenfarbene fallend; Flügel und

Schwanz hellgraubraun; Schwangfedern an der inneren Fahne am Hinterrande hell gelblich-weiß eingefasst; Gegend um das Auge, Schnabel, Nase und Backen etwas in's Röthliche fallend; Scheitel mit langen, schmalen Federchen, wie am Goldhähnchen (*Sylvia Regulus*), welche fahlorange- oder etwa melonenfarbengefärbt sind, die am Hinterkopfe mit graubraunen Spitzen; an der Seite des Scheitels fassen fahlgrau-bräunliche Federn, von der Farbe des Rückens, die gelbliche Haube ein; alle Untertheile sind weißlich, an Kehle und Unterhals am reinsten, an Brust und Bauch hellgelblich überlaufen, und auf der Mitte dieser Theile am weißesten; innere Flügeldeckfedern hell gelblich-weiß.

Ausmessung: Länge 4" $1\frac{1}{2}$ " — Breite 5" 8'" — L. d. Schnabels $4\frac{1}{2}$ " — Br. d. Schn. 14'" — Höhe d. Schn. 1" — L. d. Flügels 1" 8 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Schwanzes etwa 1" 4'" — Höhe d. Ferse 9'" — L. d. Mittelzehe 3 $\frac{1}{2}$ " — L. d. äusseren Z. 3'" — L. d. inneren Z. 2 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinterzehe 2 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Mittelnagels 1" — L. d. Hinternagels 1 $\frac{1}{2}$ ".

Weibchen: Unterschied beider Geschlechter völlig unbedeutend; am Weibchen ist die Scheitelfarbe weniger lebhaft und mehr schmur-

tzig, oder in Rothgelbe fallend, und nach der
Stirn hin schon mehr mit schwärzlich-grünen
Fleckchen gemischt; Oberflücken etwas mehr
schmutzig bräunlich überlaufen. Länge wie die
des Männchens.

Dieser kleine Vogel hat etwa die Gestalt
unseres Goldhähnchens, dabei aber den wahren
Fliegenfänger Schnabel, und ist etwas größer.
Auch in den Manieren gleicht er dem Gold-
hähnchen (*Sylvia Regulus*). Er kriecht ge-
paart in den dichten Gebüschern umher, und
das Männchen gibt alsdann einen kurzen Ge-
sang von drei bis vier aufeinander folgenden,
fallenden Tönen von sich, den es oft höflich
läßt. Von dem Weibchen vernehmen man ge-
wöhnlich keine Stimme, wenn das Männchen
seinen schlechten Gesang anstammt. Sie füttern
viele Insecten und deren Brut in den dichten,
niederem Gebüschern des *Campe Garay*, wo wir
sie beobachteten, nach sind sie nur auf
der Gränze der Provinzen Minas und Bahia
verkommen. gewöhnlich sind sie nur auf

Nach dem Briefe, welchen ich vorhin
 an Sie geschickt habe, ist die
 Sache jetzt so, dass die
 Regierung die Sache nicht
 weiter verfolgen will, und
 die Sache jetzt so, dass die
 Regierung die Sache nicht
 weiter verfolgen will, und

2. *Brachypteryx* 1950. Iris:
Der Hals gelblich. Der untere Teil des Halses ist
T. Obertheil (mächtig grün) eine gelbliche Linie vor
dem Auge. Schwanz und Schwanzfedern gelblich
grün gerandet; Kehle weißgrau; Brust bläulich grau,
gelblich gestrichelt; Unterleib weiß.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Schnabel stark, Schwanz kurz, Flügel weniger
kurz, Ferse hoch, der ganze Vogel klein. Der
Schnabel ist stark, mächtig breit, gerade, die
Kuppe ein wenig herabgebogen, dahinter ein
kleines Zähnchen oder Ausschnitt, im Durch-
schnitt ein wenig viereckig, indem Firste und
Dalle etwas kantig erhaben sind; Nase wie an
dem vorhergehenden Vogel; Kinnwinkel halb
so lang als der Unterkiefer, abgerundet, befe-
dert; Mundwinkel mit Bartborsten besetzt. Flü-
gel kurz, abgerundet, sie fallen etwas über die
Schwanzwurzel hinaus, die vierte Feder ist die
längste; Schwanz kurz, schmal, ziemlich gleich,
nur wenig abgerundet; Beine schlank und hoch,
Ferse mit sechs großen, glatten Tefeln belegt.
Zehen kurz, schlank und zierlich.

Färbung: Iris grauröthlich, an ihrem in-
neren Rande um die Pupille herum bläulich;
Oberkiefer dunkel hornbraun, der untere weiß-
lich; Beine schmutzig bleifarben, Zehensohle

gelblich; Obertheile zersiggrün; Schwungfedern schwärzlich-braun, vorn breit zersiggrün gerandet, neben an die großen Odnungen der Deckfedern; Schwanz wie die Schwungfedern, an den Seiten grün gerandet; über und besonders vor dem Auge zeigt sich ein kurzer hell gelblicher Strich oder Fleck; Kehle weißlich, aschgrau, Brust blafs graugrün, und gelblich gestrichelt; Bauch weißlich, Schenkel und Seiten graugrün überlaufen; Seiten des Kopfs von der Farbe der Obertheile; innere Flügeldeckfedern gelblich-weiß; Flügelrand gelblich.

Ausmessung: Länge 3" 9½" — Breite 5" 10" — L. d. Schnabels 4" — Br. d. Schn. 2" — Höhe d. Schn. 1½" — L. d. Flügels 1" 8½" — L. d. Schwanzes 1" 2" — Höhe der Ferse 7½" — L. d. Mittelzehe 3½" — L. d. äußeren Z. 2½" — L. d. inneren Z. 1½" — L. d. Hinterzehe 2½" — L. d. Mittelnagels 1½" — L. d. Hinternagels 2".

Weibchen: Scheinbar nicht bedeutend von dem Männchen verschieden, doch ist der Unterleib weniger rein weiß, die Federränder der Flügel weniger grün, dagegen aber mehr gelblich gefärbt.

Dieser kleine Taschuris hat in seiner Färbung viel Aehnlichkeit mit unserem Laubvogel

(*Sylvia sibillatrix*), ist aber kleiner. Ich fand dieses Vögelchen zuerst in den Manguegeßschen an den Ufern des Flusses *Mucuri*, nachher öfters im Innern der Provinz *Bahia*. Ein *Camacan*-Indianer, der als Jäger in meinem Solde stand, brachte mir einst ein sehr merkwürdiges Nest mit diesem Vogel, indem er hinzusetzte, es sey von diesem kleinen Fliegenfänger erbaut. An einem dünnen Zweige befestigt dieser Vogel sein künstliches Nest mit vielen Wurzeln und Haaren, es ist übrigens gänzlich aus den schönen silberweißen Flocken eines gewissen Grases erbaut, welches häufig im *Campo* zu *Barra da Varada* wuchs. Die Gestalt des Nestes ist länglich und schmal beutelförmig, unten rund zugebaut, und nahe am Boden auf der einen Seite mit einem kleinen runden Eingange versehen, der von oben herab durch einen vorspringenden Theil, wie durch ein Dach, geschützt ist. Die ganze Substanz dieses merkwürdigen Nestes ist höchst dicht und fest ineinander gefilzt, mit vielen Blättern und Blüthen gemischt, und scheint im angefeuchteten oder benetzten Zustande ineinander gefilzt zu werden, da sie hart und fest ist. Leider ist es mir nicht selbst geglückt, diesen industriösen Vogel bei seinem Neste zu

beobachten, doch glaube ich mich auf die Aussage meines indianischen Jägers *Henrico* verlassen zu können. Eine Zeichnung des merkwürdigen Nestes wird in meinen Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's gegeben werden.

3. *E. superciliaris*.

Der Taichuris mit weisbuntem Scheitel.

T. Obertheile graubraun, über dem Auge eine weiße Linie; Scheitelfedern an der Wurzel weiß; Untertheile hell gelbröthlich.

Le Tachuris à poitrine jaune d'Azara, Voy. Vol. III. pag. 350.

Vieill. tabl. encycl. et méth. pag. 496.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Größe, Gestalt und Verhältnisse ziemlich wie bei No. 4., allein der Schwanz länger. Schnabel wie an jenem Vogel gebildet, ziemlich flach gedrückt, mit kleinem Zähnchen hinter der etwas hinabgehogenen Kuppe; Nasenloch an der Spitze der Nasenhaut, cirkelrund, frei, die Nasenfäden treten nicht besonders weit vor; Kinnwinkel groß, breit, halb so lang als der Unterkiefer, abgerundet und befiedert; Barthorsten am Mundwinkel stark, die längsten drei Linien lang; Flügel kurz, etwas abgerundet, kaum über

die Schwanzwurzel hinausfallend, die dritte Feder scheint die längste zu seyn; Schwanz schmal, in der Ruhe ein wenig ausgerandet und abgerundet; Beine schlank und hoch, Ferse mit sieben bis acht glatten Tafeln belegt; Zehen schlank, die beiden vorderen Nebenzehen ziemlich gleich lang.

Färbung: Schnabel hornbraun; Iris graubraun; Beine bräunlich-schwarz; alle Obertheile aschgraubraun, an Kopf und Oberhals mehr in's Aschgraue fallend; an Stirn und Mittelscheitel haben die Federn eine rein weiße Wurzel, ihre Mitte ist schwärzlich-grau, ihr Rand grau; von der Nase zieht über dem Auge hin eine weiße Linie; am Mundwinkel und Kinn stehen weiße Federn; Rücken etwas olivengrün leicht überlaufen; Flügel graubraun mit helleren Rändern, hinterer Rand der inneren Fahne weißlich; Schwanz graubraun mit hell gelblichen Schäften, an der Spitze etwas abgenutzt; alle Untertheile des Vogels sind fahl gelbroth, an der Oberbrust am dunkelsten; Mitte des Bauchs und After weiß; Steiß blaß gelblich, innere Flügeldeckfedern blaßgelblich-weiß, blaß aschgrau gefleckt.

Ausmessung: Länge $4'' 1\frac{1}{2}'''$ — Breite $5'' 5\frac{1}{2}'''$ — L. d. Schnabels $3\frac{1}{2}'''$ — Br. d. Schn. $1\frac{1}{2}'''$

— Höhe d. Schn. 1''' — L. d. Flügels 1" 8"
 — L. d. Schwanzes 1" 6''' — Höhe d. Ferse 7'''
 — L. d. Mittelzehe 3½''' — L. d. äußeren Z.
 2''' — L. d. inneren Z. 1½''' — L. d. Hinter-
 zehe 2''' — L. d. Mittelnagels 1½''' — L. d.
 Hinternagels 2''.

Weibchen: Ich besitze einen andern Vo-
 gel dieser Art, der in allen Stücken mit dem
 vorhergehenden übereinstimmt, der aber an
 den Untertheilen eine mehr lebhaft röthliche
 Farbe zeigt, nur in der Mitte des Bauchs ein
 wenig weiß ist, und dessen Scheitelfedern an
 der Wurzel weniger Weiß tragen, diesen hal-
 te ich für das Weibchen

Der kleine Taschuris dieser Beschreibung
 ist von mir in den inneren *Campos Geraës* an
 den Gränzen der Provinzen *Minas* und *Bahia*
 beobachtet worden, wo er nach Insecten und
 ihrer Brut in den dichten Gesträuchen umher
 kriecht.

4. *E. cinereicollis.*

Der Taschuris mit aschgrauem Halse.

*T. Scheitel und Oberkörper zeisiggrün; Ober- und
 Seitenhals so wie die Kehle aschgrau; Brust grau
 gelb gemischt und gestrichelt; Unterleib und Rän-*

der der Deckfedern so wie des Schwanzes kinnengelb.

Beschreibung eines männlichen Vogels:
 Gestalt der vorhergehenden, aber noch kleiner und die kleinste der beschriebenen Arten, Schnabel platt, schlank, zugespitzt mit zusammengedrücktem Häkchen, über doppelt so breit als hoch, Firste ein wenig kantig, Seitenrand des Oberkiefers vor dessen Spitze oder Kuppe rundlich austretend; Nasenhaut etwas vertieft, dabei lang ausgedehnt, am vorderen Ende desselben steht das längliche Nasenloch, bis zu welchem die Federn etwas borstig vortreten; Kinnwinkel über die Hälfte der Schnabellänge vortretend, vorn abgerundet, sparsam befiedert, die Federn mit Borstspitzen; Dille flach abgerundet, sanft aufsteigend; Bartborsten des Mundwinkels drei Linien lang; Flügel kurz, erreichen nicht die Mitte des kurzen Schwänzchens, die dritte und vierte Feder sind die längsten; Schwanz gleich, in der Ruhe in der Mitte ein wenig ausgerandet, Federchen ein wenig zugespitzt; Ferse hoch und schlank, mit sieben glatten Tafeln belegt, etwas mehr als doppelt so lang als die Mittelzehe; Hinternagel groß, schlank und wenig gekrümmt.

Färbung: Oberkiefer, Spitze und Seiten-

rand des unteren schwarzbraun; Iris gelbbraun; Beine fleischbraun; Nägel schwarzbraun; Stirn, Scheitel und Obertheile lebhaft zeisiggrün, Unterrücken blässer; Obertheil und Seiten des Halses aschgrau; Kinn, Kehle und Unterhals aschgrau, weißlich gestrichelt und gemischt; auf dem Ohre steht ein weißer Fleck, und hinter diesem ein schwärzlicher; Brust gelb und grau gemischt, hellgelb gestrichelt; Unterbrust und Bauch lebhaft limonengelb, Steiß blässer; Flügeldeckfedern schwärzlich-braun, mit breiten grünen Rändern, eben so die Schwungfedern, besonders die hintern sind stark gelbgrün gerandet; Schwanz wie die Schwungfedern, ebenfalls grün gerandet; innere Flügeldeckfedern und vorderer Flügelrand blafs gelb.

Ausmessung: Länge etwa 3" — L. d. Schnabels 4" — Br. d. Schn. 2" — Höhe d. Schn. 1" — L. d. Flügels 1" 8 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Schwanzes 10 bis 11" — Höhe d. Ferse 5" — L. d. Mittelzehe 2 $\frac{1}{2}$ " — L. d. äußeren Z. 2" — L. d. inneren Z. 1 $\frac{2}{3}$ " — L. d. Hinterzehe 1 $\frac{2}{3}$ " — L. d. Mittelnagels 1 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinternagels 1". —

Weibchen oder jüngerer Vogel: Eben so wie der vorhin beschriebene, allein das weißliche und schwarze Fleckshen am Ohre fehlen.

Dieser kleine niedliche Vogel lebt in den größten Dickichten und verworrensten Gesträuchen, auch besonders gern, wie die meisten Vögel dieses Geschlechts, am Wasser. Er ist mir selten vorgekommen, bildet aber mit der nachfolgenden Art einen natürlichen Uebergang zu dem nachfolgenden Geschlechte, da sein Schnabel schon ein wenig breiter ist als an den vorhergehenden Arten.

5. *E. orbitatus.*

Der Taschuris mit weissen Augenkreisen.

T. Obertheile olivengrün; Einfassung des Auges weifs; Flügel und Schwanz schwärzlich-graubraun, mit grünen Rändern; Brust, Kehle und Unterhals olivengrau, gelblich gestrichelt; Unterleib limonengelb.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel stark, sehr platt, etwas mehr als doppelt so breit als hoch, die Firste sanft kantig erhaben, Seitenrand vor der Kuppe ein wenig bogig austretend, diese zusammengedrückt und als kleines Häkchen herabgebogen; Dille rundlich abgeflacht, sanft aufsteigend, Nasenloch länglich, an der Spitze der etwas vertieften grossen Nasenhaut, beinahe eine Linie von den

Nasenfedern entfernt und mit feinen Borsten bedeckt; Kinnwinkel beinahe halb Schnabellänge; mälsig abgerundet, an der Spitze wenig befiedert; Federn in Borsten endigend; Bartborsten am Zügel über dem Mundwinkel zwei und zwei Dritttheil Linien lang; Flügel mälsig lang, erreichen etwa die Mitte des Schwanzes, ihre dritte Feder ist die längste; Schwanz gleich, schmal; Beine ziemlich hoch, Ferse zweimal so lang als die Mittelzehe, schlank, mit fünf grossen, glatten, langen, so sehr mit einander vereinten Tafeln bedeckt, dass man sie für gestieft hält; äussere Zehen an der Wurzel stark vereint; Hinternagel am grössten.

Färbung: Schnabel am Oberkiefer horngraubraun, am unteren hell gelblich; Beine blafs, im Leben wahrscheinlich bleifarben; Einfassung des Augenlides hell weisslich-gelb; Obertheile olivengrün; Flügel schwärzlich-graubraun, eben so der Schwanz, überall mit grünen Rändern; hinterer Rand der Schwungfedern weisslich, an der hinteren Schwungfeder ist die Vorderfahne gelblich-weiss; innere Flügeldeckfedern hellgelb; Kinn, Kehle, Unterhals und Brust hell olivengrau, mit feinen gelben Strichen; Seiten olivengrau überlaufen; Bauch und

übrige Untertheile limonengelb; Brust sehr stark gelb gemischt und gefleckt.

Weibchen: Obertheile nicht so rein grünlich, ein wenig mehr bräunlich überlaufen; Kehle aschgrau mit weißlichen Strichen; Unterhals etwas bräunlich überlaufen, stark gelb gestrichelt.

*Ausmessung *) des weiblichen Vogels:*
Länge 4" — L. d. Schnabels $4\frac{1}{2}$ " — Breite d. Schn. $2\frac{1}{4}$ " — Höhe d. Schn. 1" — L. d. Flügels 1" 9" — L. d. Schwanzes etwa 1" 6" — Höhe d. Ferse $7\frac{1}{4}$ " — L. d. Mittelzehe $3\frac{1}{2}$ " — L. d. äußeren Z. $2\frac{1}{4}$ " — L. d. inneren Z. 2" — L. d. Hinterzehe 2" — L. d. Mittelnagels $1\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinternagels 2". —

Junger Vogel: Deck- und Schwungfedern der Flügel sehr stark gelblich-grün gerandet, die ersteren mit starken, breiten Spitzen von dieser Farbe; Bauch mehr verloschen gelblich, Obertheile dunkler, etwas in's Olivenbraune fallend; Augenkreis wenig bemerkbar; Kehle weißlich, Unterhals stark gelb überlaufen.

Dieser kleine Vogel lebt in den großen brasilianischen Wäldern, und läßt einen kleinen

*) Das männliche weiter oben beschriebene Exemplar war in der Mauser, ich kann daher nur die Ausmessung des Weibchens geben.

Locken-Hören. — Er macht wegen der schon breiten Bildung seines Schnabels sehr natürlich den Uebergang von den Taschuris zu den nachfolgenden Vögeln. *Gen. 30. Todus, Linn.* *Manuel d'ornithologie* einige Vögel von dem *Genus Todus* ausgeschlossen, welche man demnach in ein besonderes Geschlecht setzen, oder sie zu den Breitschnäbeln (*Platyrynchos*) zählen müßte. Sie unterscheiden sich aber von diesen, letzteren, sehr merklich, und ich halte es daher für besser, das alte *Linnische Genus Todus* für die bestehen zu lassen, welchem alsdann folgende Charactere zukommen würden:

Schnäbel lang, aus zwei dünnen Platten bestehend, viel breiter als hoch, sehr plattgedrückt, dennoch mit etwas schwach kantiger Firste, an den Seiten parallel, vorsabgerundet, mit sehr feinem Häkchen; *Nasenlöcher* an der Oberfläche des Schnabels, von der Wurzel entfernt, frei, ründlich oder länglich.

Flügel kurz, die dritte auch wohl die vierte Schwungfeder die längsten.

Beine mälsig lang, oder die Ferse sehr hoch, schlank; äussere Vorderzehen zum Theil vereint.

Ich habe nur zwei Arten für dieses Genus zu beschreiben, welche durch die Verhältnisse ihres Körpers vollkommen natürlich an das vorhergehende Geschlecht gränzen, von welchem sie sich aber durch mehr breiten, parallelseitigen, vorn zugerandeten Schnabel unterscheiden.

1. *T. melanocephalus*, Spix.

Der schwarzköpfige Plattschnabel.
P. Rücken aschgrau; Oberkopf schwarz; Nasenfedern mit gelben Spitzen; Flügel und Schwanz schwärzlich, die ersteren mit olivengelen Rändern; alle Untertheile limonengelb.

Spix 4v. T. II, pag. 8, Tab. 9. Fig. 2.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Schnabel beinahe so lang als der Kopf, platt, über zweimal so breit als hoch, Firste nur wenig erhaben, dennoch ein wenig kantig, mit sehr feinem Häkchen; Nasenlöcher länglich, frei, in der Mitte der grossen Nasenhaut weit von der Stirn entfernt, die Federn treten bis zu ihnen vor; Kinnwinkel gross, beinahe halbe

Schnabellänge, vorn mäßig abgerundet, sparsam befiedert; **Dille** flach abgerundet, an der Spitze sehr sanft aufsteigend; **Bartborsten** am Zügel beinahe drei und eine halbe Linie lang; **Flügel** kurz, erreichen kaum ein Drittel der Schwanzlänge, die dritte Feder die längste; **Schwanz** schmal, stark abgestuft, die äußeren Federn fünf und eine halbe Linie kürzer als die mittleren, alle etwas zugespitzt; **Fersel** sehr hoch, sie ist zwei und ein halbmahl so lang als die Mittelzehe, mit fünf großen, glatten Tafeln belegt; **Mittel- und Hinternägel** groß.

Färbung: Schnabel und Oberkiefer schwarzbraun, am unteren dunkelbraun, mit blässer Spitze; Beine bleifarben; Rücken aschgrau, Unterrücken graulich-olivengrün; ganzer Oberkopf mit Augen- und Ohrgegend schwarz; Flügel schwarzbraun, an Deck- und Schwungfedern mit gelbgrünen Rändern; Schwanz schwarz, die beiden äußeren Federn an jeder Seite mit starker weißer Spitze und äußerer Fahne, alle Untertheile vom Kinn bis zum Schwanz lebhaft limonengelb.

Ausmessung: Länge beinahe 3¹/₂ 9¹/₂ — L. d. Schnabels 6¹/₂ — Breite d. Schn. 2¹/₂ — Höhe d. Schn. 1¹/₂ — L. d. Flügels 4¹/₂ — L. d. Schwanzes etwa 1¹/₂ 4¹/₂ — Höhe d. Fersel

89^{4/5} — L. d. Mittelzehe 2^{1/2}'' — L. d. äußeren Z. 2^{1/5}'' — L. d. inneren Z. 1^{1/2}'' — L. d. Hinterzehe 2^{1/5}'' — L. d. Mittelnagels 1^{1/2}'' — L. d. Hinternagels 1^{1/5}''

von *Ungeles Männchen*: Der Oberkopf ist nur dunkelschwärzlich-grau, die Stirn dunkelbraun, Rücken mehr blafs und unrein grau, Flügel und Untertheile blässer gefärbt.

Dieser kleine Plattschnabel ist in Brasilien gemein. Er stellt ein künstliches Nest bauen. Spitz bildet ihn ziemlich richtig ab, allein die Beine sind nicht richtig gezeichnet, das Gelbe scheint zu hoch gefärbt.

Der *grünköpfige Plattschnabel*. *T. paliocephalus*.

Der *grünköpfige Plattschnabel*. *Pl.* Stirn und Zügel schwärzlich, Oberkopf aschgrau; Obertheile kelsiggrün; Flügel und Schwanz schwärzlich-graubraun mit grünen Rändern; ein Streif von der Nase nach dem Auge und alle Untertheile schneefelgelb.

Beschreibung des männlichen Vogels: Schnabel wie an No. 1., allein weit kürzer; die Federn des Kinnwinkels sind länger, stehen dichter und streben stark vorwärts; Bartborsten drei und vier Fünftheil Linien lang; Zunge

erreicht nicht völlig die Mitte der Schnabellänge, ist breit, vorn etwas zugerundet und etwas gespalten; Augenlider nackt, mit kleinen Haaren besetzt, geschlossen bemerkt man, daß das untere an seinem Rande kleine, gelbe Wimperfederchen trägt; Flügel kurz und abgerundet, reichen nicht weit über die Schwanzwurzel hinaus; die dritte Feder ist die längste; Schwanz aus zwölf am Ende ein wenig zugespitzten Federchen bestehend, wovon die äußeren etwas kürzer scheinen; Beine schlank und hoch; Ferse mit sechs glatten Tafeln belegt, mehr als doppelt so lang als die Mittelzehe; äußere Zehen stark vereint, der Hinternagel groß und stark gewölbt.

Färbung: Iris hochgelb; Schnabel schwarzbraun, am Seitenrande des Unterkiefers, der überhaupt mehr bräunlich ist, weißlich; Beine schön lebhaft bleifarben; Augenlider graulich; Scheitel und Oberkopf bis auf die Augen herab aschgrau, an der Stirn am dunkelsten; bei manchen Exemplaren ist die Stirn sammtschwarz, und ein ähnlicher Streifen zieht von dem Mundwinkel nach dem Auge; Oberhals und Rücken zeisiggrün; große Flügeldeckfedern schwarzbraun mit starker, gelbgrüner Einfassung, wodurch zwei gelbgrüne Querstreifen an diesen

Theilen entstehen, eben so die Schwungfedern, deren Vordersaum diese Farbe hat; Schwanzfedern schwarzbraun mit äußerem grünen Saume; alle Untertheile vom Kinn bis zum Schwanze, so wie ein starker Streifen vom Nasenloche nach dem Auge sind lebhaft gummiguttgelb.

Ausmessung: Länge 3" 7'" — Breite 5" 1'" — L. d. Schnabels 4'" — Br. d. Schn. $2\frac{1}{4}$ " — Höhe d. Schn. $\frac{1}{2}$ " — L. d. Schwanzes etwas über 14'" — L. d. Flügels 1" 6 $\frac{1}{2}$ " — Höhe d. Ferse 7'" — L. d. Mittelzehe $2\frac{1}{3}$ " — L. d. äußeren Z. $2\frac{2}{3}$ " — L. d. inneren Z. $1\frac{1}{4}$ " — L. d. Hinterzehe 2'" — L. d. Mittelnagels $1\frac{1}{3}$ " — L. d. Hinternagels $1\frac{1}{2}$ " —

Weibchen: Von dem Männchen wenig verschieden.

Dieser kleine niedliche Vogel ist, wie es scheint, über ganz Brasilien verbreitet und kommt überall nicht selten vor. Bei *Rio de Janeiro* fand ich ihn in der unmittelbaren Umgebung der Stadt in allen dichten Gebüsch und Bäumen, wo er gleich einem Fliegenfänger den Insecten nachstellt. Wegen seiner Kleinheit bemerkt man ihn kaum. Er hat eine kleine eintönige Lockstimme. In den großen Wäldern am Flusse *Belmonte* schossen mir die Botocudenknaben diese kleinen Vögel öfters mit

Pfeifen: Außer der Paarzeit sieht man sie in kleinen Gesellschaften, wie unsere Meisen, auch oft einzeln. Sein niedliches Nest soll dieser Vogel in einem hohen Baume aufhängen, auch zuweilen in einem niederen dichten Strauche, und wie man versichert, besonders gern in der Nähe des Wassers, auch behaupten die Brasilianer, daß er seine Brut immer in der Nähe eines Nestes der *Marimbondos* (Wespen) erziehe. Ein solches Nest, welches wir in der Nähe des Flusses *Parahyba* in einem hohen *Gamelera*-Baume (*Ficus*) fanden, — man versicherte mich, es gehöre diesem Vogel an, — war von Baum- und Pflanzenwolle erbaut, von länglich-kuglicher Gestalt, oben über geschlossen, und vorn mit einer sehr kleinen Oeffnung zum Eingange des Vogels versehen; es wird in meinen Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens mitgetheilt werden.

Gen. 31. Platyrhynchus, Desm.

Breitschnabel.

Schnabel: wenigstens doppelt so breit als hoch, an der Wurzel breiter als die Stirn, sehr plattgedrückt bis zur Spitze, welche mehr oder weniger herabgekrümmt und etwas zusammen-

gedrückt ist, mit kleinem Ausschnitte oder Zahn
 ab; dahinter; Seitenränder des Schnabels nicht
 parallel, sondern mehr oder weniger bogig an-
 tretend, Firste niedergedrückt, zuweilen schwach
 kantig; 2 *Bartborsten* an der Schnabelwurzel;
Nasenlöcher meist gegen die Mitte des Schna-
 bels aufliegend, oder von der Stirn entspringend,
 offen, rund, elliptisch oder birnförmig; Haut des
 Zunges hornartig, an der Spitze getheilt
 oder gefranst. Die Flügel theils kurz, theils lang; Die dritte
 Schwungfeder die längste. Die Beine theils von der Länge der Mit-
 telzehe, theils doppelt so lang; zwei äußere
 Vorderzehen an der Wurzel vereint. Diese Vögel haben etwa die Lebensart der
 Fliegenfänger, und sind auch zum Theil zu die-
 sen gezählt worden. Sie sind still, ohne be-
 deutende Stimme, sitzen gewöhnlich lange an-
 beweglich an einer Stelle, und leben von In-
 secten. Ich habe es versucht, sie in mehrere
 Unterabtheilungen zu bringen.

A. Breitschnäbel, deren Schnabel noch einmal so breit als hoch ist, deren Flügel mittelmäßig lang, deren Ferse etwas weniger als zweimal die Länge der Mittelzehe hat.

1. *P. olivaceus*, Temm.

Der olivengrüne Breitschnäbel:

B. Körper olivengrün; Flügel schwärzlich-graubraun mit gelb-bräunlichen, und an den Schwung- und Schwanzfedern mit olivengrünen Rändern; Kinn, Kehle und Brust olivengrau, gelblich gemischt; Bauch blafs limonengelb, Seiten aschgrau überlaufen.

Le Platyrhynque olivâtre, Temm. pl. col. 12. Fig. 1.

Beschreibung des weiblichen Vogels: Schnabel gebildet wie an Nro. 2. oder der nachfolgenden Art, allein im Verhältnisse mit grösserem Höhendurchmesser; einige der Bartborsten des Zügels sind beinahe sechs Linien lang; Zunge kurz, scharfrandig, mit getheilter Spitze; Kopf dick, der Körper schmal; Flügel und Schwanz wie an der nachfolgenden Art, die dritte Schwungfeder ist die längste, Beine mässig lang, Ferse mit sechs Tafeln belegt, Mittelzehe etwas mehr als halb so lang als die Ferse; Hinternagel bedeutend grösser als der mittlere.

Färbung: Iris schön graubraun; Oberkiefer schwarz, unterer röthlich-weiß; Beine bleifarben, beinahe himmelblau; Rachen lebhaft orangengelb; das schmale Augenlid gelblich-weiß; alle Obertheile graulich-olivengrün; Flügel und Schwanz dunkel graubraun; die größeren Deckfedern der ersteren röthlich-gelbgerandet; Schwungfedern mit starken olivengrünen Rändern, am hinteren Rande der inneren Fahne gelblich-weiß; Schwanzfedern olivengrün eingefasst; Kinn, Kehle, Unterhals und Brust fahl graugrün, hier und da gelblich gemischt; Mitte des Bauchs und Aftergegend blaß limonengelb, Seiten und Steiß grau überlaufen.

Ausmessung: Länge 6" 2''' — Breite 8" 11''' — L. d. Schnabels 5 $\frac{2}{3}$ ''' — Br. d. Schn. 5 $\frac{1}{4}$ ''' — Höhe d. Schn. 2 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Flügels 2" 8 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Schwanzes 2" 6''' — Höhe d. Feres 8''' — L. d. Mittelzehe 4 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äußeren Z. 3 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. inneren Z. 3''' — L. d. Hinterzehe 3 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Mittelnagels 2''' — L. d. Hinternagels 2 $\frac{1}{2}$ ''' . —

Männchen: Ich besitze den männlichen Vogel nicht, allein Herr *Temminck* hat ihn wahrscheinlich abgebildet, da diese Platte ein lebhafteres Grün zeigt, als mein weiblicher Vogel.

Dieser Breitschnabel lebt in dichten Wal-

dungen, und hat eine kurze, leise Stimme. Ich erhielt ihn zuerst in dem schönen Walde von *Itapemirim*, und er ist mir nicht oft vorgekommen.

Die Abbildung des Herrn *Temminck* (*pl. col.* 12. *Fig.* 1.) glaube ich unbedingt zu meinem Vogel ziehen zu dürfen, doch muß ich bemerken, daß sie ein weit glänzenderes und lebhafteres Grün zeigt, als meine zufällig sämtlich weiblichen Vögel, auch sind Iris und Beine unrichtig colorirt, die Stellung zu leicht und gewandt, da diese Vögel meist kurz zusammengezogen, ernst und stille dasitzen. *Spix* scheint in seinem *Platyrynchos sulphureus* (*T.* 11. *pag.* 10. *Tab.* 12. *Fig.* 1.) den hier beschriebenen Vogel vor sich gehabt zu haben.

2. *P. nuchalis*.

Der gelbnackige Breitschnabel.

B. Körper olivengrün, der Nacken blaßgelb; Flügel und Schwanz graubraun mit olivengrünen und gelblichen Rändern; Unterhals, Kehle und Brust olivengrau, gelblich gemischt und gestrichelt; Bauch blaß limonengelb.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Nabel sehr platt, breit am Mundwinkel her-tretend, beinahe dreimal so breit als hoch,

der Seitenrand tritt bis zu dem etwas zusammengedrückten Haken bogig heraus; Firste ein wenig kantig erhaben, sanft herab gewölbt; hinter dem etwas übertretenden Haken mit einem kleinen Ausschnitte; Nasenloch klein, an der Spitze der etwas vertieften Nasenhaut, welche mit zerschlissenen, zum Theil borstig endenden Federn bewachsen ist; Unterkiefer sehr platt, abgeflacht, beinahe gänzlich gerade, nur an der Spitze sehr wenig aufsteigend, sein Tomienrand zeigt vor der Kuppe einen kleinen Ausschnitt; Kinnwinkel beinahe halbe Schnabellänge, breit, abgerundet, grösstentheils mit zerschlissenen, borstig endenden Federn bedeckt, die Spitze beinahe nackt; Borsten über dem Mundwinkel zum Theil vier und zwei Dritttheil Linien lang; Augenlid am Rande befiedert, übrigens ziemlich nackt; Flügel mälsig stark, erreichen nicht gänzlich die Mitte des Schwanzes, die zweite Feder ist an meinem Exemplare die längste, doch dürfte wohl die dritte nicht ganz ausgewachsen gewesen seyn; Schwanz mälsig stark, gleich; Beine mälsig hoch, Ferse stark zusammengedrückt, sehr glatt, die Tafeln groß und so sehr mit einander verwachsen, daß man die Ferse gestieft nennen kann; Hinternagel größer als der mittlere.

Färbung: Iris graubraun; Oberkiefer schwarzbraun, der untere graulich-weiß; Beine fleischbraun; Kopf und alle Obertheile olivengrün; im Nacken steht ein breiter hell-limonengelber Fleck, der an meinem Exemplare auf der einen Seite die hintere Seite des Auges und das Ohr deckt, auf der andern aber nur bis hinter das Ohr reicht; Flügel und Schwanz schwärzlich-graubraun; die Deckfedern mit bräunlich-gelben Rändern; die mittleren und vorderen Schwungfedern, so wie die des Schwanzes mit olivengrünem Saume, hintere Schwungfedern mit mehr gelblichen Rändern; Kinn, Kehle, Unterhals und Brust graulich-olivengrün, hier und da hellgelb gestrichelt; Seiten der Brust dunkler olivengrün; Seiten des Körpers olivengrün; Bauch, Steiß und After hell limonengelb; Schenkel olivengrün.

Ausmessung des ausgestopften Vogels:
 Länge etwas über 6" — E. d. Schnabels $5\frac{1}{2}$ "
 — Breite d. Schn. $5\frac{1}{2}$ " — Höhe d. Schn. 2"
 — L. d. Flügels $3\frac{1}{2}$ " — L. d. Schwanzes beinahe 2" 6"
 — Höhe d. Fesse $3\frac{1}{2}$ " — L. d. Mittelzehe $4\frac{1}{2}$ " — L. d. äußeren Z. $3\frac{1}{2}$ "
 L. d. inneren Z. $2\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinterzehe $3\frac{1}{2}$ "
 — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{2}$ "

über dem Ohre eine gelblich-weiße Stelle; Kehle und Unterhals gelblich-weiß; Brust bläulich; stark rüthlich-braun überlaufen; Bauch blaß gelblich; an den Seiten aschgrau überlaufen; obere Flügeldeckfedern rüthlich-braun überlaufen; große Deckfedern und äußere Fahne der Schwungfedern breit rothbraun eingefast; wodurch der Flügel in der Ruhe beinahe gänzlich diese Farbe zu haben scheint; Flügelrand blaß gelb.

Ausmessung: Länge 5" 8^{'''} — Breite 9" 1^{'''} — L. d. Schnabels 4¹/₂" — Br. d. Schn. 4¹/₂" — Höhe d. Schn. 1¹/₂" — L. d. Flügels 2" 9¹/₂" — L. d. Schwanzes 4¹/₂" — Höhe d. Ferse 6¹/₂" — L. d. Mittelzehe 3²/₃" — L. d. äußeren Z. 2¹/₃" — L. d. inneren Z. 2²/₃" — L. d. Hinterzehe 2¹/₃" — L. d. Mittelnagels 2" — L. d. Hinternagels 2¹/₂". —

Diesen Vogel erhielt ich zuerst in dem großen, vortreflichen, an mancherlei Vogelarten so reichhaltigen Urwalde von *Itapemirim*. Er hat mit den übrigen verwandten Arten einerlei Lebensart, ist still, einsam, melancholisch und wenig scheu. Ich besitze bloß männliche Vögel. — *Desmarests* scheint unseren Vogel in seinem *Platyrhynque brun* abzubilden, worüber man nicht mit Gewißheit entscheiden

kurz, da die Beschreibung zu kurz ist. Sind beide Vögel identisch, so ist die Färbung der genannten Abbildung zum Theil unrichtig.

C. Breitschnäbel mit sehr langen Flügeln und kurzer Ferse; Schnabel mehr als doppelt so breit als hoch.

4. *P. rupestris*.

Der braun und rostrothe Breitschnäbel.

B. Oberkörper dunkel graubraun; Flügel schwärzlich, die Schwungfedern mit Ausnahme der Spitze rostroth; Schwanz rostroth mit weißer, schwarzer

brauner Spitze; Unterleib fahl; rostroth; Kehle und Brust graubraun überlaufen.

Muscicapa rupestris, s. meine Reise nach Brasilien Bd. I. p. 345.

Platyrhynchus hirundinaceus, Spiz. Tom. II. pag. 11. Tab. 13. Fig. 1.

Gibão 2108, *Espejo do ouro* im östlichen Brasilien.

Beschreibung des männlichen Vogels: Größerer Lerehe, Schwanz und Flügel lang, Beine kurz. Schnabel etwas kürzer als der Kopf, sehr plattgedrückt, die Fiste nur sehr wenig kantig erhaben, nur höchst wenig nach der Kuppe hinabgewölbt, welche nicht über den Unterkiefer herabtritt, und ein sehr kleines, schwaches Zähnnchen hat; Seitenränder des Oberkiefers sehr sanft bogenförmig austretend, bloß die Kuppe ein wenig zusammengedrückt; Na-

senlöcher länglich-eiförmig, noch oben erhaben
 gefaltet, die hornig endenden Federn treten
 bis dahin vor; Unterkiefer sehr plat, ohne vor-
 tretende Dille, die bloß vor der Kuppe bemerk-
 bar wird, ohne Ausschnitt vor der Spitze; Kinn-
 winkel beinahe halb Schnabellänge, sehr breit
 abgerundet, mit borstig endenden Federn be-
 deckt; Bartborsten am Mundwinkel drei Linien
 lang; Augenlid befiedert; Flügel sehr lang zu-
 gespitzt, sie reichen über das letzte Drittheil
 des Schwanzes hinaus, die dritte Feder ist die
 längste, die erste nicht viel kürzer; Schwanz
 stark und lang; ausgebreitet erscheint er sehr
 sanft abgerundet, die Federn sind an ihren Spi-
 tzen abgerundet; Beine kurz, Ferse nur wenig
 länger als die Mittelzehe, mit fünf Tafeln be-
 legt; Hinter- und Mittelnagel groß.

Färbung: Iris graubraun; Beine bräun-
 lich-dunkelgrau; Schnabel bräunlich-schwarz;
 alle Obertheile sind dunkel graubraun, zuwei-
 len mit wenig blässerem Rändern; Flügeldeck-
 federn schwarzbraun mit rostrothen Rändern,
 wodurch über diesen Theil zwei unregelmäßige
 rothbraune Querstreifen entstehen; Schwung-
 federn rothbraun mit schwarzbraunen Spitzen,
 die vorderen mit schwarzbraunem Vordersaume,
 die hinteren schwarzbraun mit rostrothem Au-

Lehrerthe und Wurzelfleck abweist, inneren Fahren; andere Flügeldeckfedern roströthlich, obere Schwanzdeckfedern und ganzes Unterflügelrumpf hell roströthlich, an den Seiten des Kopfes und Halses gelbbraunlich gemischt; Schwanz mit roth mitterseits schwarzbraunen Spitzen, die äußeren Federn etwas bläulich, etwas an gelblich. Die Kehle des Scheitels sind etwas verlängert, bilden daher im Affecte eine kleine Haube, von der

Maße: Länge 6 $\frac{1}{2}$ Zoll — Breite 4 $\frac{1}{2}$ Zoll — L. d. Schnabels 7 $\frac{1}{2}$ Lin. — Band des Schnabels 4 $\frac{1}{2}$ Lin. — Höhe d. Schn. 2 $\frac{1}{2}$ Lin. — L. d. Flügels 8 $\frac{1}{2}$ Zoll — L. d. Schwanzes etwa 2 $\frac{1}{2}$ Zoll — Höhe d. Fers 5 $\frac{1}{2}$ Lin. — L. d. Mittelzehen 2 $\frac{1}{2}$ Lin. — L. d. äußeren Z. 3 $\frac{1}{2}$ Lin. — L. d. inneren Z. 2 $\frac{1}{2}$ Lin. — L. d. Hinterzehen 2 $\frac{1}{2}$ Lin. — L. d. Mittelnagels 2 $\frac{1}{2}$ Lin. — L. d. Hinternagels 2 $\frac{1}{2}$ Lin.

Weibchen: Die roströthen Theile sind etwas dunkler gefärbt, als am Männchen, z. B. die Zeichnung der Flügel und die Brust, übrigen ist Alles gleich, auch die Größe scheint bei beiden Geschlechtern nicht verschieden zu seyn.

Dieser Vogel wurde von mir zuerst im 1sten Bande der Beschreibung meiner Reise in Brasilien, bei Gelegenheit einer Fahrt den Fluß Belmonte aufwärts, erwähnt, er kommt aber

auch meistens stilllich vor, worin ich ihn schon am Spiritusstrahl traf, später fand ich ihn am *Itaipu* und in den höheren Gegenden des Landes in Einsamkeit, unter den verschiedensten brasilianischen Vögeln, vorzüglich Fels- und Klüften zum eignen Aufenthalte zu wählen, daher sah man ihn häufig auf den Rändern der Klüften sitzen, oder auf Pfählen und Zäunern, und wo Felsen oder Gebirge fehlten, sitzt er auf einem isolirten Ast. Er ist ein einsamer, stiller Vogel, fliegt zuweilen nach einer Insece in die Höhe, und fällt wieder auf seinem Standorte ein. Am Flusse *Belmonte*, in den höheren Gegenden seines Laufes, am Rande des Urwaldes mit großen Felsstücken eingefaset ist, sah ich diese Vögel überall einzeln auf einer solchen Warte sitzen, wo sie den Insecten auflauerten. Ich habe nie eine Stimme von ihnen gehört. Die Portugiesen belegen diese Art mit der Benennung *Casaca de couro* oder *Gibão de couro* (lederne Jacke), was ich nicht annehmen will.

Die Spixische Abbildung unsers Vogels ist nur mittelmäßig, die rothbraunen Theile sind zu sehr ins Rostgelbe fallend dargestellt. Spix, Mus. Mart. Tab. 11. Fig. 1.

kleinen Vögeln u. a. Thieren. Die amerikanischen
schen Arten haben meistens in ihrer Lebensart
etwas von unsern Würgern (*Accipiter*). Ihr Nest
denn ist meist einfach und kunstlos. Ein Theil
von ihnen hat die Gabe, die Stimme anderer
Vögel nachzuahmen, jedoch findet man die-

Fam. XIII. *Laniadae*, Vigors.

Würgerartige Vögel.

Diese Familie habe ich in den nachfolgen-
den Zeilen aus den Geschlechtern *Scaphoryn-*
chus, *Psaris*, *Thamnophilus*, *Lanius* und an-
deren, nach *Vigors* zusammenzusetzen ver-
sucht. Alle diese Vögel haben einen starken,
mit einem mehr oder weniger deutlichen Zah-
ne versehenen Schnabel; denn unter allen Fa-
milien der *Insessores* hat wenigstens der größte
Theil der *Laniadae* den stärksten, oft sehr vor-
tretenden Zahn am Oberkiefer, besonders in
den Geschlechtern *Lanius* und *Thamnophilus*.
Ein großer Theil dieser Vögel lebt in den Wäl-
dern, und viele halten sich nahe an der Erde
auf, aber keiner der von mir zu beschreibenden
hat einen Gesang; dagegen haben viele
sehr wenig Stimme, andere eine sehr laute,
sonderbare. Sie nähren sich sämmtlich von
Insecten, einige der größeren Arten selbst von

kleinen Vögeln u. a. Thieren. Die americanischen Arten haben meistens in ihrer Lebensart etwas von unsern Würgern (*Lanius*). Ihr Nestbau ist meist einfach und kunstlos. Ein Theil von ihnen hat die Gabe, die Stimme anderer Vögel nachzuahmen, jedoch findet man dieses nicht bei den brasilianischen Arten.

Gen. 62. *Scaphorynchus*.

Bauchschnäbel.

Da mir der bekannte *Lanius sulphuratus*, Linn., in seinem Schnabelbaue sowohl von *Lanius*, als von *Muscicapa*, *Tyrannus* und anderen Vögeln sehr abzuweichen scheint, so habe ich es versucht, ihn unter obiger Benennung und folgenden Characterzügen für sich allein aufzustellen:

Schnabel: stark, groß, bauchig aufgetrieben, breiter als hoch, Firste kantig, sanft gewölbt, an der Spitze hakenförmig übergekrümmt, mit einem kleinen Zahne versehen; Seitenrand vor der etwas zusammengedrückten Oberkieferkuppe buchtig austretend; Unterkieferrand vor der Spitze mit einem kleinen Ausschnitte, die Dille rundlich abgeflächt; **Nasen-**

loch basal, ründlich oder oval; *Barthorsten* von der Nase bis zum Mundwinkel.

Flügel: mäßig lang, die dritte Schwungfeder ist die längste.

Beine: ziemlich kurz, *Bein* kaum länger als die Mittelse; zwei äußere Zehen an der Wurzel etwas vereinigt.

Der Vogel, welcher diese Charaktere trägt, ist ein Mittel Ding zwischen den Fliegenfängern und den Würgern (*Laniis*), doch hat er in seiner Lebensart mehr Ähnlichkeit mit der letzteren, da er weniger still, und mehr lebhaft ist, als die wahren Fliegenfänger (*Muscivora*).

1. *S. sulphuratus*.

Der Nei-Nei oder gelbbäuchige Bauchschnabel.

3. Scheitelfedern an der Wurzel gelb, an der Spitze schwarzbraun; Backen, Augen- und Ohrgegend schwarzbraun; über dem Auge nach dem Hinterkopf ein breiter weißer Streifen, eben so die Kehle; Obertheile oliven-graubraun, Flügel und Schwanz röthlich gerandet; Untertheile gummiguttgelb.

Lanius sulphureus, Linn., Gmel., Lath.

Becarde à ventre jaune, Buff. pl. enl. No. 212.

Buff., Sonn. Vol. 3. p. 369.

Le Neinei d'Azore, Voy. Vol. III. pag. 894.

Meine Reise nach Mex. B. II. p. 129. (1826)

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt und Größe des Bentavi (*Muscicapa Ritanga*), Kopf dick. Schnabel beinahe so lang als der Kopf, stark, dick, banchig aufgebogen, an der Wurzel etwas mehr als ein Viertel kürzer als hoch, die Firste kantig erhoben, gewölbt, an der Spitze in einem kleinen Haken herabstehend, hinter welchem sich ein kleiner Zahn befindet; Seitenrand des Oberkiefers vor der etwas zusammenge-drückten Oberkieferkuppe banchig austretend; Nasenloch rundlich, an der Schnabelwurzel, unter der borstigen Nasenfedern ein wenig verborgen; Unterkiefer rundlich banchig, an der Dille abgeflacht, und nur vor der Spitze ein wenig kantig; Unterkieferrand vor der Kuppe ein wenig ausgeschnitten; Kinnwinkel kurz, breit abgerundet, mit borstig endenden Federn bedeckt; von der Stirn bis zu dem Mundwinkel steht eine Reihe starker schwarzer Barthaare, von welchen die längsten vier und eine halbe Linie in der Länge haben; Augenlid am Rande mit kleinen Federn besetzt; Flügel stark, erreichen etwa die Mitte des Schwanzes, sind mächtig zugespitzt, die erste Feder kürzer, die dritte die längste; Schwanz mächtig stark, ziemlich gleich, in der Mitte ein

wenig ausgerandet, die Federn ziemlich schmal und an ihrer Spitze abgerundet; Beine ziemlich kurz, Ferse kaum eine Linie länger als die Mittelzehe, mit fünf bis sechs Tafeln belegt; Hinter- und Mittelhagel groß, der hinterste am grössten.

Färbung: — Iris graubraun; Schnabel und Füsse schwärzlich; Obertheil und Seiten des Kopfs schwarzbraun, die Federn des Scheitels an der Wurzel hochgelb, und bloß an den Spitzen schwarz, daher ist die gelbe Farbe oft verdeckt; Stirn ein wenig weißlich gemischt; über dem Zügel entspringt ein breiter weißer Streifen, der an der Seite des Hinterkopfs endet, nachdem er über dem Auge hingezogen ist; beide Streifen vereinigen sich nicht, wie am Bentavi, mit welchem dieser Vogel in der ganzen Färbung seines Körpers die größte Aehnlichkeit hat; Obertheile graubraun, mit einem starken Anstrich von Olivengrün auf dem Rücken, große Deck- und Schwungfedern mit rothbräunlichen, und die hinteren zum Theil mit weißlichen Rändern; hinterer Saum der Schwungfedern fahl gelblich; Schwanz dunkel graubraun, die Federn an der äußeren Seite mit rothbraunem Saume; innere Flügeldeckfedern hell gelb; Kinn und Kehle weiß; Un-

terhals und alle Untertheile, bis zum Schwanz schön lebhaft gummiguttgelb.

Ausmessung: Länge 9" 9" — Breite 14" 7" — L. d. Schnabels 1" — Br. d. Schn. 6 $\frac{1}{2}$ " — Höhe d. Schn. 4 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Flügels 4" 4" — L. d. Schwanzes über 3" — Höhe des Fusses 7 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Mittelzehe 6" — L. d. äußeren Z. 5" — L. d. inneren Z. 3 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinterzehe 3 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Mittelnagels 3 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinternagels 3 $\frac{1}{2}$ ".

Weibchen: Von dem Männchen nur sehr wenig verschieden, die Flügeldeckfedern sind stärker rothbraun gefärbt, Bauch etwas weniger lebhaft gefärbt.

Dieser Vogel ist durch den von Azara ihm beigelegten Namen vollkommen gut characterisirt, da er deutlich die Sylben *Nei! Nei!* oder *Gnei! Gnei!* in einem hohen Tone ausruft. Seine Stimme ist aber nicht sehr laut, und wird daher weniger bemerkt, als die dreisylbige des Bentavi. Der *Nei-Nei* ist in den von mir bereisten Gegenden überall anzutreffen, allein er ist bei weitem nicht so häufig als der Bentavi, obgleich auch eben nicht selten. Er lebt gewöhnlich paarweise oder einzeln, in Gebüsch, Wäldern, abwechselnden Gegenden, besonders am Rande der Gehölze. Man sieht ihn

auf die Erde fliegen, wieder auf einen Ast, und wenn er ein Insect gefressen hat, den großen, dicken Schnabel an den Aesten wetzen. Oft hält er sich in den dichten Kronen der Bäume auf, er ist stets in Bewegung, hüpfte auf den Zweigen umher und läßt seine Stimme hören. In der Lebensart gleicht er sehr dem Bentavi (*Muscic. Pitangua*), scheint aber mehr Waldvogel zu seyn, und kommt den Wohnungen selten so nahe. Sein Nest habe ich nicht finden können. Wegen seiner in Gestalt und Färbung überaus großen Aehnlichkeit mit dem Bentavi, wird er mit diesem häufig verwechselt, allein der Schnabelbau beider Vögel ist zu sehr verschieden. *Sonnini* hat, wie bei *Muscicapa Pitangua* schon gesagt, beide Vögel mit einander verwechselt; denn er sagt, „der Vogel mit dem dicksten Schnabel (die *Beccarde à ventre jaune*) ruft *tictivi*, welches gänzlich umgekehrt werden muß.“ — Eben so muß *Buffon's* Figur Nro. 212, ihres dicken Schnabels wegen hien, und nicht auf dem Bentavi gedeutet werden.

Gen. 33. *Thamnophilus*, Vieill.

B a t a r a.

Schnabel: mälsig lang oder kurz, stark, zusammengedrückt, höher als breit, etwas gewölbt, an der Wurzel etwas ausgebreitet, zuweilen an den Seiten erweitert; Kuppe mehr oder weniger herabgebogen und gezähnt. **Nasenlöcher** lateral, etwas von der Schnabelwurzel entfernt, rundlich oder eiförmig, frei.

Zunge: meist etwa halb so lang als der Schnabel, hornartig, vorn etwas getheilt oder mit Borsten besetzt.

Flügel: kurz, abgerundet, die vierte, fünfte und sechste Schwungfeder sind die längsten.

Schwanz: ziemlich stark und abgestuft.

Beine: meist lang, Ferse, ein Paar Annahmen abgerechnet, wenigstens anderthalbmal so lang als die Mittelzehe; zwei äußere Zehen an der Wurzel vereint.

Diese Vögel stehen in Gestalt und Bildung in der Mitte zwischen *Lanius* und *Myiothraupis*, sie haben in der Hauptsache die Lebensart der letzteren, allein man beobachtet sie nur auf den Zweigen und weniger auf der Erde. Sie sind meist Vögel der Urwälder, einsam, still, mit zum Theil lauter, sehr sonderbarer, zum Theil

lauter, einfacher Stimme, ohne alle empfehlende Eigenschaften, insectenfressend, zum Theil an Fluszufern, zum Theil in dichten, dunkeln Gebüsch, oder den finsternen Laubmassen des Urwaldes verborgen. Die gröfseren Arten finden sich zum Theil in offenen Gegenden, von ihrer Lebensart hat *Azara* Nachricht gegeben. In ihren Mägen habe ich Ueberreste von Insecten gefunden, und die Nester, welche ich von ihnen sah, waren einfach und kunstlos gebaut. Ich habe in dem Character des gegenwärtigen Geschlechtes, wie ihn *Temminck* in seinem *Manuel d'ornithologie* annimmt, einige kleine Abänderungen getroffen, da alle von mir hieher gesetzten Vögel viel Aehnlichkeit, sowohl in ihrer Bildung als in ihrer Lebensart zeigen. Sie haben sämmtlich einen dickeren, höheren Schnabel als die *Myiotheren*, meistens ziemlich oder bedeutend hohe Fersen, einen gedrungenen Körper und dicken Kopf. — Der von *Azara*, unsern Vögeln beigefügte Name, *Batara*, kommt in Brasilien nicht vor, da er aber von *Temminck* angenommen wurde, so habe ich ihn auch als deutsche Benennung beibehalten.

A. Batara's mit stark zusammengedrücktem Schnabel, dessen Haken oft nicht stark, dabei auch nur schwach gezähnt ist.

1. *T. stagurus.*

Der rothhängige Batara.

B. Männchen: Obertheile schwarz, alle unteren weiß; äußere Schwanzfedern weiß gefleckt; Schulter- und Schwungfedern weiß gerandet; Iris hochroth. Weibchen. Alles was an dem Männchen schwarz gefärbt, ist hier rostroth.

Le grand Batara d'Azara, Voy. Vol. III. pag. 419.

Lanius stagurus, Lichtenst.

Tamnophilus major, Vieill. tabl. encycl. pag. 744.

Tamnophilus albiventer, Spix.

Meine Reise nach Bras. Bd. II. pag. 341.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel nur wenig kürzer als der Kopf, stark, hoch, an der Wurzel mälsig breit, dann zusammengedrückt, auf der Firste ziemlich gerade, nach der Kuppe sanft hakenförmig gekrümmt, mit deutlichem Zahne; der Haken tritt um zwei Dritttheil-Linien über den geschlossenen Unterkiefer herab; Nasenloch mälsig groß, ziemlich eiförmig, frei, die etwas aufstrebenden Zügel- federn treten bis dahin vor; über dem Mund- winkel sehr kleine Bartborsten; Kinnwinkel be- nahe halbe Schnabellänge, vorn abgerundet,

versenkt, an der Spitze leicht befiedert, vor derselben tritt die Dille heraus, ist schwach kantig abgerundet, und gegen die Spitze ziemlich stark aufsteigend gewölbt; Zunge beinahe so lang als der Schnabel, an der Spitze gespalten; Kopf dick, die Scheitelfedern verlängert, die längsten zehn Linien lang, sie bilden im Affect eine Haube; Augenlid nackt, am Rande befiedert; Rumpf stark und gedrungen; die Flügel fallen nicht weit über die Schwanzwurzel hinaus, sind ziemlich abgerundet, die vierte und fünfte Schwungfeder sind die längsten; Schwanz ziemlich stark, mälsig lang, die Federn ziemlich schmal, an der Spitze abgerundet, ein wenig abgestuft, die äulseren etwa neun Linien kürzer als die mittleren; Beine stark und ziemlich hoch; Ferse beinahe doppelt so lang als die Mittelzehe, mit sechs glatten Tafeln belegt, Fersensohle mit kleineren Tafeln bedeckt; äulsere Zehen am Wurzelgliede vereint; Hinter-nagel gros, stark gewölbt.

Färbung: Iris im Auge sehr schön höchst glühend zinnoberroth; Beine bleifarben, in's Himmelblaue ziehend; Schnabel schwarz; alle oberen Theile schwarz, am Unterrücken einige Federn an der Wurzel weifsgrau, daher dieser Theil aschgrau gemischt erscheint; am Ober-

rücken sind die Federn an der Wurzel weiß, welches man aber erst bei genauerer Untersuchung findet; Schultern schwarz, die kleineren Deckfedern weißlich gerandet, die großen ebenso, aber breiter, daher zeigen sich auf den Deckfedern ein Paar starke weiße Queerstreifen; Schwungfedern mit einem feinen weißen Saume an der Vorder, und mit einem breiten an der inneren Fahne; zwei mittlere Schwanzfedern schwarz, am Rande mit einigen weißlichen Pünctchen, die übrigen haben unterbrochene weiße Queerbinden, wovon an jeder Fahne ein Fleck steht, an den äußersten am stärksten, hier sind beinahe vollkommene Queerbinden; alle unteren Theile sind schmutzig weiß, die Kehle am reinsten; Brust und Bauch gelblich beschmutzt; das feurig rothe Auge zielt den schwarz und weißen Vogel sehr.

Ausmessung: Länge 8" — Breite 10" — L. d. Schnabels 10" — Br. d. Schn. 3" — Höhe d. Schn. 4" — L. d. Flügels 3" $4\frac{1}{3}$ " — L. d. Schwanzes 3" — Höhe d. Ferse 1" $2\frac{1}{3}$ " — L. d. Mittelzehe $8\frac{1}{2}$ " — L. d. äußeren Z. $5\frac{1}{2}$ " — L. d. inneren Z. 5" — L. d. Hinterzehe $5\frac{1}{4}$ " — L. d. Mittelnagels $3\frac{1}{2}$ " — L. d. äußeren N. $2\frac{1}{3}$ " — L. d. Hinternagels $3\frac{1}{2}$ ". —


Weibchen: Auge wie am Männchen; Ober-

kiefer und Dillenkaute des Schnabels schwärzlich, Unterkiefer bleifarben, an der Wurzel etwas bläulich; Beine bleifarben, in's Himmelblau ziehend; Scheitel mit etwas langen aufzurichtenden Federn, wie am Männchen; Gestalt bei beiden Geschlechtern gleich; alle Obertheile, welche bei dem Männchen schwarz, sind hier lebhaft rostroth, am Unterrücken haben die lockeren, weichen Federn sehr viel Aschgrau und nur rostrothe Spitzen; Schwungfedern rostroth, nur die innere Fahne völlig schwarzbraun, nach der Wurzel hin hat dieselbe aber einen weißlichen Rand; Schwanz aus zwölf rostrothen Federn, die beiden äußersten an jeder Seite mit einem blassen Bändchen an der Spitze, innere Fahne etwas dunkler gefärbt; alle unteren Theile sind schmutzig weiß, Kehle und Unterhals etwas grau überlaufen, Oberbrust grau-gelblich angefliegen, und so wie die Seiten am stärksten mit dieser Farbe gedeckt; Mitte der Brust und des Bauchs am reinsten weiß; untere Schwanzdeckfedern hell blaß rostgelb.

Ausmessung: Länge 8" 8''' — Breite 10" 2''' — L. d. Schnabels 9½''' — Höhe d. Ferse 1" 2½''' — L. d. Mittelzehe 7½''' — L. d. Flügels 3" 2½'''.

Dieser schöne, sonderbare Vogel wurde von

mir zuerst auf den Inseln des Flusses *Belmonte* beobachtet, wo ich anfänglich seine sonderbare Stimme vernahm, ohne den Vogel erhalten zu können. Er lebt nämlich immer an Flussufern in den dichtesten niederen Pflanzen und Gesträuchen, sitzt aber auch häufig auf einem Zweige ziemlich niedrig über dem Ufer, und läßt daselbst seine Stimme hören. Sie klingt als wenn man eine Kugel auf einen Stein oder andern harten Körper fallen läßt, wo sie immer wieder in die Höhe springt, die Töne fallen aber immer mehr von der Höhe zur Tiefe hinab, und ihnen folgt am Schlusse ein tiefer, starker Basston; diese Stimme liess sich auf folgende Art sehr richtig ausdrücken:



Da dieser Vogel sich immer in dem dicht gedrängten Rohre, Grase und andern Ufergesträuchen verbirgt, so ist er nicht leicht zu erlegen, und ich habe ihn nur beobachten können, indem ich mich stille in der Nähe seines Aufenthaltes verbarg. Bemerkt er etwas Fremdartiges, so ist er sogleich in seinem dichten Schlupfwinkel verborgen. In seinem Magen

fand ich Ueberreste von Insecten. Da die Dicken der Ufergesträuche an jenen brasilianischen Flüssen in den Urwäldern zu dicht sind, um durchsucht zu werden, so habe ich mich vergebens bemüht, das Nest dieser Vögel zu finden, ob ich gleich die Botocuden ebenfalls benutzte, um meinen Endzweck zu erreichen.

Da Azara diese Species auch in Paraguay fand, und Spix in den Wäldern am Rio S. Francisco, so ist sie über einen grossen Theil von Südamerica verbreitet. — Spix bildet unsern Vogel ab, allein die Stellung seiner Figuren ist nicht gut, zu schlank, dabei haben meine männlichen Exemplare die mittleren Schwanzfedern beinahe ohne alles Weiss, auch giebt die genannte Abbildung die Iris des Vogels graubraun an, welches ihm seinen schönsten Character nimmt.

2. *T. doliatus*.

Der schwarz gestreifte Batara.

B. Haube schwarz; Oberkörper schwarz, mit schmalen weissen Queerstreifen; der Unterkörper weiss, mit schmalen schwarzen Queerwellen; Weibchen an Haube, Rücken, Flügeln und Schwanz röthbraun, unten graugelblich, mit feinen schwärzlichen Queerwellen.

Lanius dollatus, Linn., Gmel., Lath.

Pic-Grèche rayée de Cayenne, Buff., Sonn. Fel.

III, pag. 360.

Buff. pl. enl. No. 297. Fig. 1.

Thamnophilus radiatus, Spix Av. pag. 24. Tab. 22.

2. mas. 38, 1. fem.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel kurz, stark, an der Wurzel etwas breit, übrigens zusammengedrückt, hoch, Firste gewölbt, Haken des Oberkiefers sehr klein, kaum über den unteren herabtretend, mit deutlichem Zahne; Nasenloch eiförmig, ziemlich weit und frei, die etwas aufstrebenden Nasenfedern treten bis dahin vor; Kinnwinkel kurz, breit, ziemlich stumpf, an der Spitze sparsam befiedert und stark versenkt; Dille stark abgerundet, stark gewölbt aufsteigend; Zunge etwa zwei Dritttheil der Schnabellänge; hornartig, schmal, vorn getheilt und gefranst; Bärtborsten fehlen, aber am Zügel und Kinnwinkel stehen in kurze Borsten endigende Federn; Federn des Scheitels in einen nach hinten über den Hinterkopf in der Ruhe etwas hinaus reichenden Busch verlängert, der im Affecte aufgerichtet wird; die Flügel erreichen etwa ein Dritttheil der Schwanzlänge, sind kurz, etwas abgerundet, die fünfte Feder ist die längste; Schwanz aus schmalen, sanft zugespitzten, mälsig langen

Federn zusammengesetzt, etwas abgestuft, äußere Federn um einen halben Zoll kürzer als die mittleren; Beine ziemlich hoch und schlank, Fersenrücken mit sechs glatten Tafeln belegt, Sohle mit kleineren Tafeln; zwei äußere Zehen am Wurzelgliede vereint.

Färbung: Rachen und innerer Schnabel hell orangengelb; Schnabel hornschwarz, unter dem Nasenloch und an der Wurzel beider Kiefer, so wie um den Kinnwinkel herum bleifarben; Beine bleifarben; Scheitelfedern schwarz, sie sind vor dem Auge und auf dem Nasenloche weiß gestreift; Seiten des Kopfs und Halses weiß, mit kurzen, schwarzen, abwärts laufenden Längsstrichen; Hinterkopf und Oberhals schwarz und weiß gefleckt; alle Obertheile schwarz mit weißen, schmalen Bogenstreifen wellenförmig durchzogen, am Unterhalsen bläulich und weißlich gefärbt, da hier lange lockere Dunstfedern stehen; Flügeldeckfedern schwarz und weiß gefleckt, eben so die Schwungfedern, welche schmale unterbrochene Binden tragen; an den vorderen Deck- und Schwungfedern ist die weiße Zeichnung ein wenig gelblich; innere Flügeldeckfedern weiß, schwärzlich-grau und am vorderen Rande gestreift; auch die Federn an jedem Rande

mit kleinen weißen Fleckchen, die an den äußeren Federn größer sind; alle Untertheile weißlich, an der Kehle fein schwarz längs gestrichelt, an Unterhals, Brust, Bauch und Seiten mit bogigen schwarzen Wellenlinien bezeichnet, letztere Theile sehr blaß gelblich überlaufen; Mitte des Bauchs ungefleckt; Schenkel mit ziemlich großen schwarzen Flecken.

Ausmessung: Länge 6" 10'" — Breite 9" — L. d. Schnabels 7'" — Höhe d. Schn. 3'" — L. d. Flügels 2" 10'" — L. d. Schwanzes etwas über 2" 6'" — Höhe d. Ferse 1" — L. d. Mittelzehe 6'" — L. d. äußeren Z. 4½'" — L. d. inneren Z. 2½'" — L. d. Hinterzehe 3½'" — L. d. Mittelnagels 2½'" — L. d. äußeren N. 1½'" — L. d. Hinternagels 3'" —

Weibchen: 6" 9'" lang; Scheitel rostbraun; Kopf graugelblich, schwärzlich-braun längs gestreift und gefleckt; Rücken röthlich-braun, gelblich-olivengrün gefleckt und gemischt; Flügel und Schwanz rothbraun, die innere Schwungfederfahne graubraun, mit blaß gelblichen Zackenflecken am Hinterrande; äußere Schwanzfedern mit verloschener schwärzlicher Queerzeichnung; alle Untertheile blaß röthlich-gelb, an der Brust am dunkelsten, wie am Männchen schwärzlich gezeichnet, aber viel

blässer, weniger und mehr verleschen; Bauch in der Mitte weißlich ungefleckt, so wie After und Steiß; Unterkiefer des Schnabels gänzlich bleifarben.

Dieser Vogel wurde von uns im inneren Brasilien, in den *Campos Geraës* gefunden, wo er sich paarweise in den Gebüschten aufhielt. Er ist den Naturforschern aus *Guiana* schon bekannt gewesen, und *Buffon* hat ihn ziemlich schlecht abgebildet, auch *Spix* giebt auf seiner 35sten und 36sten Tafel eine Abbildung von ihm. —

3. *T. scalaris*.

Der Batara mit gewellter Brust.

B. Scheitel schwarz (am Weibchen rothbraun), Obertheile röthlich-olivengraun; Kinn, Kehle und Brust aschgrau, mit feinen schwarzen Querstreifen; Bauch und Seiten ungefleckt graubräunlich-fahl; Schwanz schwarzbraun mit weißen Fleckchen an der inneren Fahne.

Lanius scalaris, Licht.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Schnabel an der Wurzel nur mäßig ausgebreitet, übrigens zusammengedrückt, die Tomienränder ein wenig eingezogen; Firste nach der Spitze sanft

hinabgewölbt, mit feinem, etwa eine halbe Linie über den Unterkiefer herabtretendem Haken, und sehr kleinem Zähnechen dahinter; Kinnwinkel ziemlich abgerundet, an der Spitze leicht borstig befiedert; Dillenkeite abgerundet, sanft gewölbt aufsteigend; Nasenloch etwas länglich, zum Theil von den Federn ein wenig versteckt; Zunge nicht völlig halb so lang als der Unterkiefer, vorn hornartig, gespalten, und auf beiden Seiten der Spitze stark mit Borsten besetzt; Zügel dicht befiedert, mit kurzen schwarzen Borsten gemischt; Bartborsten über dem Mundwinkel sehr klein, kaum bemerkbar; die Flügel sind kurz, fallen kaum über die Schwanzwurzel hinaus, etwas abgerundet, die fünfte Schwungfeder die längste; Schwanz mälsig lang, schmal, die Federn ein wenig zugespitzt, abgestuft; Beine schlank, Ferse glatt mit sieben Tafeln belegt, bloß in dem Gelenke der Kniebeuge befiedert; Zehen schlank, gefäelt, die äusseren ein wenig verbunden; Hinternagel groß, und stark bogig gewölbt.

Färbung: Iris melonenfarben, an der Pupille lebhafter, und am äußersten Rande blässer; Beine bleifarben; Oberkiefer und Spitze des unteren bräunlich-schwarz, Wurzel des unteren bleifarben; Rachen hell orangengelb;

Scheitel mit etwas verlängerten Federn, schwarz; Hinterhals olivengrau, mit verloschenen schwärzlichen Flecken; Rücken röthlich-graubraun mit schwärzlichen Flecken, hier und da gelbbraunlich überlaufen, daher oliven-braun scheinend; Unterrücken ungefleckt aschgrau; Flügel röthlich-braun, vordere große Deckfedern an der Vorderfahne zum Theil blafs gelbgrau, an der Hinterfahne dunkel graubraun; Schwungfedern graubraun mit röthlichem Vordersaume, und blaßgelbem Hintersaume; innere Flügeldeckfedern weißlich-gelb; alle Untertheile weißlich-grau, an Kinn und Kehle sehr blafs und verloschen grau, an der Brust nett und stark schwarz queergestreift; Bauch, Schenkel, After und Seiten fahl grau, hier und da stark gelblich überlaufen; Schwanz schwarz-braun, die mittleren Federn an der inneren Fahne mit einer Reihe starker weißer Flecken, die äußerste Fahne hat nur unmerklich kleine Randfleckchen, äußere Feder weiß und schwarz queergestreift.

Ausmessung: Länge 6" 1''' — Breite 7" 6''' — L. d. Schnabels $5\frac{1}{2}$ ''' — Br. d. Schn. 2''' — Höhe d. Schn. $2\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Flügels 2" 4''' — L. d. Schwanzes 2" 6''' — Höhe d. Ferse 11''' — L. d. Mittelzehe $5\frac{2}{3}$ ''' — L. d. äußeren

Z. $4\frac{1}{4}'''$ — L. d. inneren Z. $3\frac{4}{5}'''$ — L. d. Hinterzehe $3\frac{2}{5}'''$ — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{5}'''$ — L. d. äußeren N. $1\frac{3}{4}'''$ — L. d. Hinternagels $3'''$.

Weibchen: Alle Obertheile röthlich-braun, Nacken und Oberrücken etwas gelblich überlaufen; Unterrücken aschgrau, etwas olivenfarben bespitzt; Schwanz und Flügel rostroth, doch sind einige Federn des ersteren mit blässer, undeutlicher, schwärzlicher Zeichnung; Seiten des Kopfs grau; alle Untertheile fahl graugelb, an der Kehle schmutzig weißlich, an der Brust stark gelbbraunlich überlaufen, mit dunkleren grauen Federrändchen; Aftergegend mehr weiß; Seiten, Schenkel und Steiß gelblich-graubraun; Iris wie am Männchen.

Dieser Vogel ist mir nicht sehr häufig vorgekommen, er hat einerlei Lebensart und Manieren mit der nachfolgenden Art.

4. *T. cristatus.*

Der Batara mit schwarzer Haube.■

B. *Haube, Gesicht und Kehle schwarz; Seiten des Kopfs, Halses und der Brust aschgrau; Bauch weißlich; Rücken röthlich-braun; Schulterfedern und Schwanz schwarz und weiß gefleckt; am*

Weibchen die Haube, Schwanz und Schultern röthlich-braun.

? Turdus cristatus, Lath.

Beschreibung eines männlichen Vogels:
Schnabel stark, an der Wurzel breit, von der Mitte an zusammengedrückt, so hoch oder ein wenig höher als breit, Tomienrand eingezogen, Firste sehr sanft hinabgewölbt, die Kuppe wenig über die untere hinabtretend, beinahe gänzlich ohne Haken, mit kleinem Ausschnitte; Nasenloch frei, eiförmig, an der Spitze der mit Federn bedeckten Nasenhaut; Kinnwinkel etwas mehr als ein Drittheil der Schnabellänge, an der Spitze nackt oder sparsam befiedert; Dille abgerundet, sanft gewölbt aufsteigend; Zunge etwa halb so lang als der Unterkiefer, hornartig, zugespitzt, vorn ein wenig getheilt; Scheitelfedern verlängert, die längsten halten beinahe sieben Linien in der Länge, werden im Affecte zu einer Haube aufgerichtet; Flügel kurz, reichen nicht weit über die Schwanzwurzel hinaus, die fünfte Feder scheint die längste, die vierte und sechste sind wenig kürzer; Schwanz mälsig lang, die Federn schmal, kurz zugespitzt, nur wenig abgestuft; Beine schlank, Ferse doppelt so lang als die Mittelzehe, mit sieben glatten Tafeln belegt, die Fersensohle eben-

falls schildtaffig, die Tafeln aber kleiner; äussere Zehen am ganzen Wurzelgliede vereint; Hinternagel stark und sehr gekrümmt.

Färbung: Schnabel schwarz; Beine bläulich-bleifarben; Iris dunkel graubraun; Gesicht bis hinter das Auge, Haube, Oberkopf bis in den Nacken, Kinn, Kehle, Zügel und Mitte des Unterhalses bis auf die Brust kohlschwarz; Seiten des Kopfs, Halses und des Körpers weisslich-ashgrau; untere Theile graulich-weiss, in der Mitte mehr weiss, und an den Seiten mehr ashgrau, bei manchen Individuen in der Mitte beinahe gänzlich weiss; alle Obertheile vom Halse bis zum Schwanze röthlich-kastanienbraun, die Federn zum Theil versteckt weiss und schwärzlich gefleckt, welches man in der Ruhe derselben wenig bemerkt; Flügeldeckfedern schwarz mit kleinen weissen Spitzen, daher erscheint der obere Theil der Schultern gefleckt, auf den grossen Deckfedern entstehen aber zwei weisse Queerstreifen; Schwanz schwarzbraun, mit etwa sechs bis sieben weissen Fleckchen an jedem Rande der Federn, welche einander gegenüber stehen; innere Flügeldeckfedern weiss, mit einigen schwärzlichen Strichen und Queerfleckchen.

-die *Abmessung* des Längs *) beinahe 6" —
Breite 8" 2''' — L. d. Schn. 6½''' — L. d. Bruch-
Schn. 2½" — Höhe d. Schn. 2½" — L. d. Flü-
gels 2" 6½''' — L. d. Schwanz beinahe 2" 6½'''
— Höhe der Fers. 1½''' — L. d. Mittelzehe
5½''' — L. d. äußeren Z. 3½" — L. d. inneren
Z. 2½" — L. d. Hinterzehe 8½" — L. d. Mit-
telnagels 2½" — L. d. äußeren N. 1½" — L. d.
Hinternagels 2½". —

Weibchen: Scheitel mit seinen ebenfalls
verlängerten Federn röthlich-braun, am Unter-
rücken mit "langen" grauen Daunenfedern, deren
Spitzen röthlich-braun; Schwanz roströthlich-
braun, in der Mitte sind die Federn dunkler, und
die bei dem Männchen weißen Flecken sind
hier heller rothbraun als der übrige Schwanz;
Schulter- oder Flügeldeckfedern schwärzlich,
mit einigen weißlichen Federspitzen, welche an
den größeren Ordnungen ebenfalls zwei Quer-
streifen bilden; Untertheile und Seiten des
Kopfs, weißlich-gelbgrau, aber die Mitte aller
dieser Theile mehr weiß, an den Seiten des
Kopfs, Halses und der Brust gelblich, an den
Seiten des Rumpfs grau. —

*) Dieser Vogel kann bei völlig ausgewachsenen Federn noch
um einige Linien länger seyn.

Junges Männchen: Gefärbt wie der weibliche Vogel.
Dieser Batara lebt im inneren Brasilien, ich fand ihn im Sertong der Provinz Bahia in kleinen Gebüschern im Campo Geral. Er hat eine ziemlich laute, mit mehreren Tönen abfallende Stimme. Ich bemerkte ihn auf den niederen Zweigen der Gebüschern.

5. *T. nigricans*.

Der schwarzgraue Batara.

B. Körper aschgrau, oben dunkler als unten; Rücken weiß und schwärzlich verborgen gefleckt; Scheitel, Flügel und Schwanz schwarz, die letzteren weiß gefleckt.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel ziemlich stark, an der Wurzel ausgebreitet, nach vorn zusammengedrückt, Spitze nur sehr sanft gewölbt, Haken schwach, mit deutlichem Zahne; Nasenlöcher weit, länglich-rund; Kinnwinkel mälsig lang, vertieft, borstig befiedert; Dillenkante ziemlich stark gewölbt aufsteigend; Flügel mälsig abgerundet, erreichen kaum ein Dritttheil des Schwanzes, dieser ist ein wenig abgestuft, mälsig stark; Beine mälsig hoch, Ferse mit sechs glatten Tafeln belegt, ihre Sohle mit kleineren Schiltschuppen.

Färbung: Iris graubraun; Beine bleifarben; Schnabel bleigrau; auf der Firste schwärzlich; ganzer Körper aschgrau, an der Brust blässer als am Rücken, an Kehle, Bauch und Steiß am blässesten; Federn des Rückens weiß und schwarz gefleckt, diese Farben werden ab in der Ruhe von den grauen Federspitzen bedeckt; Stirn aschgrau; Scheitel schwarz; Flügel schwarz, die Ränder und Spitzen der Deckfedern zum Theil weiß, der Vorder- und Hinterrand der Schwungfedern weißlich; Schwanz schwarz, die Federn mit einer kleinen weißen Spitze; und gegen ihre Mitte hin an jedem Rande mit einem weißen Randfleck, welche einander gegenüber stehen.

Messung: Länge 5" 7^{'''} — L. d. Schnabels 6¹/₂" — Br. d. Schn. 2¹/₂" — Höhe d. Schn. 2¹/₂" — L. d. Flügels 2" 7¹/₂" — L. d. Schwanzes 2" 8 bis 4" — Höhe d. Ferse 9¹/₂" — L. d. Mittelzehe 5¹/₂" — L. d. äußeren Z. 4" — L. d. inneren Z. 2¹/₂" — L. d. Hinterzehe 3¹/₂" — L. d. Mittelnagels 2" — L. d. äußeren N. 1¹/₂" — L. d. Hinternagels 2¹/₂".

Junges Männchen: Scheitel zum Theil noch aschgrau gefleckt; auf dem Rücken stehen sehr weiß, schwarz gemischte Flecken; denn hier sind die Federn zum Theil

am oberen einen Fahne weiß, an der anderen schwarz; Unterrücken schmutzig graugelb; Flügeldeckfedern schwarzbraun mit weißen Spitzen, die vorderen aber gelblich-graubraun, eben so sind zum Theil die Schwungfedern vorn gerandet; die hinteren mit starker weißer Einfassung; Kiele weißlich; Untertheile fahl, graugelb; die weißen Flecken im Schwanz sind länger, und wenn dieser geschlossen ist, so scheinen sie von jeder Seite nach der Mitte eine schiefte Querverbindung zu bilden. *Weibchen*: Scheitel und Schwanz rothbraun, der letztere an den äußeren Federn mit weißen Flecken, welche eingestellt sind wie an den jungen Männchen, aber vor der weißen Farbe zeigt sich immer noch eine schwärzliche Einfassung; mittlere Schwanzfedern ungefleckt rothbraun; Flügel graubraun, röthlich überlaufen, aber mit sehr starken weißen Rändern und Spitzen an den Deckfedern und hinteren Schwungfedern; Rücken olivenbraun; Untertheile fahl graugelb.

Varietät, weiblichen Geschlechts: Der Scheitel ist rothbraun mit großen weißen Flecken, deren sich auch einige am Rücken zeigen; Untertheile hell gelbröthlich-olivenbraun. Dieser Vogel gehört zu den gemeinsten

der ganzen Familie in Brasilien, und wird sowohl südlich als nördlich in den grossen Wäldern und Gebüschern gefunden. Er hält sich gern im Dickicht des Laubes auf, kommt aber auch frei heraus auf die niederen Zweige und ist nichts weniger als schüchtern. Ich habe ihn häufig zwischen den steifen Blättern der *Bromelia*-Pflanzen auf dem Boden bemerkt, dagegen hoch auf die Bäume steigt er nicht, hüpfst aber in den *Cipós* oder Schlingpflanzen umher. Er nährt sich von Insecten. Sein Nest fand ich, als ich mich zu *Barra de Judé* aufhieb, zwischen den steifen *Bromelia*-Blättern. Es ist klein und sehr nachlässig gebaut, von Moos, einigen Halmen und Federn, darin fand ich Ende Decembers zwei längliche Eier, auf schmutzig gelblichem Grunde olivengrün gefleckt, am stumpfen Ende mit einem Kranze von dicht gestellten Flecken. Im Affecte sträubt der männliche Vogel seine Scheitelfedern. Sie leben paarweise, und ausser der Paarzeit oft gemischt mit *Myiothraupen* und ähnlichen Vögeln in den grossen Urwäldern und dichten Gebüschern. Die Stimme dieser Art ist laut, aber nicht abwechselnd.

6. *T. palliatus*.

Der Batara mit rothbraunem Mantel.

B. Rücken, Flügel und Schwanz schön rothbraun; Hals, Kehle, Brust und übrige Untertheile weiß und schwarz queergestreift; Männchen mit schwarzem, Weibchen mit rothbraunem Scheitel.

Lenius palliatus, Illig., Licht.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel mittelmäßig stark, auf der Firste gerade, Haken mäßig stark, mit kleinem Zähnchen; Nasenloch länglich-elliptisch, frei; Kinnwinkel kurz und abgerundet, befiedert; Bartborsten und die des Kinnwinkels und der Nase sehr kurz; Federn des Scheitels ein wenig verlängert, können im Affecte aufgerichtet werden; Flügel kurz, erreichen kaum ein Dritttheil des Schwanzes, sind etwas abgerundet, die vierte und fünfte Feder am längsten; Schwanz ziemlich kurz, schwach, schmal, etwas abgestuft; Beine mäßig lang, mit fünf bis sechs Tafeln belegt, etwas über die Fußbeuge hinab befiedert. —

Färbung: Iris gelblich-weiß; Oberkiefer schwärzlich, am Kieferrande und am Unterkiefer bleifarben; Beine schön rein bleifarben; Scheitel schwarz; Nacken, Oberhals, Seiten des Kopfs und Halses, Kehle und alle übrigen Unter-

theile bis zum Schwanze weiß, schmal schwarz in die Queere gestreift; Rücken, Flügel und Schwanz sehr lebhaft rothbraun, nur die hinteren Fahnen der Schwungfedern zum Theile graubraun; die sehr dichten, langen, lockeren Federn des Unterrückens an der Wurzel aschgrau, an der Spitze graugelblich, mit dunkel grauen Queerstreifen; vorderer Flügelrand und innere Flügeldeckfedern blaß gelbröthlich, mit feinen schwärzlichen Queerwellen.

Ausmessung: Länge 6" 2''' — L. d. Schnabels 7''' — Breite d. Schn. (auf den Nasenlöchern) 2¼''' — Höhe d. Schn. 2½''' — L. d. Flügels 2" 6½''' — L. d. Schwanzes 2" 5''' — Höhe d. Ferse 10¼''' — L. d. Mittelzehe 5''' — L. d. äußeren Z. 4''' — L. d. inneren Z. 3⅔''' — L. d. Hinterzehe 3¼''' — L. d. Mittelnagels 2''' — L. d. äußeren N. 1⅔''' — L. d. Hinternagels 2½''' . —

Weibchen: Um zwei Linien kürzer als das Männchen. Es ist eben so gezeichnet, nur an Bauch und Steiß stark gelblich überlaufen, auch an den Seiten und im Nacken herrscht diese Farbe an der Stelle der weißen; Scheitel lebhaft rothbraun wie der Rücken.

Der schöne Vogel dieser Beschreibung gehört zu den gemeineren brasilianischen Arten,

und wird paarweise nicht bloß in den Wäldern, sondern auch in den Gebüschern in der Nähe der Wohnungen beobachtet. Er ist nicht schüchtern und ein stiller Vogel, hält sich gewöhnlich im dichtesten Gebüsch auf, doch sieht man ihn auch oft auf den freien Zweigen. Er hüpf von Ast zu Ast, sieht sich nach Insecten um, und läßt seinen sonderbaren Ruf hören, der hoch anfängt, und in kurz auf einander folgenden Tönen durch die Octave herabfällt, wodurch er mit der Stimme von Nro. 1. viel Aehnlichkeit hat; man kann den eben erwähnten Ruf auch bei dieser Species sehr genau in Noten ausdrücken, etwa auf folgende Art:



Er nistet in dichten Gebüschern, ich habe aber das Nest nicht finden können. — Durch ihre sonderbare Stimme und das nette Gefieder ist diese Species sehr kenntlich, und bei aller Aehnlichkeit der Färbung sind doch diese Vögel in beiden Geschlechtern, wie oben angegeben, sogleich zu unterscheiden.

Myioth. strictothorax: *Le Fourmiller*

Der Batara mit gefleckten Schläfen.

B. Oberkopf aschgrau (am Weibchen rothbraun) mit weissen Fleckchen vor und hinter dem Auge an den Seiten des Kopfs; Oberkörper olivengrau; Schulter aschgrau mit weissen Puncten; Kehle, Brust und Mitte des Bauchs blafs gelblich, die ersteren mit schwärzlich-grauen Fleckchen; Seiten olivengrau überlaufen; Weibchen an den Obertheilen fahl olivenbräunlich.

Myiothera strictothorax (Le Fourmiller Tâchet),
Temm. pl. col. 179.

Beschreibung des männlichen Vogels

Kopf dick, Schnabel dick und groß, Körper kurz und gedrungen, Schwanz und Beine mässig stark. — Schnabel gerade, stark, an der Wurzel breit, an den Seiten geradlinig, hinter der Spitze etwas zusammengedrückt; Haken stark, achblank, tritt zwei Dritttheil Linie weit über den geschlossenen Unterkiefer herab, ein kleiner Zahn hinter der Kuppe; Kinnwinkel nicht völlig die Hälfte der Schnabellänge, breit, vorn etwas abgerundet, an der Spitze sparsam befiedert, beinahe nackt; Dille vor dem Kinnwinkel heraustretend, sanft gewölbt aufsteigend; Nasenloch länglich-eiförmig, an seiner oberen und hinteren Seite von der gespannten Nasenhaut begrenzt, auf welcher die Nasenfedern etwas

vortreten; Kopf dick, Körper kurz und gedrun-
gen; Flügel mälsig lang, etwa die Hälfte des
Schwanzes erreichend, der an meinen Exem-
plaren wahrscheinlich nicht ganz ausgewachsen
war, kurz zugespitzt, die vierte und fünfte Fe-
der sind die längsten, die sechste ist nur höchst
wenig kürzer; Schwanz schmal, schwach, et-
was abgestuft; Beine mälsig hoch, schlank, die
Ferse mit sechs glatten Tafeln belegt, ihre Sohle
ebenfalls, aber die Tafeln kleiner; Hinternagel
viel grösser als die übrigen; zwei äussere Zehen
an der Wurzel ein wenig vereint.

Färbung: Schnabel nach der Spitze hin
schwärzlich, an der Wurzel blässer, am Unter-
kiefer gelblich; Beine bleifarbig; Scheitel und
ganzer Oberkopf aschgrau, am Zügel, den Na-
senfedern und hinter dem Auge an der Seite
des Hinterkopfs, so wie auf dem Ohre mit net-
ten weissen Fleckchen besetzt; Rücken und
übrige Obertheile olivengrau, an den dichten,
zarten und lockeren Federn des Unterrückens
blässer; Flügel schwärzlich - braun, an den
Deckfedern aschgrau überlaufen und mit netten
weisslichen Spitzen; Schwungfedern mit bläu-
lich-grauem Vordersaume und weisslichem Ran-
de an der Hinterfahne; innere Flügeldeckfedern
gelblich-weiß; Schwanz wie die Schwungfedern,

ohne weißlichen Rand; Kehle, Unterhals und Mitte der Brust blafs gelblich, mit schwärzlich-braunen Drosselfleckchen; Mitte des Bauches ungefleckt blafs gelblich; Seiten der Brust und des Bauches olivengrau.

Ausmessung: Länge 4" 10''' — Breite beinahe 7" 6''' — L. d. Schnabels $6\frac{1}{2}$ ''' — Br. d. Schn. $2\frac{1}{2}$ ''' — Höhe d. Schn. $2\frac{1}{5}$ ''' — L. d. Flügels 2" 2''' — L. d. Schwanzes beinahe 1" 6''' — Höhe d. Ferse $8\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelzehe 5''' — L. d. äufseren Z. $3\frac{1}{2}$ ''' — L. d. inneren Z. 2''' — L. d. Hinterzehe 3''' — L. d. Mittelnagels 2''' — L. d. äufseren N. $1\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{3}$ ''' —

Weibchen: So grofs als das Männchen; Scheitel rothbraun; Seiten des Kopfs grau, bräunlich gemischt, an den Schläfen mit einigen wenigen weifsen Fleckchen; Obertheile fahl schmutzig olivenbraun; Schultern dunkel graubraun, mit gelbbräunlichen Endfleckchen der grofsen Deckfedern; Kehle und Unterhals fahl rostgelblich mit kleinen dunkeln Fleckchen; Brust hell olivenbräunlich überlaufen, eben so die Seiten; hintere Ränder der Schwungfedern, die am Männchen weiflich sind, hier röthlichgelb. —

Dieser Vogel ist nicht häufig, er kommt

in den dunkeln Gebüsch und großen Waldungen des inneren Brasilien's vor, woher ihn Herr Professor Natterer sandte. Das in meiner Sammlung befindliche Paar stammt aus der Gegend von Nazareth das *Farinhas* bei Bahia. Die Abbildung in Temminck's Werk ist mittelmässig, sie ist viel zu schlank, Füsse und Iris unrichtig gefärbt, die Farbe der Obertheile zu lebhaft grün.

8. *T. guianensis*.

Der Batara mit rothbraunen Augenstreifen.

B. Kopf hell aschgrau, Scheitel röthlich-braun überlaufen; von der Nase über dem Auge hin ein röthlich-brauner Streifen; alle Obertheile mit Flügeln und Schwanz olivengrün. Brust gelb; Unterleib weisslich.

Tanagra guianensis, Linn., Gmel., Lath.

Le Verderoux, Buff.

Le Sourciloux, Levaill. ois. d'Afr. T. II, pag. 81.

Tab. 76. Fig. 2.

Lanius guianensis, Lichtenst. Verz.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel stark, sehr zusammengedrückt, beinahe scheibenförmig, nur an der Wurzel unter dem Nasenloche ein wenig ausgebreitet; Firste stark gewölbt herabgebogen, aber die Kuppe

nur sehr wenig über die der Oberkiefer herv
längert, und beinahe gar nicht herabtretend
mit einem kleinen Ausschnitte oder seichtem
Zähnen; Unterkiefer beinahe so hoch als der
obere, der Kinnwinkel stark vertieft, abgerun
det, sparsam befiedert; die Dille vor dem Kinn
winkel abgerundet, übrigens bis zur Spitze be
nahe eben so stark gewölbt aufsteigend, als die
Firste abfallend ist; Nasenloch rund, etwa auf
der Mitte der Oberkieferhöhe stehend, die Fe
dern treten bis dahin vor; Bartborsten über dem
Mundwinkel und Nasenloche; Zunge hornartig
gespitzt, halb so lang als der Schnabel, vorn
ein wenig gespalten; Gestalt des ganzen Vogels
plump und dick; die Flügel fallen etwas über
die Schwanzwurzel hinaus, die erste Feder ist
kurz, die fünfte die längste, die vierte und
sechste nur sehr wenig kürzer; Schwanz ziem
lich stark, die Federn nach der Spitze verschmä
lert, ziemlich gleich lang, geschlossen scheint
der Schwanz in der Mitte ein wenig ausgeran
det; Beine stark, mäßig hoch; Fußbeuge be
fiedert; Ferse mit sechs glatten Tafeln belegt;
äußere Zehen an der Wurzel vereint, Hinter
nagel groß und gebogen.

Färbung: Iris lebhaft hoch orangengelb;
Oberkiefer hell graubraun, Unterkiefer an der

in den dunkeln Gebüsch und großen Waldungen des inneren Brasilien's vor, woher ihn Herr Professor Natterer sandte. Das in meiner Sammlung befindliche Paar stammt aus der Gegend von Nazareth das Farinhas bei Bahid. Die Abbildung in Temminck's Werk ist mittelmässig, sie ist viel zu schlank, Füße und Iris unrichtig gefärbt, die Farbe der Obertheile zu lebhaft grün.

8. *T. guianensis*.

Der Batara mit rothbraunen Augenstreifen.
B. Kopf hell aschgrau, Scheitel röthlich-braun überlaufen; von der Nase über dem Auge hin ein röthlich-brauner Streifen; alle Obertheile mit Flügeln und Schwanz olivengrün; Brust gelb; Unterleib weißlich.

Tanagra guianensis, Linn., Gmel., Lath.

Le Verderoux, Buff.

Le Sourcroux, Levaill. ois. d'Afr. T. II, pag. 81.

Tab. 76, Fig. 2.

Lanius guianensis, Lichtenst. Verz.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel stark

nahe scheit

dem Nas

stark

nur sehr wenig über die des Oberkiefers verlängert, und beinahe gar nicht herabtretend, mit einem kleinen Ausschnitte oder seichten Zähnchen; Unterkiefer beinahe so hoch als der obere, der Kinnwinkel stark vertieft, abgerundet, sparsam befiedert; die Dille vor dem Kinnwinkel abgerundet, übrigens bis zur Spitze beinahe eben so stark gewölbt aufsteigend, als die Firste abfallend ist; Nasenloch rund, etwa auf der Mitte der Oberkieferhöhe stehend, die Federn treten bis dahin vor; Bartborsten über dem Mundwinkel und Nasenloche; Zunge hornartig gespitzt, halb so lang als der Schnabel, vorn ein wenig gespalten; Gestalt des ganzen Vogels plump und dick; die Flügel fallen etwas über die Schwanzwurzel hinaus, die erste Feder ist kurz, die fünfte die längste, die vierte und sechste nur sehr wenig kürzer; Schwanz ziemlich stark, die Federn nach der Spitze verschmälert, ziemlich gleich lang, geschlossen scheint der Schwanz in der Mitte ein wenig ausgeweitet; Beine stark, mälsig hoch, Fußhänge befiedert; Fersen sechs glatten Tellen belegt; Mittlere Zehen mit der Wurzel vereinigt, Hinter- und Vordere getrennt; Mittelfinger mit einem Haken. Die Kehle ist blass gelblich, die Brust und Unterbrust blass gelblich, die Kehle und Unterbrust blass gelblich, die Kehle und Unterbrust blass gelblich, die Kehle und Unterbrust blass gelblich.

dahinter, Nasenbücher rundlich, die etwas borstigen Federn laufen bis dahin vor; Kinnwinkel kurz, breit, abgerundet, mit borstig endenden Federn bedeckt; Dille stark rundlich gewölbt aufsteigend; Zunge kurz, mit getheilter Hornspitze, welche nicht bloß am Ende, sondern auch an dessen Seiten stark borstig gefranst ist; im Oberkiefer des Schnabels bemerkt man eine erhabene Leiste; Kopf dick, Körper schlank, Federn zart und weich; Flügel kurz abgerundet, reichen kaum über die Schwanzwurzel hinaus, die vierte und fünfte Feder sind die längsten; Schwanz stark, aus zwölf ziemlich schmalen, abgestuften Federn bestehend; Beine stark, mächtig hoch, Ferse mit sechs glatten Tafeln belegt, das Fußheugegelenk ist mit Federn bedeckt; Zehen ziemlich schwach, die beiden inneren an ihrem ganzen Wurzelgelenke verwachsen; Hinternagel ziemlich schwach, stark gewölbt.

Färbung: Iris dunkelbraun; Schnabel bleifarben, auf der Firste und an seinen obersten Theilen schwärzlich-hornfarben; Beine schön bleifarben, stark ins Himmelblaue ziehend; Augenlider blaß bläulich-grau, nur am Rande mit Wimperfederchen besetzt; Scheitel und alle oberen Theile glänzend schwarz, mit einem

schönen, eiförmigen, weissen Fleck auf jeder Feder, sie sind am Rücken am grössten, so wie auf Schultern und Deckfedern, wo sie aber mehr breit oder queer gestellt erscheinen; auf Kopf und Hals sind sie kleiner; Seiten des Kopfs weisgrau gemischt, Kehle noch etwas mehr weisslich, alle diese Federn mit zart zerschlissenen Fahnen; an den Seiten des Halses laufen die weissen Flecken auf schwarzem Grunde weit vor, eben so an den Seiten der Brust; diese so wie der Bauch graulich- Weiss, Seiten etwas mehr grau, After und Steiss etwas mehr in's Gelbliche fallend; Schwungfedern an der äusseren Fahne schwarz, mit weissen, schmalen Flecken, innere Fahne mehr graulich, und am hinteren Rande mit verloschenen weissen Flecken, innere Flügeldeckfedern weisslich; Schwanz bräunlich-schwarz, mit etwa neun schmalen, weissen Querbänden, die in der Mitte am Schaft unterbrochen sind; untere Fläche der Schwanzfedern matt aschgrau, mit verloschenen weisslichen Querbänden.

Ausmessung: Länge 7" 11" — Breite 9" 9" — L. d. Schnabels 10" — Br. d. Schn. 3½" — Höhe d. Schn. 3½" — L. d. Flügels 3" — L. d. Schwanzes etwa 3" 6" — Höhe d. Ferses 1" 1" — L. d. Mittelzehe 6½" — L. d.

äußeren Z. $4\frac{1}{2}'''$ — L. d. inneren Z. $3\frac{1}{2}'''$ —
L. d. Hinterzehe $3\frac{1}{2}'''$ — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{2}'''$
— L. d. äußeren N. $1\frac{2}{3}'''$ — L. d. hinteren N.
 $2\frac{1}{2}'''$. —

Weibchen: Dem beschriebenen Männchen vollkommen ähnlich, nur sind alle die hellen Flecke nicht weiß, sondern hell gelb, am lebhaftesten und dunkelsten auf den Schwungfedern und dem Kopfe; Stirn- und Nasenfedern gelblich-braun; im Nacken, Unterrücken und an den Seiten des Halses sind die Flecken am weißlichsten.

Ausmessung: Länge $7'' 8\frac{1}{2}'''$ — L. d. Schnabels $9'''$ — Höhe d. Ferse $11\frac{1}{2}'''$ — L. d. Mittelzehe $6'''$. —

Junges Männchen: Gänzlich dem Weibchen ähnlich, allein an der mehr, weißen Farbe des Unterleibes zu erkennen, welcher bei dem weiblichen Vogel stark gelblich überlaufen ist.

Dieser Vogel, so wie No. 1., bildet schon den Uebergang von den Batara's zu den ächten Würgern (*Lanius*), und der hier beschriebene hat schon beinahe den Körper- und Schnabelbau der letztern. — Er wird schon ziemlich weit südlich gefunden; denn Spix beobachte

te ihn in der Provinz *S. Paulo*, ich fand ihn bei *Araçatiba* und *Coroaba* am *Espirito Santo*, allein im Inneren des Landes, im Sertong der Provinzen *Minas* und *Bahia* kommt er häufiger vor. Er lebt einzeln oder paar- und familienweise, und ist ein träger, stiller Vogel. Ich habe ihn immer in den großen Wäldern gesehen. Seine Nahrung besteht in Insecten. *Spix* hat in seinen Abbildungen brasilianischer Vögel die Figur des Weibchens gegeben, vielleicht kannte er das Männchen nicht. Der Schnabel scheint in der Abbildung zu kurz gezeichnet zu seyn, und die Iris ist zinnoberroth gefärbt, welches in der Natur nicht der Fall ist.

Fam. XIV. Myiotheridae, Boi.

Ameisenvögel

Diese Familie vereinigt in den heißen Climates eine Menge von Vogelarten, deren Füße auf Kosten der Flügel ausgebildet sind. Sie sind schlechte Flieger, man sieht sie selten ihre Flugwerkzeuge gebrauchen, auch sind diese Theile bei ihnen meistens nur kurz und schwach; dagegen steht ihr Körper gewöhnlich auf hohen, schlanken Beinen, welche bei vielen von ihnen zu einer ausgezeichneten Höhe ausgedehnt sind. Sie leben meist in dichten, großen Urwäldern, viele von ihnen auf dem Boden umher laufend, wo sie Insecten aufsuchen, andere bewohnen die Zweige der niederen Bäume und Gesträuche, doch meistens der Erde nahe. Sie haben zum Theil sonderbare laute Stimmen, aber keinen Gesang. Einige von ihnen (*Myioturdus*) bilden einen natürlichen Uebergang zu den Dros-

sein (*Turdus*), mit welchen sie in Schnabelbau, Färbung und Manieren viel Übereinstimmung zeigen, durch den Mangel an Gesang, und andere vorhin erwähnte Eigenschaften aber wieder mehr Aehnlichkeit mit den eigentlichen Ameisenvögeln (*Myiothera*) haben. Andere schließen sich natürlich an die *Lani*, besonders das Geschlecht *Thamnophilus*, an, und wieder andere gränzen nahe an die Baumhacker (*Dendrocolaptes*) u. s. w. Die deutsche Benennung *Ameisenvögel*, welche ich dieser Familie beilege, ist hergebracht, obgleich nicht ganz eigentl. Indem diese Vögel sich nicht ausschließlich von Ameisen ernähren; da sie aber viel an der Erde umherlaufen, so fressen sie auch gewiss Ameisen, und die französische Benennung *Fourmilier* paßt wenigstens besser, als die deutsche, welche Illiger in seinem *Prodromus* giebt: *Fliegenjäger*.

Gen. 34. *Myioturdus* Boiei.

A m e i s e n d r o s s e l.

Schnabel: drosselartig, stark, messerförmig, an der Wurzel mälsig breit, nach vorn zusammengedrückt, mit einem kleinen Ausschnitte

oder Zahne hinter der saftig hinab gewölbten Kuppe; Firste kantig; Dille des Unterkiefers mehr oder weniger saftig aufsteigend. Nasenloch eiförmig, oder elliptisch, zuweilen frey meistens von den Federn bedeckt.

Zunge: mit hornartiger, vorn etwas getheilte oder borstiger Spitze.

Flügel: kurz und meist schwach, die vierte oder fünfte Feder ist die längste.

Schwanz: kurz.

Beine: hoch und schlank; Ferses anderthalb oder zweimal so lang als die Mittelzehe; äußere Zehen an der Wurzel vereint.

Diese originellen Bewohner der brasilianischen Urwälder halten sich meistens auf dem Boden auf, laufen sehr schnell, stehen dann plötzlich stille, und verschwinden schnell wieder. Sie haben meistens eine laute aus wenigen Tönen bestehende Stimme.

4. Ameisendröseln mit einem starken, hornlich zarten Schnabel, der etwas höher als breit ist, und mit Fersen, welche zweimal so lang sind als die Mittelzehe; Schwanz sehr kurz.

1. M. R e x.

Die grauköpfige Ameisendrösel.
4. Oberkopf aschgrau, Rücken olivenbraun, alle Federn desselben schwärzlich gerandet und mit gelblichen Schäften; Schwanz und Schwungfedern rothbraun; ein gelblich-weißer Streifen an jeder Seite des Kinnes; Untertheile bräunlich-gelb, die Ränder der Federn dunkel.

Turdus Rex, Linn., Gmel.

Le Roi des Fourmiliers, Buff., Sonn. Vol. 13. pag.

844.

Buff. pl. enl. N^o. 702.

Grallaria fusca, Vieill., Gal. d'ois. pl. 154.

Turdus grallaride, Lath.

Winn. botanisch.

Beschreibung des männlichen Vogels

Körper dick, rundlich, Kopf dick, Beine sehr hoch, Schwanz sehr kurz; Schnabel stark, etwas mehr als halb so lang als der Kopf; etwa so hoch als breit vor der Stirn, hinten etwas ausgebreitet, von seiner Mitte an ein wenig zusammengedrückt; Tomientänder hinter der Spitze ein wenig eingezogen; Firste etwas abgerundet kantig, stark gewölbt, die Kuppe et-

was über den Unterkiefer herabtretend, hinter derselben ein kleines Zähnrchen; Unterkiefer stark, hoch; Kinnwinkel beinahe halb so lang, breit, vorn abgerundet, an der Spitze beinahe nackt, mit einzelnen Borsten besetzt; Dille vor der Kinnwinkelspitze heraustretend, abgeflacht, nachher stark abgerundet und stark aufsteigend; Nasenhaut vertieft, an ihrer Wurzelhälfte mit vorstrebenden, kurzen Federn bedeckt, an ihrer Spitze steht das ziemlich weite, rundlich eiförmige, freie Nasenloch; Mundwinkel mit einigen etwa drei Linien langen Bartborsten besetzt; Zunge mälsig lang, vorn hornartig, an der Spitze nur sehr wenig getheilt; Kopf dick, Augenlider und ein Fleck hinter dem Auge nackt, der Rand des Augenlides befiedert; Flügel kurz, abgerundet, erreichen kaum die Mitte des sehr kurzen Schwänzchens, die erste Schwungfeder ist kurz, die vierte ist die längste, die fünfte nicht bedeutend kürzer; Schwanz aus zwölf kurzen, etwas abwärts gekrümmten, ziemlich gleich langen Federn bestehend; Beine sehr hoch und schlank, im Verhältniß zum Körper schwach, mit kurzen, schwachen Zehen; Schenkel lang und befiedert bis kurz über die Fußbeuge; Ferse etwas mehr als doppelt so lang als die Mittelzehe, mit zehn bis elf sehr glatten Tafeln be-

legt, Zehenrücken gefaltet; zwei äußere Zehen an ihren Wurzelgelenke verwachsen, äußere Zehe etwas länger als die innere, Hinternagel größer als die vorderen.

Farbung: Farbe der Beine blafs-röthlich-bleifarben; wodurch ein blasses Violet oder Lilas entsteht; Schnabel auf der Firste dunkel Horngraubraun, etwas in's Schwärzliche fallend, Ränder und Unterkiefer röthlich-weiß, bloß die Spitze schwärzlich; Iris graubraun; Scheitel, Hinterkopf und Nacken aschgrau, alle Federn mit schwärzlichen Rändern und feinen weißlichen Schäften und Schafstrichen; Rücken und Scapularfedern olivenbraun; alle Federn schwärzlich gerandet, und mit gelbröthlichen Schäften; obere Schwanzdeckfedern röthlich gelb; Flügeldeckfedern röthlich-olivenbraun; einige derselben mit gelbröthlichen Spitzenfleckchen; Schwungfedern schwarzbraun mit rostrother Vorderfahne und Hintersaume; Schwanz rostroth; Stirn gelblich überlaufen; Zügel, Nasenfedern und ein starker Streifen vom Unterkiefer an jeder Seite der Kehle hinab gelblich-weiß, die Federn des letzteren an seinem unteren Ende schwärzlich gerandet; Kehle schwärzlich-olivenbraun, röthlich gemischt; am Unterhalse stehen einige große

gelblich - weisse Flecken; Brust, olivenbraun mit schwärzlichen Federrändchen und gelblichen Fleckchen; Bauch, After, Schenkel und Steifs röthlich - gelbbraun, mit schwärzlichen Federrändchen oder dunkleren Querswellen; an Steifs und Schenkeln lebhaft röthlich - rostgelb und ungefleckt.

Ausmessung: Länge 7" 11" — L. d. Schnabels 9½" — Höhe d. Schn. 4½" — Br. d. Schn. 4" — L. d. Schwanzes 1" 10" — L. d. Flügels 4" 4½" — Höhe d. Farses 1" 11" — L. d. Mittelzehe 10½" — L. d. äusseren Z. 6" — L. d. inneren Z. 7" — L. d. Hinterzehe 5" — L. d. Mittelnagels 8" — L. d. äusseren N. 2" — L. d. Hinternagels 3½" —

Weibchen: Soll, nach Buffon, grösser seyn als das Männchen, welches ich aber nicht gefunden habe; denn das in meiner ornithologischen Sammlung befindliche Weibchen ist fünf Linien kürzer als das Männchen. Das erstere hat die Stirn mehr gelblich überlaufen, den hellen Streifen am Unterkiefer mehr weisse, die Flügel weniger lebhaft röthlich - braun, den Bauch, wie es scheint, auch etwas blässer rostgelb gefärbt.

Dieser sonderbare Vogel hält sich bloß in den geschlossenen grossen Waldungen auf, wo

er sehr schnell auf dem Boden umherläuft. Ich erhielt ihn zuerst am *Rio Grande de Belmonte*, wo einer meiner botocudischen Jäger ihn mit dem Pfeile erlegte. In seinem Magen fand ich Ueberreste von Insecten, besonders von grünen Käfern. Er soll einen lauten, einstimmigen Ruf haben. Nach der Versicherung der Botocuden, erbaut er sein Nest an der Erde, und legt blaugrüne Eier hinein. Ich habe diesen Vogel nur selten erhalten, sie scheinen nicht zahlreich zu seyn. Man erzählt von ihnen, daß sie sich einzeln zwischen den übrigen Ameisenvögeln aufhielten, und deshalb soll man sie in *Cayenne* *Roi des Fourmiliers* nennen, allein dieses ist eine Fabel, denn dieser Vogel lebt für sich allein. Ich habe übrigens nie Ameisen in seinem Magen gefunden. Buffon giebt (*pl. angl. Nro. 702.*) eine gute Abbildung dieser Species, wo Gestalt und Stellung sehr treu dargestellt, die Färbung weniger richtig, dennoch in der Hauptsache gut ist. Auge und Beine sind an dieser Abbildung gänzlich unrichtig colorirt. Wegen seiner etwas abweichenden Schnabelbildung hätte man den hier beschriebenen Vogel mit Recht zu einem besonderen *Genus* erheben können.

Ameisendrosseln mit schlankem, dem der *Amsel* (*Turdus Merula*) ähnlichem Schnabel, Ferse mehr als doppelt so lang als die Mittelzehe.

1898. *M. ochroleucus*.

Die Ameisendrossel mit weiß und gelbem Unterleib.

A. Obertheile bräunlich-olivengrau; Schwung- und große Flügeldeckfedern gelbröthlich-gerandet; gelblich-weißer, nach oben schwarze eingefasster Streifen über dem Auge; Untertheile weiß, Brust und Seiten mit dreieckigen, schwarzbraunen Flecken; Seiten der Brust und des Leibes stark gelbröthlich gemischt.

? *Turdus concretus*, Mas. Berol.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt etwa der vorhergehenden Art, allein der Schnabel dünn und schlank. — Schnabel gerade, schlank, ein wenig mehr hoch als breit, Firste mäßig-kantig, an der Kuppe sanft binab gewölbt, mit einem kleinen Zahne hinter der letzteren; Tomienrand des Oberkiefers stark eingezogen; Unterkiefer gerade, kaum merklich kürzer als der obere, die Dille nur höchst wenig aufsteigend, rundlich abgeflacht; Kinnwinkel ziemlich kurz, mäßig zugespitzt, an der Spitze beinahe nackt; Nasenloch weit geöffnet, länglich-elliptisch; Zunge halb so lang als der Schnabel, an der Spitze hornartig und ein wenig getheilt; Bart-

borsten am Zügel schwarz und ziemlich kurz; Auge lebhaft und ziemlich groß, Augenlid am Rande mit kleinen Federn dicht besetzt; Flügel etwas über die Mitte des kleinen, kurzen, vier-eckigen Schwänzchens hinaus reichend, ihre fünfte Feder ist die längste; Beine hoch und höchst schlank, der Schenkel tritt frei aus dem Leibe heraus; Ferse mit sieben bis acht zarten, glatten Tafeln belegt, mehr als doppelt so lang als die Mittelzehe, die Fersensohle ist gestieft; äußerste Vorderzehen an ihrem Wurzelgliede vereint, Zehen schlank; Hinternagel bei weitem größer als die übrigen, etwas aufgerichtet und nur sehr wenig gekrümmt.

Färbung: Oberkiefer horngraubraun, das untere röthlich-weiß; Iris graubraun; Beine blaß fleischroth; alle Obertheile des Vogels sind bräunlich-olivengrau; Schwungfedern graubraun, am Vorderrande der Vorderfahne hell röthlich-gelb, näher am Schaft olivengrau wie der Rücken, hinterer Saum und die Wurzel der inneren Fahne hell gelb; innere Flügeldeckfedern hell gelbröthlich; große Flügeldeckfedern mit röthlich-gelben Rändern; von der Nase über dem Auge hin zieht nach dem Hinterkopfe ein blaß gelblicher Streifen, der nach dem Oberkopfe hin, also an seiner Oberseite,

schwarz eingefasst ist; Kehle und Unterhals weiß; Seiten des Kopfs gelblich, diese Farbe ist aber von der weissen Kehle durch einen herabziehenden, schwarz gestrichelten Streifen getrennt; alle übrigen Untertheile sind weiß, stark rostgelb gemischt und gestrichelt, dabei aber an Brust und Seiten des Leibes mit rundlichen und dreieckigen schwarzbraunen Drosselflecken besetzt; Aftergegend gelb, Steiß weiß.

Ausmessung: Länge 5" $8\frac{1}{2}$ " — Breite 8" 8" — L. d. Schnabels $7\frac{1}{4}$ " — Br. d. Schn. 2" — Höhe d. Schn. 2" — L. d. Flügels 2" 11" — L. d. Schwanzes 1" 6" — Höhe d. Ferse 1" $5\frac{1}{2}$ " — L. d. Mittelzehe 7" — L. d. äußeren Z. 5" — L. d. inneren Z. $4\frac{1}{3}$ " — L. d. Hinterzehe 4" — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{4}$ " — L. d. äußeren N. $1\frac{2}{3}$ " — L. d. Hinternagels 8".

Dieser Vogel ist mir nur einmal vorgekommen, und zwar in den Wäldern der inneren Provinz *Bahia*, in der Nähe des *Arraial da Conquista*. Er hat einenlei Lebensart mit der vorhergehenden Species, läuft sehr schnell an der Erde umher, und sucht Insecten auf. Am den Provinzen *S. Paulo* und *Minas Geraes* haben mehrere Museen diesen Vogel erhalten, er scheint dort nicht selten zu seyn.

C. Ameisendrosseln, deren Schnabel gebildet ist, wie an unserer Amsel (Turdus Merula), die Ferse zweimal so lang als die Mittelzehe.

3. *M. marginatus.*

Die gerandete Ameisendrossel.

A. Obertheile olivenbraun, Schwanz mälsig kurz, dessen Federn mit schwarzbrauner Endbinde, und zum Theil weislichem Spitzensaume; Stirn röthlich überlaufen; Untertheile weiß, alle Federn der Brust und der Seiten mit sehr starkem, schwarzbraunem Seitenrande.

Myiothra campanisona, Illig.

Beschreibung des weiblichen Vogels: Gröfse einer starken Singdrossel (*Turdus musticus*), Schwanz länger als an den vorhergehenden Arten; die Beine kürzer, daher hat dieser Vogel am meisten Aehnlichkeit mit den wahren Drosseln (*Turdus*). — Schnabel ziemlich kurz, gerade, mälsig stark, an der Wurzel ein wenig ausgebreitet, am Vordertheile ein wenig zusammengedrückt, Tornieränder ein wenig eingezogen, beide Kiefer ziemlich gleich lang, hinter der Kuppe des oberen ein kleines Zähnchen; Firste mälsig zusammendrückt; Nasenhaut mit vorwärts strebenden Federn besetzt; Kinnwinkel mehr als ein Dritttheil der Unterkieferlänge, breit, abgerundet, sparsam mit kur-

zen Federn bedeckt; Dille an der Wurzel abgeflächt, nach der Spitze hin abgerundet, mälsig aufsteigend; Zunge kaum halb so lang als der Schnabel, länglich schmal, hornartig, flach, an der Spitze gefranst oder borstig; Flügel kurz, abgerundet und schwach, die vierte Schwungfeder ist die längste; Schwanz ziemlich kurz, etwas abgestuft, abgerundet und häufig am Ende abgenutzt, die Flügel erreichen kaum seine Mitte; Beine ziemlich hoch, Ferse gerade doppelt so lang als die Mittelzehe, mit acht sehr glatten und beinahe gänzlich in einander verwachsenen Tafeln belegt, Laufsohle sehr glatt; Zehen ziemlich kurz, getäfelt; Nägel schwach, der hinterste aufgerichtet und gröfser als die übrigen, dabei etwas gewölbt; äufsere Zehen an der Wurzel etwas vereint, die äufserste und innerste in der Länge wenig verschieden.

Färbung: Iris graubraun; Oberkiefer auf der Firste horngraubraun, an den Rändern und dem Unterkiefer weifslich - hornfarben; Beine röthlich - weifs; Rachen weifslich; alle Obertheile grünlich - olivenbraun, auf Scheitel und Stirn röthlich - braun überlaufen; über dem Auge hin läuft eine gelblich - weisse Linie, die an der Nase mehr gelblich ist; Kehle gelblich - weifs, auf jeder Seite in der weifslichen Farbe mit

einem schwarzbraunen Längsstreifen eingefasst; Unterhals und Kehle auf weißlicher Grundfarbe fein schwärzlich punctartig gestrichelt; Anfang des Unterhalses, Brust und Seiten des Körpers weißlich-gelb, allein alle Federn an jeder Seite mit einem netten, starken, schwarzen Saume bezeichnet; die Seitenfedern des Bauchs und der Brust haben sogar die ganze innere Fahne schwarz, wodurch eine stark geschuppte Zeichnung entsteht; Mitte des Bauchs und After ungefleckt gelblich-weiß; Steiß mehr gelblich, und einzeln schwärzlich gefleckt; Schwanzfedern olivenbraun, mit einer schwarzen Queerbinde am Ende, aber die Spitze jeder Feder, die beiden mittleren ausgenommen, hat außerdem noch ein weißliches Rändchen; Schwungfedern dunkel schwärzlich-graubraun; innere Flügeldeckfedern weiß, am Rande schwärzlich.

Ausmessung: Länge 8" 8''' — Breite 12" 5''' — L. d. Schnabels $7\frac{2}{3}$ ''' — Höhe d. Schn. $2\frac{2}{5}$ ''' — Br. d. Schn. $2\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Flügels 3" 7 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Schwanzes etwa 2" 8''' — Höhe der Ferse 1" 4 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelzehe $8\frac{1}{3}$ ''' — L. d. äußeren Z. $6\frac{1}{4}$ ''' — L. d. inneren Z. $6\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Hinterzehe $4\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelnagels $2\frac{3}{4}$ ''' — L. d. äußeren N. 2''' — L. d. Hinternagels $3\frac{2}{3}$ ''' —

Jüngerer Weibchen: Von dem älteren nur sehr wenig abweichend.

Dieser Vogel lebt in den großen Waldungen, ich erhielt ihn in der Nähe von *Arrayal da Conquista*. Er hält sich an der Erde oder auf niederen Zweigen auf, und bewegt häufig seinen Schwanz auf und ab. Seine Manieren sind etwa die unserer Singdrossel. Eine Stimme haben wir von ihm nicht vernommen. In seinem Magen Ueberreste von Insecten.

D. Ameisendrosseln, deren Schnabel an der Wurzel etwas breit ist, und deren Ferse nicht die doppelte Länge der Mittelzehe erreicht.

4. *M. Tetema*.

Die rostscheitliche Ameisendrossel.

A. Oberkopf rostroth; Obertheile olivenbraun; Untertheile schwärzlich-olivengrün; Kehle, Unterhals und Brust schwärzlich.

Turdus Colma var., Linn., Gmel., Lath.

Le Tetema, Buff., Sonn. Vol. 13. pag. 355.

Buff. pl. enl. No. 821.

Myiothera Tetema, Vieill.

— *ruficeps*, Spix Tab. 72. Fig. 1.

Galinha do mato in den meisten Gegenden des östlichen Brasiliens.

Apnaio *) hotocudisch.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Größe eines Staares, Beine nur mäßig hoch, Schwanz mäßig kurz. Schnabel stark, gerade, kürzer als der Kopf, an der Wurzel ziemlich breit, vor der Spitze ein wenig zusammengedrückt, die Tomien daselbst stark eingezogen; Firste kantig, gerade, bloß an der Spitze ein wenig herabgeneigt, ein sehr kleiner Ausschnitt hinter der Kuppe; beide Kiefer etwa gleich lang, die Dille des unteren ein wenig kantig und stark aufsteigend, sie tritt an der Spitze des Kinnwinkels stark hervor; dieser erreicht beinahe die halbe Schnabellänge, ist etwas abgerundet, beinahe nackt; unter der Nasenhaut tritt der Schnabel mit einer starken Leiste vor; Nasenloch eiförmig, an seiner oberen Seite von der Haut bedeckt; Zunge ziemlich kurz, an der Spitze ein wenig getheilt; Augenlid ziemlich nackt, sein Rand mit Federn besetzt; Flügel kurz, sie fallen wenig über die Schwanzwurzel hinaus, die fünfte Feder ist die längste; Schwanz abgestuft, abgerundet, die Federn mäßig zugespitzt, er ist weniger kurz als an den

*) Etwas durch die Nase auszusprechen.

beiden zuerst beschriebenen Ameisendrosseln; Beine stark, mäßig hoch, die Ferse nicht völlig zweimal so lang als die Mittelzehe, mit sieben glatten Tafeln belegt, auch die Sohle der Ferse ist getäfelt, so wie der Zehenrücken; äussere Vorderzehen auf die halbe Länge des Wurzelgelenkes verwachsen; Hinternagel weit grösser als der mittlere, und dabei beinahe spornartig gestreckt, wie an den Lerchen.

Färbung: Iris graubraun; Beine fleischröthlich-aschgrau; Schnabel schwarz; Stirn, Scheitel und Nacken lebhaft rostroth; Zügel, Seiten des Kopfs, Kinn, Kehle, Brust schwärzlich, nach dem Bauche hin in dunkel aschgrau übergehend, aber an Seiten, Schenkeln, After und Steifs olivenbraun überlaufen; übrige Obertheile dunkel olivenbraun; Schwungfedern schwärzlich - olivenbraun überlaufen, an der Wurzel sind sie alle rostgelb, wodurch bei geöffnetem Flügel eine Queerbinde sichtbar wird; vorderer Flügelrand mit einigen rostgelben Federn; Schwanzfedern am Schafte und an der Spitze schwärzlich, übrigens schwärzlich und olivenbraun überlaufen.

Ausmessung: Länge 7" 6'" — Breite 11" 2'" — L. d. Schnabels $7\frac{1}{3}$ " — Br. d. Schn. $2\frac{1}{2}$ " — Höhe d. Schn. $2\frac{1}{4}$ " — L. d. Flügels 3" $2\frac{1}{4}$ "

— L. d. Schwanzes etwas über $2'' 6'''$ — Höhe d. Ferse $1'' \frac{2}{3}'''$ — L. d. Mittelzehe $7\frac{1}{3}'''$ — L. d. äußeren Z. $5\frac{3}{4}'''$ — L. d. inneren Z. $5\frac{2}{3}'''$ — L. d. Hinterzehe $3\frac{3}{4}'''$ — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{4}'''$ — L. d. Hinternagels $3\frac{4}{5}'''$. —

Weibchen: Von dem Männchen nicht bedeutend verschieden.

Junger Vogel: Der Kopf ist in der Jugend oben über schwärzlich-braun; denn ich besitze mehrere solche Vögel, die an diesem Theile rothbraun und schwärzlich gefleckt sind.

Völlig junger Vogel in seinem Nestkleide: Ein solcher Vogel in meiner Sammlung hat einen kurzen Schnabel mit dicker Spitze; ganzes Gefieder noch dunenartig weich, an allen Obertheilen schwarzbraun mit rostgelb punctirten Federrändern, an allen Untertheilen grauröthlich-fahl, am Bauche weißlich, überall mit feinen, schwarzgrauen, verloschenen Wellenlinien bogig durchzogen; große Flügeldeckfedern mit rostrothen Spitzen.

Dieser Vogel lebt in den großen Urwäldern der von mir bereis'ten Gegenden, und ist nicht selten. Er läuft auf dem Boden umher, hüpf't auch wohl auf niederen Zweigen, bewegt den Schwanz auf und ab, und sucht Insecten auf. Am *Mucuri* und in andern Gegenden nennt

man ihn *Gallinia do mato* (Waldhuhn). Sein Nestbau ist mir nicht bekannt geworden. Eine Stimme habe ich selbst von ihm nicht gehört, der Versicherung der Bewohner zu Folge, soll sie ein ziemlich hoher Pfiff seyn.

Buffon und *Sonnini*, und nach ihnen mehrere Naturforscher, haben diese Species als eine Varietät des *Turdus Colma*, *Gmel.*, *Lath.*, angesehen, allein letzterer Vogel ist mir in Brasilien nie vorgekommen, dagegen desto häufiger *Buffon's Tetema*, ein Beweis, daß beide Arten verschieden sind. *Buffon* bildet diesen Vogel ziemlich gut ab, doch ist die Stellung nicht besonders natürlich. Er lebt auch in *Cayenne*, wo man ihn *Tetema* nennen soll, scheint also über einen großen Theil von Süd-america verbreitet. — Die *Spix'sche* Abbildung ist weit schlechter als die des *Buffon*, auch sitzt der Vogel höchst unnatürlich auf dem viel zu dünnen Aestchen.

5. *M. perspicillatus*.

Die rotscheitliche Ameisendrossel mit weißer Kehle.

A. Scheitel rothbraun, durch die Augen ein breites schwarzes Feld; Kehle weiß; Obertheile graulich-

- olivenbraun; Brust, Oberbauch und Seiten aschgrau; Mitte des Bauchs weiß.

Myiosthera perspicillata, Illig.

Quidnang botocudisoh.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schwanz sehr kurz, Beine hoch, Schnabel dick und breit, wenig zusammengedrückt, kurz, auf der Firste ziemlich abgerundet, an der Kuppe herabgebogen, mit nur sehr schwachem Ausschnitte dahinter; Kinnwinkel etwa ein Drittheil der Schnabellänge, abgerundet, mit borstig endenden, vorwärts strebenden Federn bedeckt; Dille an der Wurzel abgeflacht, sanft aufsteigend, an ihrem Vordertheile etwas kantig; kleine Bartborsten am Mundwinkel; Nasenloch eiförmig, am oberen Theile mit einer Haut bedeckt, die Federn treten bis dahin vor; Zunge halb so lang als der Schnabel, mit hornartiger, vorn ein wenig getheilte Spitze; Flügel abgerundet, sie reichen bis zur Spitze des Schwanzes, die vierte Feder ist die längste; Schwanz kurz, breit, viereckig, mit gleich langen Federn; Beine ziemlich hoch und stark, Ferse mit sechs glatten Tafeln belegt, andert-halbmal so lang als die Mittelzehe; zwei äußerere Zehen an der Wurzel ein wenig vereint, die äußerste länger als die innerste; Hinternagel

am grölsesten, gewölbt und ein wenig aufgerichtet.

Färbung: Iris graubraun; Oberschnabel schwarzbraun, der untere etwas blässer; Beine weißlich-bleifarben; Stirn, Scheitel, Hinterkopf und Nacken lebhaft rothbraun oder rostroth; Nasenfedern und ein breites Feld durch die Augen, welches die ganze Seite des Kopfs bedeckt, dunkel schwarz; Kehle und Kinn weiß; Untertheil des Unterhalses, Brust, Seiten und Oberbauch ziemlich dunkel aschgrau; Mitte des Bauchs, After und Steifs weiß; alle Obertheile graulich-olivengraun, bei jüngeren Vögeln schwarz gefleckt und gerandet; Flügeldeckfedern etwas röthlich-olivengraun; Schwungfedern und Schwanz graubraun, mit olivengrauem Außenrande.

Ausmessung: Länge $4'' 1\frac{1}{3}'''$ — Breite $7'' 10'''$ — L. d. Schnabels $5\frac{1}{4}'''$ — Br. d. Schn. $2\frac{4}{5}'''$ — Höhe d. Schn. $1\frac{5}{8}'''$ — L. d. Flügels $2'' 5\frac{1}{2}'''$ — L. d. Schwanzes $1'' 2$ bis $3'''$ — Höhe d. Ferse $1''$ — L. d. Mittelzehe $7\frac{1}{2}'''$ — L. d. äußeren Z. $5\frac{1}{2}'''$ — L. d. inneren Z. $4'''$ — L. d. Hinterzehe $4\frac{1}{3}'''$ — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{2}'''$ — L. d. äußeren N. $1\frac{3}{4}'''$ — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{4}'''$.

Weibchen: Ein wenig kleiner als der männliche Vogel; Obertheile hell olivengraun, Schei-

tel rothbraun überlaufen; über dem Auge nach dem Hinterkopfe zieht eine weiße Linie, durch das Auge ein dunkelbraunes Feld; Kehle weiß, gelblich überlaufen; Untertheile weißlich-gelb, die Brust dunkler rostgelb; Flügel olivenbräunlich, allein die großen Deckfedern mit gelblichen Spitzenfleckchen.

Dieser niedliche kleine Vogel hüpfte in den dichten Gebüsch der großen Waldungen nahe an der Erde, oder läuft im dunkeln Schatten auf dem Boden umher. Ich erhielt ihn zuerst am Flusse *Itabapuana* in der Nähe der *Fazenda* von *Muribeca*, am *Belmonte* und *Mucuri*. war er im Urwalde nicht selten. — Mehr als eine kurze Lockstimme haben meine Jäger nie von ihm vernommen. Er nistet etwa drei Fuß hoch von der Erde, baut ein oben offenes Nest, in welchem man drei punctirte Eier fand.

Gen. 35. Myiagrus Boiei.

Ameisenschnäpper.

Schnabel: kürzer als der Kopf, breiter als hoch, Firste sanft kantig, an der Spitze hinab gewölbt, mit kleinem Häkchen oder Zahne hinter der Kuppe; Seitenrand des Schnabels vor der zusammengedrückten Kuppe bogig austre-

tend; *Nasenloch* eiförmig, von den Federn beinahe gänzlich bedeckt; Kinnwinkel groß; Dille vor demselben heraustretend, etwas kantig sanft gewölbt aufsteigend. *Bartborsten* am Mundwinkel.

Zunge: an der Spitze hornartig, verschmälert, mit mehreren Einschnitten.

Flügel: erreichen beinahe die Mitte des Schwanzes, die dritte Schwungfeder scheint die längste.

Schwanz: kurz, schmal und weich.

Beine: hoch; Ferse beinahe doppelt so lang als die Mittelzehe; zwei äußere Zehen an der Wurzel ein wenig vereint.

Der von mir für dieses Geschlecht zu beschreibende Vogel steht in Hinsicht seiner Gestalt zwischen *Muscicapa* und *Myiothera* in der Mitte; von den ersteren hat er den Schnabel, von den letzteren Gestalt und Lebensart. Ich habe nur eine Art kennen gelernt.

1. *M. lineatus*.

Der Ameisenschnäpper mit grauem Schläfenstreifen.

A. Oberkörper olivenbraun; Kinn, Kehle und Oberbrust gelbroth; Unterbrust und Bauch weißlich, Seiten dieser Theile fahl olivenbraun überlaufen.

Carumango im Sertong der Provinz Bahia.

Beschreibung des weiblichen Vogels: Körper rund und dick, mit sehr zarten, weichen Federn, Schnabel ziemlich kurz und breit, Schwanz sehr kurz, Ferse hoch. — Schnabel kurz, plattgedrückt, etwa doppelt so breit als hoch, an den Seiten bogig austretend, die sanft über gekrümmte Kuppe zusammengedrückt, und mit einem kleinen Ausschnitte versehen; Nasenloch klein, länglich-rund, am vorderen Ende der Nasenhaut, zum Theil von den Nasenfedern bedeckt; Unterkiefer flach, Kinnwinkel beinahe halb von der Länge desselben, abgerundet, vorn ziemlich nackt, mit vorstrebenden, in Borstspitzen endenden Federn bedeckt; Dille vor der Kinnwinkelspitze etwas rundlich austretend, sehr sanft aufsteigend; Bartborsten am Zügel über dem Mundwinkel nicht besonders stark; Zunge halb so lang als der Schnabel, nach der hornartigen Spitze hin verschmälert und mit etwa vier kleinen Einschnitten; die Flügel sind mäßig stark, mäßig abgerundet, erreichen beinahe die Mitte des kurzen Schwanzes, die dritte Feder scheint die längste, sie waren an dem beschriebenen Exemplare nicht alle völlig ausgewachsen; Schwanz kurz und schmal, aus weichen nach unten gekrümmten Federchen gebil-

det; sie waren nicht alle ausgewachsen, doch scheinen die äusseren ein wenig länger als die mittleren; Beine schlank und ziemlich hoch; Ferse etwa mit sechs glatten Tafeln belegt, etwa doppelt so lang als die Mittelzehe; äussere Zehen an der Wurzel vereint, der Hinternagel gröfser und stärker als die übrigen.

Färbung: Rachen hell orangengelb; Oberkiefer schwärzlich-hornbraun, Unterkiefer röthlich-weiß; Iris gelblich-braun; Beine blaß bräunlich-grau; alle Obertheile olivenbraun, unmittelbar über dem Auge etwas röthlich-gelb, allein vom vorderen Theile des Auges läuft über dem Ohre weg nach dem Hinterkopfe ein rein bläulich-aschgrauer Streifen; Backen, Kinn, Seiten der Kehle, Oberbrust und Unterhals schön sanft gelbröthlich; an der Mitte der Kehle sind die Federn bloß an der Spitze gelbröthlich, und an ihrer Wurzel weiß; Brust und Mitte des Bauches weißlich, an den Seiten des Leibes, den Schenkeln und der Aftergegend blaß bräunlich-olivengrau überlaufen; große Flügeldeck- und Schwungfedern blaß oliven-graubraun, am Vorderrande mehr in's Gelbröthliche fallend, eben so an den Spitzenrändern der Schwungfedern; Schwanz etwas röthlich überlaufen; innere Flügeldeckfedern weiß, am Flügelrande bräunlich wie der Rücken.

Ausmessung: Länge 5" 1''' — Breite 8" 3'''
 — L. d. Schnabels $4\frac{1}{3}$ ''' — Br. d. Schn. $2\frac{2}{3}$ ''' —
 Höhe d. Schn. $1\frac{2}{5}$ ''' — L. d. Flügels 2" 8½''' —
 L. d. Schwanzes nicht völlig 1" 4''' — Höhe d.
 Ferse 1" — L. d. Mittelzehe $5\frac{2}{3}$ ''' — L. d. äus-
 seren Z. $4\frac{2}{5}$ ''' — L. d. inneren Z. $3\frac{1}{5}$ ''' — L.
 d. Hinterzehe $3\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Mittelnagels 2''' —
 L. d. äußeren N. $1\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinternagels
 $2\frac{1}{2}$ ''' . —

Dieser Vogel ist mir nur einmal vorgekom-
 men, er scheint daher in jener Gegend nicht
 häufig zu seyn. Ich erhielt das in meiner Samm-
 lung befindliche Exemplar in der Gegend des
Arrayal da Conquista im Sertong der Provinz
Bahia, wo es erlegt wurde, während es sich
 im Walde unter dichten Gebüsch aufhielt. —
 Man nennt diesen Vogel in jener Gegend *Curu-*
manço. In Lebensart und Gestalt gleicht er
 den Ameisendrosseln (*Myioturdus*), allein sein
 Schnabel ist der mancher breitschnäbligen Flie-
 genfänger.

Gen. 36. Myiothera, Illig.

A m e i s e n v o g e l .

Dieses von *Illiger* zuerst aufgestellte Ge-
 schlecht nehme ich, wie *Temminck* in seinem

Manuel d'ornithologie, ziehe aber davon einige Vögel ab, wodurch mir etwa folgende Charactere übrig bleiben:

Schnabel: gerade, gestreckt, stark, mälsig breit, Firste kantig, an der Spitze ein wenig über den Unterkiefer hinabgebogen, ein kleiner Ausschnitt hinter der Kuppe; *Nasenloch* basal, lateral, meistens durch eine kleine Haut oder Hautschuppe halb geschlossen; Unterkiefer gerade, kegelförmig, die Dille etwas aufsteigend. *Bartborsten* fehlen oft gänzlich, jedoch nicht immer.

Zunge: gewöhnlich halb so lang als der Schnabel oder etwas mehr, vorn hornartig und ein wenig gespalten oder gefrants't, oft beides zugleich.

Flügel: kurz, meist schwach, abgerundet, die vierte, fünfte oder sechste Feder die längste.

Schwanz: mälsig lang, zuweilen lang, abgestuft und abgerundet.

Beine: hoch und schlank oder mittelmälsig, äußere Zehen an der Wurzel etwas verwachsen. —

Das Geschlecht der Ameisenvögel ist zahlreich an Arten und Individuen in den brasilianischen Wäldern, und enthält meist mit wenigen, einfachen Farben bezeichnete Vögel, die

großentheils in den dichten Waldungen und Gebüschten wohnen, theils im trockenen Laube auf dem Boden umherlaufend, theils auf den niederen Zweigen hüpfend. Sie haben meist schwache Flügel, daher wenig Flug, hohe Fersen, ihre Gehwerkzeuge sind vor den Flugwerkzeugen ausgebildet. Die Federn ihres Unterrückens sind lang, sehr dicht, zart, locker und daunenartig. Sie haben keinen Gesang, oft aber laute, sonderbare Stimmen, die ihnen indessen auch häufig fehlen. Alle nähren sich von Insecten, obgleich wohl schwerlich allein von Ameisen.

A. Ameisenvögel mit gewölbtem Nagel der Hinterzehe.

1. *M. rhynolopha.*

Der Ameisenvogel mit aufgerichtetem Nasenbusche.

A. Auf der Nase aufgerichtete steife zerschlissene Federn; Obertheile dunkel braun, an Flügeln und Schwanz schwärzlich-braun; Kehle und Brust rothbraun; Bauch und Aftergegend dunkel braun, röthlich gewellt.

Beschreibung des weiblichen Vogels: Gestalt ziemlich die einer Drossel, Flügel kurz, Schwanz mäfsig lang, Fersen hoch. Schnabel

ziemlich stark, dick und hoch, zusammengedrückt, gerade, die Firste kantig, Kuppe nur höchst sanft hinab gewölbt, der Oberkiefer nur sehr wenig länger als der untere, ein kleiner Ausschnitt hinter der Kuppe; Kinnwinkel mehr als halb so lang als der Unterkiefer, etwas zugespitzt, kurz, befiedert; Dille mälsig stark kantig, vor der Kinnwinkelspitze ein wenig her-austretend und alsdann sanft rundlich gewölbt aufsteigend; Nasenloch von den vorstrebenden, steifen, zerschlissenen Nasenfedern bedeckt, es ist seiner ganzen Länge nach mit einer gewölbten Hautschuppe bedeckt; Zunge etwas mehr als halb so lang als der Schnabel, an der Spitze ein wenig gespalten; die geschlossene Spaltlinie der Augenlider steht nicht horizontal, sondern etwas schief, wodurch dieser Vogel, wie auch in seinem Schnabel-, Schwanz- und Flügelbaue Verwandtschaft mit *Anabates* verräth, wenn nicht der Zahn der Schnabelkuppe und die Lebensart ihn wieder davon entfernten. Der Hauptcharacter des Vogels besteht in den Nasenfedern, welche steif, aufgerichtet, und an jeder Seite zwei bis drei Linien hoch über die Stirn hinaufragen, etwa wie am *Çariama* (*Dicholophus cristatus*, Illig.); sie haben zerschlissene von einander entfernte Bärte; übriges Ge-

fieder zart, weich und anliegend; ~~Füße~~ ^{Beine} und abgerundet, reichen kaum über die ~~Schwanz~~ ^{Bein} wurzel hinaus, die dritte Feder ist die ~~längste~~ ^{mittlere}, sie sind sämmtlich einander ziemlich ~~gleich~~ ^{gleich}, Schwanz mälsig lang, aus zwölf zarten, ~~weichen~~ ^{weichen} Federn zusammengesetzt, nur wenig abgestuft; Beine hoch und sehr stark; Ferse kaum ein Dritttheil länger als die lange, starke Mittelzehe, alle Zehen lang und dick; die äusseren an der Wurzel ein wenig vereint, die äußerste Vorderzehe ein wenig länger als die innerste; Hinternagel etwas gestreckt und viel gröfser als die übrigen.

Färbung: Iris graubraun; Beine dunkel graubraun; Oberkiefer schwärzlich-braun, der untere hell röthlich-grau; alle Obertheile des Vogels schwärzlich-olivengraun, am Rücken und dem vorderen Schwungfedersaume röthlich-braun leicht überlaufen; Schwanz und innere Fahne der Schwungfedern schwärzlich-braun; Gegend von der Nase über dem Auge hin, Backen, Brust, Unterhals lebhaft rostroth, an den Seiten des Halses geht diese Farbe allmählig in das Olivenbraun der Obertheile über; Brust an den rostrothen Federn mit sehr fein dunkler punctirten Rändchen, die auch an der Kehle vorhanden, aber kaum zu bemerken sind; übrige

ge Untertheile dunkelbraun, alle Federn mit rostrothen Spitzen, wodurch diese Theile rothbraun gewellt erscheinen; an Seiten, Schenkeln und After zeigt sich weniger von der rothbraunen Farbe; innere Flügeldeckfedern röströthlich. —

Ausmessung: Länge 7" 9^{'''} — Breite 8" 11^{'''} — L. d. Schnabels 8 $\frac{1}{2}$ " — Höhe d. Ferse 1" 1 $\frac{1}{5}$ " —

Männchen: Von dem weiblichen Vogel scheinbar nicht verschieden. Seine Ausmessung ist in einigen Theilen etwa folgende. Länge ungefähr wie am Weibchen, nur wenig größer.

Ausmessung: Länge d. Schnabels (bis zur Stirn gemessen) 8 $\frac{1}{3}$ " — Höhe d. Schn. 2" — Breite d. Schn. 1 $\frac{3}{4}$ " — L. d. Flügels 2" 7 $\frac{2}{3}$ " — L. d. Schwanzes 2" 9 $\frac{1}{2}$ " — Höhe d. Ferse 1" $\frac{3}{4}$ " — L. d. Mittelzehe 10" — L. d. äußeren Z. 6" — L. d. inneren Z. 5 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinterzehe 5 $\frac{1}{3}$ " — L. d. Mittelnagels 2 $\frac{4}{5}$ " — L. d. äußeren N. 2 $\frac{1}{5}$ " — L. d. Hinternagels 4".

Dieser Vogel lebt in dichten dunkeln Urwaldungen meist auf dem Boden, wo er gewandt umherläuft und nach Insecten sucht. Ich erhielt ihn zuerst in den Wäldern der Botoctuden am Flusse *Belmonte*. Er scheint nicht besonders häufig vorzukommen. Einige Orni-

thologen haben die Species zu *Anabates* zählen wollen, mit welcher sie in der Färbung verwandt ist; allein ihre Lebensart und Manieren passen durchaus nicht dorthin.

2. *M. ardesiaca*, Licht.

Der schwarzkehlige Ameisenvogel.

A. Ganzer Körper schön aschgrau; Kehle schwarz; Flügel und Schwanz schwärzlich; Flügeldeckfedern mit weißem Spitzensaume.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Schnabel gerade, nur wenig kürzer als der Kopf, nach vorn zusammengedrückt, an der Wurzel ein wenig ausgebreitet; Firste mälsig scharfkantig, Kuppe nur sehr sanft herabgebogen, das Häkchen kaum über den Unterkiefer herabtretend, mit sehr kleinem Ausschnitte; Unterkiefer stark, vor dem etwa die Hälfte seiner Länge haltenden, etwas abgerundeten und an der Spitze nackten Kinnwinkel etwas herastretend, alsdann sanft rundlich aufsteigend, die Dille nur wenig kantig; Nasenöffnung länglich-rund, frei und glatt, dahinter die glattgespannte Nasenhaut, auf welcher die Nasenfedern vortreten; Zunge über halb so lang als der Schna-

bel, vorn hornigt, etwas getheilt und gefranst; Augenlid ziemlich nackt, am Rande befiedert; Gestalt des Körpers schlank und angenehm; Flügel kurz, abgerundet und klein, sie fallen kaum über die Schwanzwurzel hinaus, die erste Feder ist sehr kurz, die fünfte die längste; Schwanz ziemlich stark und lang, die zwölf Federn ziemlich schmal, stark abgestuft, die äußersten um elf Linien kürzer als die mittleren; Beine hoch und schlank; Ferse nicht völlig zweimal so lang als die Mittelzehe, mit fünf bis sechs sehr glatten Tafeln belegt, die dergestalt in einander verwachsen sind, daß der Lauf beinahe gestieft erscheint; Laufsohle scharf zusammengedrückt, und an jeder Seite mit einer Reihe Tafeln belegt; Hinternagel gewölbt und mälsig groß.

Färbung: Iris im Auge karminroth; Schnabel hornschwarz, der Mundwinkel weißlich; Rachen hell orangengelb; Beine hell bleifarben; ganzes Gefieder schön aschgrau, an Unterhals, Brust und allen unteren Theilen blässer; Kehle und Kinn kohlschwarz; Deckfedern der Flügel schwarz mit netten, weißen Rändchen an ihrer Spitze, wodurch an den größeren Ordnungen ein Paar mehr oder weniger deutliche weiße Queerstreifen entstehen; Schwung-

federn graulich-schwarz, mit dunkel aschgrauer Vorderfahne; innerer Flügel aschgrau; Schwanz schwarz, jedoch nicht tief oder dunkel gefärbt.

Ausmessung: Länge 6" 8''' — Breite 8" 2''' — L. d. Schnabels 7 $\frac{3}{4}$ ''' — Br. d. Schn. 2 $\frac{1}{8}$ ''' — Höhe d. Schn. 2''' — L. d. Flügels 2" 8''' — L. d. Schwanzes etwa 2" 8''' — Höhe d. Ferse 1" $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Mittelzehe 7''' — L. d. äußeren Z. 4 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. inneren Z. 3 $\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Hinterzehe 3 $\frac{5}{8}$ ''' — L. d. Mittelnagels 2 $\frac{1}{5}$ ''' — L. d. äußeren N. 1 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Hinternagels 3'''.

Weibchen: Obertheile fahl graubräunlich, auf dem Kopfe, den Schultern und Oberrücken mehr graulich, auf dem Unterrücken und den großen Flügeldeckfedern mehr gelbbräunlich überlaufen, die letzteren heller gelbbräunlich-fahl gerandet; Untertheile fahl gelbröthlich, an der Brust am dunkelsten; innere Flügeldeckfedern gelbröthlich.

Dieser schöne Vogel hat die Lebensart seiner Geschlechtsverwandten. Ich fand ihn nur selten, aber immer im dunkeln Schatten der großen Urwälder, wo er auf niederen Zweigen hüpfte. In seinem Magen fand man Ueberreste von Insecten.

3. *M. Domicella*.

Der schwarze Ameisenvogel mit rothen Augen.

A. Männchen schwarz, der Oberrücken weiß mit schwarzen Federrändern, wodurch die weiße Farbe verborgen wird; Flügelbug und ein Streifen quer über die Flügeldeckfedern weiß; Iris karminroth. Weibchen: Obertheile olivenbraun, die unteren fahl weißlich-graubraun; Schwanz schwärzlich-braun.

Thamnophilus Domicella, Mus. Berol.

Apniön *) botocudisch.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Schnabel wie an der vorhergehenden Art, mäßig schlank; Nasenloch rundlich; Kinnwinkel mälsig zugespitzt, an seiner Spitze etwas nackt; die Dille vor demselben mälsig heraustretend und sehr sanft aufsteigend; Gestalt schlank und angenehm; Auge lebhaft und feurig; Flügel etwas über die Schwanzwurzel hinausreichend, schwach, abgerundet, die erste Schwungfeder sehr kurz, die fünfte die längste; Schwanz breit, zart und weich, abgestuft, die Federn am Ende häufig etwas abgenutzt; Beine hoch und stark; Ferse anderthalbmal so lang als die Mittelzehe, mit fünf sehr glatten Tafeln belegt,

*) Durch die Nase zu sprechen.

die Fersensole ist gestieft und scharfkantig zusammengedrückt; zwei äussere Zehen an der Wurzel ein wenig vereint; Hinternagel weit gröfser als die übrigen.

Färbung: Iris hoch karminroth; Schnabel schwarz; Beine graulich-schwarz; Rachen blaß orangefarben; ganzes Gefieder kohlschwarz, nach dem Lichte mit etwas grünlichem Stahlglanze; die Federn des Oberrückens sind schön weifs, mit einem starken schwarzen Rande, wodurch die weisse Farbe in der Ruhe verborgen wird; kleine Deckfedern am Flügelhügel oder an der Spitze des Flügels weifs, auch haben die gröfsten Flügeldeckfedern einen weissen Spitzenrand, wodurch an diesem Theile ein weisser Querstreifen auf den Flügeln entsteht.

Ausmessung: Länge 6" 10''' — Breite 9" — L. d. Schnabels 6''' — Br. d. Schn. $1\frac{1}{2}$ ''' — Höhe d. Schn. 2''' — L. d. Flügels 3" — L. d. Schwanzes 2" 9 bis 10''' — Höhe d. Ferse 1" — L. d. Mittelzehe $8\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äufseren Z. $5\frac{1}{2}$ ''' — L. d. inneren Z. $4\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Hinterzehe $4\frac{4}{5}$ ''' — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äufseren N. $1\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinternagels $3\frac{1}{2}$ '''.

Junges Männchen: Das schwarze Gefieder

hat keinen Glanz, die weissen Theile sind weniger nett und rein.

Weibchen: Etwas kleiner als das Männchen; Obertheile röthlich-olivenbraun, innere Fahne der Schwungfedern dunkel graubraun; Schwanz schwärzlich-braun; Kehle schmutzig weisslich, übrige Untertheile fahl graulich-olivenbraun, in der Mitte in's Weissliche ziehend; Aftergegend, Schenkel und Steifs dunkel aschgrau.

Dieser schöne Vogel ist in allen von mir besuchten Gegenden von Brasilien nicht selten, und kriecht in den Gebüsch und grossen Wäldern umher, wo es dicht und dunkel ist. Sein feurig rothes Auge giebt ihm bei dem kohl-schwarzen Gefieder ein schönes Ansehen. In seinem Magen Ueberreste von Insecten.

4. *M. ruficauda.*

Der rostschwänzige Ameisenvogel.

A. Obertheile olivenbraun, an Unterrücken und Steifs rostroth; Schwanz dunkel rothbraun; Kopf schwärzlich überlaufen; Kinn, Kehle und Brust schwarz, letztere weiss gewellt; Bauch röthlich-braun. Weibchen: Brust und Kehle weisslich und graugelb, schwarz gewellt.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Gestalt und Bildung vollkommen wie bei No. 2., allein kleiner, der Schwanz ein wenig kürzer, und der Schnabel im Verhältniß dicker, übrigens ist letzterer gebildet wie bei dem genannten Vogel. Kinnwinkel nicht völlig die Hälfte der Schnabellänge, am Vordertheile sanft abgerundet und nackt; die Dille tritt am Kinnwinkel stark vor und steigt dann ziemlich sanft auf; Zunge halb so lang als der Schnabel, vorn hornartig und ein wenig getheilt; Augenlid nur am Rande befiedert; Flügel abgerundet, fallen kaum über die Schwanzwurzel hinaus, die fünfte und sechste Feder sind die längsten; Schwanz abgestuft, die äußeren Federn sechs Linien kürzer als die mittleren, ausgebreitet abgerundet, die Federn an der Spitze sehr abgenutzt, er erreicht, wenn der Vogel auf dem Rücken liegt, nicht das Ende der ausgestreckten Beine; diese sind stark, ziemlich hoch; Ferse mit sieben bis acht glatten Tafeln belegt; Fersensohle gestiefelt, sie ist etwa anderthalbmal so lang als die Mittelzehe.

Färbung: Iris dunkel braun; Schnabel schwarz; Beine blaß fleischröthlich, beinahe weiß; Obertheile olivenbraun, Rücken röthlich, Kopf und Oberhals dunkel grau überlaufen, die

Stirn am schwärzesten, alle Federn mit olivenbräunlichen Rändern; Unterrücken rothbraun; manche Individuen haben den Rücken schwarz mit gelbröthlichen Federrändern; Deckfedern der Flügel schwarzbraun, mit starken gelbrothen Spitzen der Federn; Schwungfedern dunkel graubraun, an der Vorderfahne röthlichbraun, an ihrem hinteren Rande gelblich-fahl; Schwanz dunkel rothbraun, seine oberen Deckfedern lebhafter rothbraun; innere Deckfedern der Flügel graubräunlich, schwärzlich und weißlich gemischt; Kinn, Kehle, Brust, Seiten des Halses und Oberbauch kohlschwarz, an Brust und Bauch sehr stark mit weißen Federrändern geschuppt, häufig auch an den Seiten des Halses; Steiſs rostroth; Aftergegend, Bauch, Schenkel und Seiten fahl gelbröthlich.

Ausmessung: Länge 5" 11''' — Breite 7" 7''' — L. d. Schnabels 7''' — Br. d. Schn. 2''' — Höhe d. Schn. 2''' — L. d. Flügels 2" 3 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Schwanzes etwas über 2" — Höhe d. Ferse 10 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Mittelzehe 6 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. äußeren Z. 3 $\frac{4}{5}$ ''' — L. d. inneren Z. 3 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Hinterzehe 3 $\frac{5}{6}$ ''' — L. d. Mittelnagels 2''' — L. d. äußeren N. 1 $\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Hinternagels 2 $\frac{2}{3}$ ''' —

Junges Männchen: An Brust, Bauch, Sei-

ten des Halses und am Rücken stärker weissgerandet, doch variiren in dieser Hinsicht auch die alten Vögel ein wenig, indem manche stärker weiss gewellt, andere mehr rein schwarz gefärbt sind.

Weibchen: Etwas kleiner als das Männchen, 5" 9" lang. Rücken und Kopf blässer und mehr geschuppt als am Männchen; die Federn des Unterhalses und der Brust sind nicht schwarz, wie an jenem, sondern haben in der Mitte nur zwei schief gegen einander gestellte schwarze Flecke, und vorn einen sehr breiten, graugelblich-fahlen Saum; Bauch und Unterbrust sind blässer als an dem Männchen; Kehle schmutzig weiss, mit feinen schwärzlichen Rändchen der Federn.

Junges Weibchen: Kehle weiss, die Zeichnung ist übrigens überall blässer, mehr verloschen und stark hell gerandet.

Dieser Vogel lebt in den grossen geschlossenen Waldungen, wo man ihn auf niederen Zweigen hüpfen, oder auf dem Boden umherlaufen sieht. Eine Stimme habe ich nie von ihm vernommen. In seinem Magen Ueberreste von Insecten.

5. *M. strigilata*.

Der Ameisenvogel mit dunkeln Längsflecken.

A. Obertheile rothbraun mit schwarzem Längsflecken; mittlere Schwanzfedern rothbraun, die äusseren schwarz mit weißer Spitze; ein Streifen über dem Auge und alle Untertheile weißlich; Männchen mit Kinn und Kehle schwarz, Weibchen an diesen Theilen gelblich-weiß, die Brust schwarzbraun gestrichelt.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Schnabel schlank, vorn etwas zusammengedrückt, die Tomienränder ein wenig eingezogen; Kuppe etwas herabgebogen, mit einem kleinen Zähnchen oder Ausschnitte; Kinnwinkel beinahe halb Schnabellänge, mälsig zugespitzt, an der vorderen Hälfte beinahe nackt; Nasenloch an der unteren Seite der Nasenhaut, länglich; Zunge hornartig, schmal zugespitzt, vorn ein wenig getheilt und gefrants't; die Gestalt des Vogels ist schlank, die Flügel fallen kaum über die Schwanzwurzel hinaus, die fünfte und sechste Schwungfeder sind die längsten; Schwanz mälsig lang, abgerundet und abgestuft; Beine sehr hoch und schlank, zum Laufen auf dem Boden eingerichtet; Ferse doppelt so lang als die Mittelzehe, sehr glatt, mit sieben Tafeln auf ihrem Rücken, die Sohle derselben zusam-

mengedrückt; Zehen ziemlich kurz, die äussersten an der Wurzel ein wenig vereint; Hinternagel etwas aufgerichtet und gröfser als die übrigen.

Färbung: Oberkiefer dunkel horngrau-braun, an den Rändern und an der Wurzel des Unterkiefers bleifarben; Rachen weißlich-fleischroth; Beine röthlich-bleifarben; Iris graubraun; alle Obertheile rothbraun, auf Kopf und Hals mehr graubraun und fein schwarzbraun gestrichelt; Rücken auf rothbraunem Grunde mit grofsen schwarzbraunen Flecken bezeichnet; Unterrücken mit langen, lockern, rostrothen Federn; vom Nasenloche zieht über dem Auge hin nach dem Hinterkopfe ein breiter weißer Streifen, unter diesem durch das Auge ein schwärzlicher, der sich nach dem bräunlich-dunkeln Flecke zwischen Auge und Ohr ausdehnt; Wurzel des Unterkiefers und Seitenrand der Kehle weiß; Kinn, Kehle und Unterhals schwarz, die weißse Einfassung der Kehle vereinigt sich um die schwarze Farbe herum mit der weißen Brust und allen übrigen mit dieser Farbe bedeckten Untertheilen; Seiten der Brust etwas gelblich, mit wenigen schwarzbraunen Flecken; Seiten des Leibes hell röthlich-gelb; Schultern und alle Flügeldeckfedern bräunlich-schwarz, mit weißen Federspitzen, wodurch auf

den großen ein undeutlicher weißer Queerstreifen entsteht; Scapular- und hintere Schwungfedern in ihrer Mitte schwarzbraun, hinten und vorn mit breitem rostrothem Saume; Schwungfedern schwärzlich-braun, die mittleren an der vorderen Hälfte der Vorderfahne gelbröthlich, die vorderen an dieser Stelle weißlich, welches an den beiden ersten Federn fehlt; hintere Fahne der Schwungfedern mit weißlichem Außenrande; zwei mittlere Schwanzfedern rostroth und ungefleckt, die nachfolgende bräunlich-schwarz, die folgende eben so, aber mit weißer Spitze, die äußerste endlich mit weißer Spitze und weißem äußeren Saume.

Ausmessung: Länge $6'' 2\frac{1}{2}'''$ — Breite $7'' 10'''$ — L. d. Schnabels $6\frac{2}{3}'''$ — Br. d. Schn. $1\frac{4}{5}'''$ — Höhe d. Schn. $1\frac{2}{3}'''$ — L. d. Flügels $2'' 5'''$ — L. d. Schwanzes etwa $2'' 6'''$ — Höhe d. Ferse $1'' 2'''$ — L. d. Mittelzehe $6\frac{1}{2}'''$ — L. d. äußeren Z. $4\frac{2}{3}'''$ — L. d. inneren Z. $3\frac{2}{3}'''$ — L. d. Hinterzehe $3\frac{1}{4}'''$ — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{6}'''$ — L. d. äußeren N. $1\frac{1}{2}'''$ — L. d. Hinternagels $3'''$. —

Weibchen: Die schwarze Kehle fehlt gänzlich, eben so die weiße Einfassung derselben, auch ist die Backengegend nicht so dunkel gefärbt; dagegen ist die Kehle weißlich, Unter-

hals und Brust blaß röthlich-gelb mit schwarz-braunen Längsflecken und Streifen; Spitzen der mittleren Schwanzfedern ein wenig schwärzlich-braun. — Länge 6" 2". —

Dieser schöne Vogel lebt in dichten Gebüsch des Sertong der Provinz *Bahia* einzeln oder paarweise. Er läuft auf dem Boden, oder hüpft einen Fuß hoch von demselben auf den niederen Zweigen umher. Seine Stimme ist ein dreitöniger Pfiff, der ziemlich weit gehört wird, und mit welchem beide Geschlechter sich zusammenrufen.

6. *M. fuliginosa*, Illig.

Der graue Ameisenvogel mit schwarzer Kehle und Schultern.

A. Körper aschgrau; Mitte der Kehle und Brust, so wie die weißgefleckten Schultern schwarz; Schwungfedern und Schwanz graulich-schwarz, die Seitenfedern des letzteren mit weißen Spitzen.

? *Le Grisin de Cayenne femelle, Buff. pl. enl. No. 643. Fig. 2.*

Lichtenstein's Doubletten-Catalog, p. 45. No. 483.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Schnabel lang, schlank und an der Wurzel etwas ausgebreitet; Firste gerade, kantig, an der Spitze mit kleinem Häkchen und mit einem

kleinen Zahne versehen; Kinnwinkel beinahe halbe Schnabellänge, breit, mälsig abgerundet, an seiner gröfseren Vorderhälfte beinahe völlig nackt; Dille abgerundet, vor dem Kinnwinkel nur wenig heraustretend, in der Mitte mehr, und von hier an bis zur Spitze sehr sanft gewölbt aufsteigend; Nasenfedern ein wenig buschig vorstrebend; die Flügel erreichen etwa die Mitte des Schwanzes, die erste Schwungfeder ist kurz, die vierte die längste, die fünfte giebt ihr an Länge nur wenig nach; Schwanz kurz, schmal und weich, etwas abgestuft, aus schmalen Federchen zusammengesetzt; Beine mälsig hoch; Ferse mit fünf bis sechs Tafeln belegt; äufseren Zehen an der Wurzel vereint; Hinternagel bedeutend gröfser als die übrigen.

Färbung: Ganzes Gefieder aschgrau, in den Seiten, an den oberen Schwanzdeckfedern etwas heller, bei manchen Individuen in den Seiten beinahe gänzlich weifs; Kinn, Mitte der Kehle und Brust schwarz; Scapularfedern weifs; Schultern oder alle Flügeldeckfedern schwarz, viele von ihnen mit weissen Spitzen, wodurch ein Paar unregelmässige weisse Queerstreifen, und mehrere Flecke auf diesen Theilen entstehen; innere Flügeldeckfedern weifs; Schwungfedern schwärzlich-braun, am Vorderrande asch-

grau überlaufen, am inneren Hinterrande mit weißlichem Saume; Schwanz schwärzlich, die vier äußeren Federn an jeder Seite mit kleiner weißer Spitze; Schnabel dunkel schwärzlich-horngrau; Beine schön bläulich-bleifarben; Iris dunkelbraun. —

Ausmessung: Länge 4" — Breite 6" 6"
— L. d. Schnabels $5\frac{2}{3}$ " — Br. d. Schn. $1\frac{2}{3}$ " —
Höhe d. Schn. $1\frac{1}{2}$ " — L. d. Flügels 1" 11 $\frac{1}{2}$ "
— L. d. Schwanzes beinahe 1" 6" — Höhe d.
Ferse $6\frac{2}{3}$ " — L. d. Mittelzehe $3\frac{1}{2}$ " — L. d.
äußeren Z. $2\frac{2}{3}$ " — L. d. Hinterzehe $2\frac{1}{3}$ " —
— L. d. Mittelnagels $1\frac{1}{3}$ " — L. d. äußeren N.
1" — L. d. Hinternagels $1\frac{1}{2}$ ".

Weibchen: Schnabel und Beine bleifarben; alle Obertheile aschgrau, an Scheitel und Unter Rücken bräunlich überlaufen; Flügel und Schwanz blaß olivenbraun, mit helleren, gelbbräunlichen Rändern, und die Deckfedern mit solchen Spitzen; alle Untertheile rostgelblich, die Seiten so wie die Kehle weißlich.

Diese kleine Myiothere lebt in den dichten großen Waldungen nicht selten, sie nährt sich von Insecten.

7. *M. squamata*, Licht.

Der betropfte Ameisen vogel.

A. Obertheile schwarz mit runden weissen Flecken; Deckfedern der Flügel und Schwanzfedern schwarz mit weissen Spitzen; Untertheile weisslich, an Unterhals, Brust und Seiten jede Feder mit einem schwarzen Flecke in ihrer Mitte; Weibchen: Obertheile olivenbraun, die Flecken hell rostgelb; 5" 2" lang.

Lichtenstein's Verz. d. Doubl. pag. 44. No. 478.

Nik-Nik botocudisch.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt etwa der vorhergehenden Art, aber etwas gröfser. Schnabel gebildet wie dort, aber mehr kurz und schlank; Nasenlöcher länglich und schmal, frei; Kinnwinkel nicht völlig halb Schnabellänge, an der Spitze mälsig abgerundet und nackt; ein kleiner Ausschnitt hinter der herabgebogenen Oberkieferkuppe; Zunge halb so lang als der Schnabel, vorn gespalten; Flügel ziemlich abgerundet, sie fallen bis auf ein Dritttheil der Schwanzlänge, die fünfte Feder ist die längste, die erste ist kurz; Schwanz mälsig lang, schmal, weich, abgestuft; Beine mälsig hoch; Ferse nicht völlig zweimal so lang als die Mittelzehe, mit fünf glatten Tafeln belegt, ihre Sohle zusammengedrückt; Zehen

schlank, die äusseren an der Wurzel vereint; Hinternagel viel stärker als die vorderen.

Färbung: Iris schön aschgrau; Rachen gelb; Schnabel schwarz, der Unterkiefer an der Wurzel grau; Beine bleifarben; alle Obertheile schwarz mit weissen rundlichen Flecken, auf der Mitte des Kopfs weniger; über jedem Auge von der Nase an nach dem Hinterkopf ein stark weispunctirter Streifen; Kehle, Backen und Unterhals weisslich, alle Federn in ihrer Mitte schwärzlich, aber der Rand weiss, weshalb diese Theile melirt erscheinen; alle Federn der Brust und Seiten schwarz, mit breitem weissem Saume; Mitte des Bauchs weisslich, Seiten aschgrau, und zum Theil weisslich gewellt; Schulterfedern schwarz mit weissen Spitzen; Schwungfedern schwarzbraun mit weissen Spitzen und Hintersaume; Schwanzfedern schwarz, an den Rändern der Fahnen mit gegenüberstehenden weissen Flecken und einer weissen Spitze, zum Theil mit schmalen, weissen Querbinden.

Ausmessung: Länge 5" 2''' — Breite 6" 6''' — L. d. Schnabels 5½''' — Br. d. Schn. 1½''' — Höhe d. Schn. 1½''' — L. d. Flügels 1" 11½''' — L. d. Schwanzes 1" 10''' — Höhe d. Ferse 8''' — L. d. Mittelzehe 5''' — L. d. äusseren Z. 4½''' — L. d. inneren Z. 2½''' — L. d. Hin-

terzehe $3\frac{1}{4}'''$ — L. d. Mittelnagels $1\frac{1}{4}'''$ — L. d. äusseren N. $1\frac{2}{5}'''$ — L. d. Hinternagels $2'''$.

Weibchen: Obertheile olivenbraun, aber die Federn an den Wurzeln schwärzlich, an den Spitzen bräunlich, und mit grossen runden, nach oben zugespitzten, gelbbraunlichen Flecken; Flügeldeck- und Schwanzfedern schwärzlich-braun, mit grossen rostgelblichen Spitzenflecken, welche gestellt sind, wie an dem männlichen Vogel; Untertheile wie am Männchen, aber die schwarzen Flecken weniger gross und dunkel, Bauch mehr weisslich.

Junges Männchen: Anfänglich gefärbt wie das Weibchen, nur ist die Grundfarbe seiner Obertheile dunkler, mehr schwarz, und die Flecken sind dunkler gelbbraun.

Dieser Vogel hat die Lebensart der übrigen verwandten Arten, und kommt besonders in den grossen geschlossenen Waldungen vor. — Die Botocuden nennen ihn *Nik-Nik*.

8. *M. superciliaris*, Licht.

Der Ameisenvogel mit schwarzem Unterleibe.

A. Männchen: Untertheile schwarz, die Obertheile dunkel graubraun; über dem Auge eine weissliche Linie; Flügelbug und oberer Flügelrand

weiss; Schulterfedern schwarzbraun mit einigen weissen Fleckchen. Weibchen: in allen Farben heller, Unterleib weisslich-gelb, weisse Schulterflecken und Augenstreifen gross.

Lichtenstein's Catalog d. Doubl. pag. 44. No. 430.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Gestalt der vorhergehenden Arten. Schnabel schlank mit feinem Häkchen und kleinem Zahne; Zunge schmal zugespitzt, hornartig, vorn getheilt; Flügel kurz, fallen nicht weit über die Schwanzwurzel hinaus, sind abgerundet, schwach, die erste Feder sehr kurz, die fünfte und sechste am längsten; Federn des Unterrückens wie bei allen diesen Vögeln, sehr dicht, lang, locker und daunenartig; Schwanz zart, weich, schmal, abgestuft, mälsig lang; Beine mälsig hoch; Ferse mit sechs glatten Tafeln belegt, übrigens alles gebildet wie an den vorhergehenden Arten.

Färbung: Schnabel bräunlich-schwarz; Beine bleifarben; Iris dunkel graubraun; alle Obertheile dunkel graubraun, die Daunfedern des Unterrückens dunkel schwärzlich-aschgrau; vom Nasenloche zieht über dem Auge hin nach dem Hinterkopfe eine weisse Linie; Seiten des Kopfs, Kinn, Kehle und alle Untertheile bis zum Schwanze kohlschwarz, blos an den Sei-

ten des Leibes stehen noch einige weißliche Daunfedern, die aber wahrscheinlich noch ausfallen; Flügelbug und oberer Flügelrand weiß; Deckfedern der Flügel bräunlich-schwarz, mit einzelnen weißen Spitzen der Federn; Schwungfedern schwärzlich, der Hinterrand der inneren Fahne weiß; Schwanz schwarz, einige der äußeren Federn jeder Seite haben weiße Spitzen.

Ausmessung: Länge 4" 8''' — Länge d. Schnabels $5\frac{1}{8}$ ''' — Br. d. Schn. $1\frac{1}{8}$ ''' — Höhe d. Schn. $1\frac{1}{8}$ ''' — L. d. Flügels 2" $\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Schwanzes 1" $8\frac{1}{2}$ ''' — Höhe d. Ferse $9\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelzehe 5''' — L. d. äußeren Z. $3\frac{3}{4}$ ''' — L. d. inneren Z. 3''' — L. d. Hinterzehe $3\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelnagels $1\frac{3}{4}$ ''' — L. d. Hinternagels 2''' — L. d. äußeren N. $1\frac{1}{2}$ ''' —

Weibchen: Alle Obertheile mehr röthlich-braun, Flügel und Schwanz schwarzbraun, die Deckfedern mit großen weißen Flecken; äußere Schwanzfedern mit schiefen weißen Spitzen; von der Nase über dem Auge hin ein sehr breiter, stärkerer weißer Streifen als am Männchen, der sich an der Seite des Hinterkopfs etwas ausbreitet; Ohrgegend und ein Streif durch das Auge schwarzbraun; Kehle weißlich; Unterhals, Brust und übrige Unter-

theile hell fahl gelblich-weiß, an den Seiten aschgrau überlaufen.

Junges Männchen: Wie das Weibchen, die schwarzen Federn des Unterleibes zeigen sich bald an der Stelle der weißlichen.

Dieser Vogel hat viel Aehnlichkeit mit dem nachfolgenden, scheint aber schon durch den feineren, schlankeren Schnabel hinlänglich getrennt.

Er lebt im Sertong der Provinz *Bahia*, und kriecht außer der Paarzeit in kleinen Gesellschaften von drei bis vier Stück im dichten Gebüsch umher, auch giebt er eine kleine, kurze Lockstimme von sich.

2 9. *M. leucophrys*, Licht.

Der schwarzbrüstige Ameisenvogel.

A. Obertheile graubraun, Flügel und Schwanz schwärzlich, die Flügeldeck- und äußeren Schwanzfedern mit weißen Spitzen; über dem Auge eine weißliche Linie; Kinn, Kehle, Brust und Mitte des Bauches schwarz, Seiten der Brust und des ganzen Leibes weiß; *Weibchen:* Obertheile röthlich-graubraun, Untertheile röthlich-gelb; Flügeldeckfedern schwarz mit weißen Spitzen, ebenso der Schwanz.

? *Le Grisé de Cayenne mâle*, Buff. pl. enl. No. 643.
Fig. 1.

Beschreibung des männlichen Vogels: Hat mit dem vorhergehenden so viel Aehnlichkeit, daß man ihn für mit demselben identisch halten könnte, allein der Schnabel ist dicker, länger und stärker. Er tritt an der Dille vor dem Kinnwinkel kantig und etwas bogig heraus, an dessen Spitze dieselbe stark abgeflächt ist; Kinnwinkel selbst an der Spitze nackt; Bildung des Vogels wie an der vorhergehenden Art, die Flügel eben so gebildet, die fünfte Feder die längste, eben so hat der Schwanz die Bildung wie an der vorhergehenden Art; Beine mälsig hoch; Ferse mit sechs glatten Tafeln belegt.

Färbung: Schnabel, Iris und Beine wie an der vorhergehenden Art; Obertheile dunkel graubraun, Unterrücken mit sehr langen, dichten, aschgrau-bräunlichen Federn bedeckt, die dem Vogel ein dickes rundes Ansehen geben; Flügelbug und oberer Flügelrand weiß; Schultern schwarz mit weißen Federspitzen, wodurch ein Paar mehr oder weniger regelmälsige weisse Queerstreifen auf dem Flügel entstehen; Schwungfedern dunkelbraun, ohne andere Abzeichen; Schwanz bräunlich-schwarz, die drei äulseren Federn an jeder Seite mit weißen Spi-

tzen; über dem Auge eine weiße Linie; Kinn, Kehle, Backen, Unterhals, Brust und Mitte des Unterleibes kohlschwarz, Seiten der Brust und des Körpers bis gegen den Schwanz hin weiß.

Ausmessung: Länge ungefähr 4" 6" — L. d. Schnabels $5\frac{1}{2}'''$ — Breite d. Schn. $1\frac{2}{3}'''$ — Höhe d. Schn. $1\frac{1}{2}'''$ — L. d. Flügels 1" 10 $\frac{2}{3}'''$ — Höhe d. Ferse $8\frac{1}{6}'''$ — L. d. Mittelzehe $4\frac{2}{3}'''$ — L. d. äußeren Z. $3\frac{1}{6}'''$ — L. d. inneren Z. $2\frac{2}{3}'''$ — L. d. Hinterzehe 3" — L. d. Mittelnagels 2" — L. d. äußeren N. $1\frac{1}{2}'''$ — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{6}'''$. —

Weibchen: Obertheile fahl graubräunlich, oft eine undeutliche weißliche Linie über dem Auge; Flügel und Schwanz graubraun; Flügeldeckfedern dunkler graubraun mit weißen Spitzen, wodurch an diesem Theile zwei ziemlich regelmässige weiße Queerstreifen entstehen; innere Flügeldeckfedern weiß; alle Untertheile gelbröthlich-fahl, an Brust und Mitte des Bauches am dunkelsten, in den Seiten blässer.

Dieser Vogel hat so viel Aehnlichkeit mit dem vorhergehenden, daß ich ihn mit einem ? versehen habe. — Sind beide identisch, so ist No. 9. im männlichen Geschlechte ein jüngerer Vogel, und No. 8. ein älteres Weibchen, der

Bau des Schnabels läßt mich aber bis jetzt beide für verschieden ansehen.

10. *M. pileata*, Licht.

Der schwarzplattige Ameisenvogel mit weißem Augestreifen.

A. Körper aschgrau, Federn des Oberrückens an der Wurzel weiß, auch einige schwarze Flecke; Scheitel und ein Strich durch die Augen schwarz; über dem Auge ein weißer Strich; Flügel schwarz, Deckfedern weiß bespitzt, daher hier zwei weiße Querstreifen; Schwanz schwarz, die Seitenfedern mit weißen Spitzen.

Lichtenstein's Verzeich. d. Doubl. pag. 44. No. 479.

Beschreibung des männlichen Vogels: Größe und Gestalt etwa der vorhergehenden Art; Schnabel mälsig schlank, mit kleinem Häkchen und Zähnchen; Kinnwinkel ziemlich kurz, vorn etwas abgerundet, an der Spitze sparsam befiedert; Dille an der Wurzel abgeflächt; Zunge halb so lang als der Schnabel, vorn getheilt, und jeder Theil gefrants't; Flügel kurz und abgerundet, die fünfte Feder ist die längste; Schwanz schmal, weich und zart, abgestuft; Beine schlank; Ferse mit sechs bis sieben glatten Tafeln belegt; Zehen schlank; die Hinter-

zehe lang und dünn, der Hinternagel ein wenig aufgerichtet und stark gekrümmt; äussere Zehen ein wenig verbunden.

Färbung: Iris gelbbraun; Beine bleifarben; Oberkiefer schwarz, der untere bleifarben; Scheitel und ein Streif durch die Augen schwarz; vom Schnabel über dem Auge hin zieht nach dem Hinterkopf ein starker weißer Streifen; Flügel schwarz, die Deckfedern zum Theil mit weißen Spitzen, wodurch an diesen Theilen zwei weisse Queerstreifen entstehen; Schwungfedern mit graulich-weißem Saume; Scapularfedern zum Theil schwarz, vorn mit breitem weißem Saume; Schwanz schwarz, die viel kürzeren äusseren Federn beinahe halb weiss, die nächstfolgenden mit weißen Spitzen, die mittleren oft gänzlich schwarz, aber mit einem schmalen weißen Seitensaume; alle übrigen Theile des Vogels aschgrau, an den Untertheilen blässer, an Kehle und Mitte des Bauchs weißlich; After weiss; Federn des Rückens sehr lang, dicht, daunenartig weich, wenn sie aufgebläht werden, erhält der Vogel dadurch ein rundes Ansehen; innere Flügeldeckfedern weiss.

Ausmessung: Länge 4" 9" — Breite 6" 4" — L. d. Schnabels $5\frac{2}{3}$ " — Br. d. Schn. $1\frac{5}{8}$ " — Höhe d. Schn. $1\frac{1}{2}$ " — L. d. Flügels 1" 9"

— L. d. Schwanzes etwa 1" 6''' — Höhe d. Ferse 7 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Mittelzehe 3 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. äußeren Z. 3''' — L. d. inneren Z. 2''' — L. d. Hinterzehe 3''' — L. d. Mittelnagels 1 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. hinteren N. 2''' —

Weibchen: Der schwarze Scheitel ist weiß gefleckt, Farbe des Leibes nicht so rein, alle unteren Theile blafs weißgelblich.

Junges Weibchen: Alle oberen Theile sind aschgrau, hier und dort bräunlich oder gelblich überlaufen, besonders am Unterrücken, die schwarzen Theile fehlen; Schultern und Schwanz graubraun, erstere mit blässeren, etwas grau-gelblichen Flecken; Kehle weißlich; alle Untertheile blafs rostgelblich.

Er hat die Lebensart und Manieren der früher beschriebenen Arten.

11. *M. plumbea*.

Der bleifarbig e Ameisenvogel.

A. Ganzes Gefieder dunkel bleifarben; Schwanz- und Schwungfedern graubraun, die mittleren des ersten, und die Vorderfahne der letzteren etwas bleifarben; Schenkel und Bauch gelblich - braun überlaufen; auf den Flügeldeckfedern ein Paar feine weiße Querlinien.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt kurz und gedrungen, Schwanz kurz, Beine mälsig hoch. Schnabel ziemlich kurz, schlank, mehr hoch als breit; Nasenloch eiförmig, frei an der Spitze der Nasenhaut; Firste gerade, mälsig scharfkantig, mit ziemlich starkem, feinem Häkchen und kleinem Zahne dahinter; Kinnwinkel nicht halb Schnabellänge, vorn mälsig abgerundet, an der Spitze etwas nackt; Dille vor dem Kinnwinkel heraustretend, rundlich gewölbt aufsteigend, dabei wenig zusammengedrückt; Federn in der Nähe des Schnabels mit borstartigen Spitzen; ganzes Gefieder höchst weich, dicht und zart, besonders dicht sind die Federn am Rücken, und dabei lang, noch mehr als an den früher beschriebenen Arten; Flügel ziemlich kurz und schwach, die erste Feder kurz, die vierte und fünfte die längsten; Schwanz sehr kurz und schmal, aus schmalen, weichen Federn zusammengesetzt; Ferse mälsig hoch, mit fünf bis sechs glatten Tafeln belegt; Vorderzehen schlank, die äußeren an der Wurzel ein wenig vereint; Hinterzehe lang und schlank, mit starkem Nagel.

Färbung: Schnabel schwärzlich, an der Spitze ein wenig blässer; Beine bleifarben; ganzes Gefieder dunkel bleifarbig; Deckfedern der

Flügel zum Theil etwas schwärzlich und an der Spitze mit einem netten, weißlichen Rändchen, wodurch an diesem Theile zwei feine, weißliche Querlinien entstehen; Schwungfedern grau-braun, an der Vorderfahne ein wenig oliven-grau gerandet; Schwanz bräunlich- aschgrau; Bauch etwas blässer bleigrau als die oberen Theile, an den Seiten, den Schenkeln, After und Steifs gelbbräunlich überlaufen.

Ausmessung: Länge (nach einem ausgestopften Exemplare) etwa 5" — L. d. Schnabels 6" — Breite d. Schn. $2\frac{1}{7}$ " — Höhe d. Schn. $1\frac{1}{8}$ " — L. d. Flügels $2" 7\frac{1}{2}"$ — L. d. Schwanzes etwa 1" 7" — Höhe d. Ferse $9\frac{1}{2}"$ — L. d. Mittelzehe $5\frac{1}{4}"$ — L. d. äußeren Z. 4" — L. d. inneren Z. 3" — L. d. Hinterzehe $3\frac{5}{7}"$ — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{4}"$ — L. d. äußeren N. $1\frac{1}{4}"$ — L. d. Hinternagels 3". —

Dieser Vogel ist mir nicht häufig vorgekommen, ich habe ihn auch nur im männlichen Geschlechte kennen gelernt. Er lebt in den großen Urwäldern und hat Manieren und Lebensart der vorhergehenden Arten.

12. *M. scapularis*, Licht.

Der Ameisenvogel mit strohgelbem Unterleibe.

A. Obertheile olivengrau; Scheitel, ein Streif durch das Auge, und Schulterfedern schwarz; die Spitzen der letzteren und ein Strich über dem Auge weiß; Kehle weißlich; Untertheile blasfgelb; Schwungfedern schwärzlich mit rothbraunem Saume; Schwanz dunkelgrau, die äusseren Federn mit weißen Spitzen; Weibchen mit rostrohem Scheitel; 4" 8" lang.

Le Fourmilier & alles roussees, Temm. pl. col. 132.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Größe und Gestalt, so wie Vertheilung der Farben etwa wie an N^o 10, aber der Schnabel dicker, übrigens eben so gebildet, er ist ziemlich hoch, der Haken fein, etwas mehr als ein Drittheil Linie über die Unterkieferkuppe herabtretend; mit kleinem Ausschnitte dahinter; Kinnwinkel etwas mehr als ein Drittheil der Schnabellänge, vorn mälsig abgerundet, mit vorwärtstrebenden, in Borsten endigenden Federn besetzt; eigentliche Bartborsten fehlen; Nasenloch rund, am Vordertheile der flach übergespannten Nasenhaut; Dille abgerundet, sehr sanft gewölbt aufsteigend; Nasenfedern ein wenig aufgerichtet; Zunge mehr als ein Drittheil der Schnabellänge, vorn zugespitzt, ein wenig getheilt und gefranst; Flügel kurz, die vierte Feder die läng-

ste, die erste sehr kurz; Schwanz wie an den vorher gehenden Arten, schwach, schmal und stark abgestuft; Beine ziemlich kurz, Ferse mit fünf glatten Tafeln belegt, etwas unter der Fußbeuge noch befiedert; Zehen schlank, Hinterzehe lang, Nagel stark gebogen und groß.

Färbung: Oberkiefer hornschwarz, der untere bleifarben; Iris dunkelbraun; Beine bleifarben; Scheitel und ein Streifen durch die Augen schwarz, eben so die Schulter- oder Flügeldeckfedern, welche aber weisse Spitzen haben, wodurch an den großen Ordnungen dieser Federn zwei starke weisse Querstreifen auf dem Flügel entstehen; von der Nase über dem Auge nach dem Hinterkopfe zieht ein weißer Streifen; Gegend unter dem Auge weißlich und schwärzlich gewellt; Kehle gelblich - weiß; Oberhals und Rücken aschgrau, olivengrün überlaufen; ganze Untertheile hell limonen- oder strohgelb, eben so die inneren Flügeldeckfedern; Schwungfedern schwärzlich - graubraun, an der Vorderfahne lebhaft rothbraun, der hintere Rand der inneren Fahne weißlich; Schwanz schwärzlich-braun, die mittleren Federn aschgrau, mit kleinen weissen Spitzenrändchen; die übrigen mit weissen Spitzen, und die äußersten an jeder Seite beinahe halb weiß.

Ausmessung: Länge $4'' 8\frac{1}{2}'''$ — Breite $3'' 4'''$ — L. d. Schnabels $5'''$ — Br. d. Schn. $2'''$ — Höhe d. Schn. $1\frac{1}{2}'''$ — L. d. Flügels $1'' 10\frac{1}{2}'''$ — L. d. Schwanzes $1'' 6'''$ — Höhe d. Fersé $7\frac{1}{2}'''$ — L. d. Mittelzehe $4'''$ — L. d. äusseren Z. $3'''$ — L. d. inneren Z. $2\frac{1}{2}'''$ — L. d. Hinterzehe $2\frac{1}{2}'''$ — L. d. Mittelnagels $1\frac{1}{2}'''$ — L. d. äusseren N. $1\frac{1}{2}'''$ — L. d. Hinternagels $2'''$

Weibchen: In der Hauptsache gefärbt wie das Männchen, allein alle Farbenblässe verloschen und weniger nett; der Scheitel ist hier rothbraun, da er am Männchen schwarz ist; Bauch blässer gelblich.

Junges Männchen: Kopf graulich-weiß, fein grau queergestrichelt; Scheitel röthlich-braun, an der Stirn beinahe rostroth, weiter zurück verloschen schwärzlich-braun queergestreift; vom Auge nach dem Hinterkopfe läuft ein ähnlicher, dunkel röthlich-brauner, schwärzlich gemischter Streifen; zwischen ihm und der Scheitelfarbe bildet die weissliche Kopffarbe einen breiten Längsstreifen; alle Obertheile so wie der Seitenhals grünlich-aschgrau; Deckfedern der Flügel schwarzbraun, am Schultergelenke grünlich überlaufen, und die Federn mit grossen, gelblich-weißen Spitzenflecken, wodurch an den grossen Ordnungen derselben einige der-

gleichem unterbrochene Querstreifen stehen;
übrigens wie der alte Vogel. — Länge 4" 6".

Dieser Vogel lebt in den grossen Waldun-
gen des inneren Brasilien's, ich fand ihn im
Sertão der Provinz Bahia. Ich werde nach-
folgend näher, wie es mir scheint, verschiedene
Arten beschreiben, die in allen ihren Zügen eine
Nachbildung der beschriebenen zu seyn scheint,
die aber durch geringere Grösse sich unterschei-
den. Sie sind eine der vielen in Brasilien vor-
kommenden Wiederholungen der dortigen Thier-
fauna. Herr Temmink giebt eine gute Abbil-
dung unseres eben beschriebenen Vogels, nur
sind Iris, Beine und Schnabel nicht richtig co-
lourirt. Ich habe die Abbildung, die ich hier
reiterweise, durch eine andere ersetzt, die ich
gleichzeitig auch in der Abbildung des
gleichen Vogels, die ich hier reiterweise, durch eine andere ersetzt, die ich

13. *M. variegata*, Licht.
Der kleinere Ameisenvogel mit strohgelbem Bauche.

*A. Obertheile aschgrau; Scheitel und ein Streif
durch das Auge, so wie die Schulterfedern, schwarz,
die Spitzen der letzteren und ein Streif über dem
Auge weiss; Kehle weiss; Untertheile bläsgelb;
Schwungfedern schwärzlich, mit rothbraunem Sa-
um; Schwanz schwarz; die äusseren Federn mit
Spitzen und Saum. Wie ich eben mit rothrothem
Scheitel, noch nicht 4" lang.*

Beschreibung des männlichen Vogels: Ge-

stalt, Bildung und Färbung beinahe gänzlich der vorhergehenden Art. Vierte, fünfte und sechste Schwungfeder ziemlich gleich lang, die vierte scheint die längste.

Färbung: Wie an der vorhergehenden Art, allein man bemerkt auf dem Rücken in der aschgrauen Farbe einige schwarze Flecken; äussere Schwanzfedern schwarz an der Wurzelhälfte der inneren Fahne, die Spitzenhälfte und die ganze äussere Fahne sind weiss.

Ausmessung: Länge ungefähr 4" — L. d. Schnabels $5\frac{1}{2}$ " — Breite d. Schn. 2" — Höhe d. Schn. $1\frac{1}{2}$ " — L. d. Flügels 1" $9\frac{1}{2}$ " — L. d. Schwanzes etwa 1" 3 bis 4" — Höhe der Ferse 7" — L. d. Mittelzehe $3\frac{2}{3}$ " — L. d. äusseren Z. 3" — L. d. inneren Z. $2\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinterzehe $2\frac{1}{3}$ " — L. d. Mittelnagels $1\frac{5}{8}$ " — L. d. äusseren N. 1" — L. d. Hinternagels 2".

Weibchen: Auf dem Rücken nicht aschgrau wie das Männchen, sondern röthlich-olivengraubraun, die langen Federn des Unterrückens mit fahlen weisslich-grauen Spitzen; Scheitel röthlich-braun, etwas dunkler gestrichelt; Schwanz und Schulterfedern nicht so rein schwärzlich, als am Männchen, sondern mehr schwärzbraun; über dem Auge ein weissgefleckter Streifen, unter demselben sind die

Backen dunkel graubraun; Kehle weißlich; graulich queergestrichelt; Unterleib wie am Männchen.

Dieser kleine Vogel hat, wie gesagt, mit dem vorhergehenden in allen Stücken so viel Aehnlichkeit, daß man in Verlegenheit geräth, ob man beide trennen oder vereinigen soll; allein die Verschiedenheit in der Ausmessung, so wie einige Abweichungen in der Färbung beider Geschlechter, besonders des weiblichen, geben zu dem Glauben Grund, daß beide Arten verschieden sind.

14. *M. maculata.*

Der Ameisenvogel mit gestricheltem Kopfe.

A. Kopf und Nacken schwarz mit weißen Längsflecken; Oberrücken rothbräun; Schultern schwarz mit weißen Flecken; Kehle und Brust weiß mit einigen schwarzen Strichen; Unterleib bläulichgelb.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel schlank, sehr sanft gewölbt, vorn etwas zusammengedrückt und die Tomienränder ein wenig eingezogen; Hähchen klein und fein, ein kleines Zähnnchen dahinter; Kinnwinkel nicht völlig halb Schnabellänge, mäsig abgerundet, vorn beinahe nackt; Nasenloch am vorderen

ren Theile der Nasenhaut, länglich, von oben durch die Haut ein wenig überspannt; Flügel kurz, schwach, ziemlich abgerundet, die vierte und fünfte Feder die längsten, die dritte schon etwa eben so lang, die erste kurz; Schwanz schwach, schmal, zart, stark abgestuft wie bei den übrigen Arten; Beine ziemlich hoch und schlank, mit etwa sechs glatten Tafeln auf der Ferse; äussere Zehen an der Wurzel ein wenig vereint; Hinternagel gröfser als die übrigen und stark gekrümmt.

Färbung: Kopf oben und an den Seiten schwarz, mit vielen weissen Längsstrichen; Oberrücken rothbraun; Unterrücken mit langen, dichten, zarten, aschgrauen Federn bedeckt; Flügeldeckfedern schwarz, die gröfseren mit weissen Spitzen, wodurch zwei weisse, gefleckte Querstreifen an diesem Theile entstehen; oberer Flügelrand und die benachbarten Deckfedern weifs; Schwungfedern dunkel graubraun, mit feinem weifslichem Vorder- und Hintersaume; vorderer Flügelrand und innere Flügeldeckfedern blafs gelb; Schwanz schwärzlichgrau, alle Federn mit schmutzig weifslichen Spitzenrändchen; Kehle, Unterhals und Brust weifs, allein an den Seiten aller dieser Theile stehen feine schwarze Längsstriche; Bauch, Sei-

ten, After, Schenkel und Steiſs blaßgelb; Beine bleifarben; Oberkiefer bräunlich-schwarz, der untere gelblich-weiß.

Ausmessung: Länge ungefähr 3" 6" — L. d. Schnabels 5" — Breite d. Schn. $1\frac{2}{5}$ " — Höhe d. Schn. 1" — L. d. Flügels 1" 6" — L. d. Schwanzes etwa 1" 3" — Höhe d. Ferse $6\frac{2}{3}$ " — L. d. Mittelzehe $3\frac{1}{7}$ " — L. d. äußeren Z. $2\frac{3}{4}$ " — L. d. inneren Z. $1\frac{2}{3}$ " — L. d. Hinterzehe $2\frac{1}{3}$ " — L. d. Mittelnagels $1\frac{1}{3}$ " — L. d. äußeren N. 1" — L. d. Hinternagels $1\frac{2}{3}$ ".

Weibchen: Kopf weniger schwarz, dagegen mehr gelblich-weiß gestrichelt; die rothbraune Rückenfarbe ist viel weiter den Rücken hinab ausgedehnt; Unterrücken gelblich-grau; Flügel dunkel graubraun mit weniger weißen Spitzen; die Schwungfedern braun gesäumt; Schwanz aschgrau; Brust und Kehle nicht weiß, sondern blaß schmutzig gelblich, jedoch blässer als der Bauch, die Seiten dieser Theile nicht so stark schwarz gestreift; dagegen bemerkt man an dem blaß gelben Unterleibe bis zum Steiſs hinab einzelne sehr verloschen graubraune Längsstriche.

Dieser kleine Vogel ist sehr niedlich gezeichnet. Er lebt paarweise oder Familienweise

in den Wäldern, hat eine kleine, unbedeutende Stimme, und nährt sich von Insecten.

15. *M. indigotica*, Licht.

Der weifsbrüstige Ameisen vogel.

A. Obertheile schwärzlich-braun, Unterrücken rothbraun überlaufen; Brust weifs; Bauch an den Seiten rothbraun.

Beschreibung des weiblichen Vogels:

Schnabel gerade, ziemlich schlank, mit kleinem Haken und Zähnchen, vorn ein wenig zusammengedrückt, Dille sehr wenig gewölbt, Kinnwinkel beinahe halbe Schnabellänge, an der Spitze mälsig abgerundet und desselbst ziemlich nackt; Nasenloch nur sehr wenig bemerkbar, da es an der unteren Seite der rundlich aufgewölbten, erhabenen, und bis beinahe zur Mitte des Schnabels vortretenden Nasenhaut, nur als kaum merkliche Ritze gelegen ist; Flügel sehr kurz, abgerundet und schwach, Schwungfedern sehr zart, weich und abgerundet, die fünfte und sechste scheinen die längsten, die vierte ist beinahe eben so lang, die erste sehr kurz; Beine mälsig hoch, mit starken, langen Zehen, die äusseren an der Wur-

zel nur sehr wenig vereint; Hinternagel viel größer als die übrigen.

Färbung: Iris braun; Beine blafs fleischfarben; Oberkiefer und Spitze des unteren schwarzbraun, die Wurzel des unteren gelblich-weiß; alle Obertheile schwärzlich-braun, etwas rußbraun, am Unterrücken aber, der mit höchst lockeren, daunenartigen und dabei langen Federn, wie bei allen diesen Vögeln, bedeckt ist, gehen die Spitzen der Federn in's Rothbraune über, und sind verloschen dunkler quergewellt; Kinn schmutzig weißlich; Kehle graubraun, die Federn an der Spitze gelblich-grau quergewellt; Unterhals und Brust weiß, etwas mit dunkel graubraunen und graugelblichen Querwellen bezeichnet; Seiten des Halses und der Brust wie der Rücken; Flügel schwärzlich-braun, die beiden größten Ordnungen der Deckfedern mit röthlich-braunen Spitzen, wodurch zwei solche Querlinien auf diesem Theile erzeugt werden; innere Flügeldeckfedern röthlich-braun, Flügelrand schwärzlich-braun; Seiten des Vogels bis gegen die Mitte des Bauchs, so wie Schenkel und Aftergegend rothbraun, Mitte des Bauchs mit blafs weißlichen, dunkelgrau-braun quergewellten Federn.

Ausmessung: Länge 5" 11'" — L. d. Schn.

bels $5\frac{3}{4}'''$ — Br. d. Schn. $1\frac{1}{2}'''$ — Höhe d. Schn. $1\frac{1}{4}'''$ — L. d. Flügels $1'' 10\frac{1}{4}'''$ — Höhe d. Ferses $8\frac{1}{2}'''$ — L. d. Mittelzehe $6\frac{5}{8}'''$ — L. d. äußeren Z. $4\frac{1}{4}'''$ — L. d. inneren Z. $4'''$ — L. d. Hinterzehe $4'''$ — L. d. Mittelnagels $1\frac{3}{8}'''$ — L. d. äußeren N. $1\frac{1}{2}'''$ — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{4}'''$.

Männchen und Weibchen sind gleich groß.

Dieser Vogel lebt in der Gegend von *Bahia*, ist aber nicht häufig. Er hat in der Hauptsache die Vertheilung der Farben unserer Wasseramsel (*Cinclus aquaticus*).

16. *M. cinerea*.

Der buntkehlige Ameisenvogel.

A. Obertheile röthlich-olivengraun, Schulterfedern schwarz mit rostgelben Spitzen; Kehle bis zur Brust schwarz mit weißen Flecken, übrige Untertheile dunkel aschgrau.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Schnabel sehr schlank, gerade, zart, vorn mit sehr feinem, mälsig gekrümmtem Häkchen und nur sehr schwachem Ausschnitte an der Kuppe; Nasenlöcher länglich; Kinnwinkel nicht völlig halbe Schnabellänge, mälsig zugespitzt, am Vordertheile nackt, weiter zurück mit kurzen Federn bedeckt, welche Borstspitzen haben; Dille

vor dem Kinnwinkel ein wenig heraustretend, rundlich gewölbt, ziemlich stark aufsteigend; Flügel kurz, die fünfte und sechste Feder die längsten, die vierte kaum merklich kürzer, die erste kurz; Schwanz höchst kurz, gleich lang, die Federchen in der Ruhe schmal übereinander liegend; Beine mäfsig hoch, Ferse mit sechs Tafeln belegt; äufsere Zehen an der Wurzel vereint; Hinternagel bedeutend gröfser als die übrigen.

Färbung: Iris braun; Beine bleigrau; Schnabel schwarzbraun, Wurzel des Unterkiefers bleifarben; alle Obertheile des Vogels haben ein ziemlich dunkles röthliches Olivenbraun, am Rücken stark in's Rothbraune fallend; Deckfedern der Flügel oder Schultern schwarz, ihre zwei gröfsten Ordnungen mit starken rostgelben Spitzen, wodurch zwei rostgelbe Queerlinien an diesen Theilen entstehen, auch stehen an den Schultern noch einige isolirte Fleckchen; innere Flügeldeckfedern weifslich und schwärzlich gemischt; Schwungfedern und Schwanz dunkel schwärzlich-graubraun, die Vorderfahne und der äufsere Rand wie der Rücken; Kinn, Kehle und Unterhals bis gegen die Brust hinab kohlschwarz, mit netten weissen Fleckchen; Seiten des Kopfs schwärzlich und weifslich ge-

mischt; Brust und übrige Untertheile dunkel aschgrau, in der Gegend der Schenkel und des Afters olivenbraun überlaufen; Nasen- und Stirnfedern etwas in's Aschgraue fallend, etwas weißlich und schwärzlich gemischt.

Ausmessung: Länge 4" — Breite 6" 6"
— L. d. Schnabels 5" — Br. d. Schn. 1½" —
Höhe d. Schn. 1½" — L. d. Flügels 1' 11½" —
L. d. Schwanzes etwa 10 bis 12" — Höhe d.
Ferse 1½" — L. d. Mittelzehe 5½" — L. d. ä-
ußereren Z. 3½" — L. d. inneren Z. 2½" — L.
d. Hinterzehe 3" — L. d. Mittelnagels 2" —
L. d. äußeren N. 1½" — L. d. Hinternagels
2½". —

Dieser kleine niedliche Vogel lebt in den Gebüsch und Wäldern des inneren Brasilien's, scheint aber nicht häufig zu seyn.

17. *M. r u f a.*

Der rothbraune Ameisenvogel.

A. Obertheile rothbraun; Schultern schwarz mit weißen Flecken; Schwanz schwärzlich, die äußeren Federn mit weißen Spitzen; Kehle, Unterhals, Brust und Mitte des Bauchs weißlich mit schwarzen Längsflecken; Seiten und Bauch gelbröthlich überlaufen.

Beschreibung des weiblichen Vogels:

Schnabel stark, zusammengedrückt, an der Wurzel ein wenig ausgebreitet, höher als breit, Kuppe mäßig stark als Häkchen herabgekrümmt, mit sehr kleinem Zähnchen dahinter; Firste sehr sanft gewölbt und mäßig scharfkantig; Kinnwinkel breit, nicht völlig halb Schnabellänge, nur wenig abgerundet, vorn beinahe nackt; Dille sehr wenig vortretend, sanft aufsteigend; Nasenloch eiförmig, nach hinten von der übergespannten Nasenhaut begränzt; Gestalt schlank und angenehm, die Federn des Unterrückens lang, weich, höchst locker, wie an den meisten dieser Vögel; Flügel kurz, schwach, abgerundet, erste Feder sehr kurz, vierte und fünfte am längsten; Schwanz ziemlich lang, schmal, schwach, stark abgestuft; Beine mäßig hoch, stark, mit starken Zehen und Nägeln; Ferse mit sechs bis sieben glatten Tafeln belegt, ihre Sohle scharf zusammengedrückt, ebenfalls gefaltet; Nägel groß, besonders der mittlere und hintere schlank und lang.

Färbung: Iris braun; Beine bleifarben; Oberkiefer schwarzbraun; der untere bleifarben; Obertheile des Vogels röthlich-braun, auf dem Oberkopfe graubraun, an der vorderen Hälfte dunkler gefleckt; Unterrücken mit an der Wur-

zel grauen, an der Spitze röthlich-braunen Federn; Flügeldeckfedern schwarzbraun mit weissen Spitzen, wodurch unter andern auch zwei mehr oder weniger deutliche weisse Queerstreifen an diesen Theilen entstehen; vorderer Flügelbug weiss, eben so die inneren Flügeldeckfedern; Schwungfedern schwärzlich-graubraun, mit rostrothem Vordersaume, die hinteren auch mit einem solchen Hintersaume; Schwanz schwärzlich-braun, die Federn mit weissen Spitzen; von der Nase über dem Auge hin nach dem Hinterkopfe zieht eine weisse Linie, die nach hinten an ihrer Oberseite schwarz begrenzt ist; Seiten des Kopfs, Kinn, Kehle, Unterhals, Brust und Mitte des Oberbauchs weiss, mit feinen, schwarzbraunen Längsstrichen; Seiten des Körpers und Unterbauch hell, fahl röthlich-braun.

Ausmessung: Länge 4" 10'" — Breite 6" — L. d. Schnabels 5 $\frac{1}{2}$ " — Br. d. Schn. 1 $\frac{1}{4}$ " — Höhe d. Schn. 1 $\frac{1}{4}$ " — L. d. Flügels 1" 9'" — L. d. Schwanzes 1" 10'" — Höhe d. Ferse 9'" — L. d. Mittelzehe 5'" — L. d. äusseren Z. 3 $\frac{1}{3}$ " — L. d. inneren Z. 2 $\frac{2}{3}$ " — L. d. Hinterzehe 3'" — L. d. Mittelnagels 2'" — L. d. Isäueren N. 1 $\frac{1}{4}$ " — L. d. Hinternagels 2 $\frac{1}{4}$ ".

Dieser Vogel lebt im inneren Brasilien. Ich besitze ein Paar weibliche Exemplare desselben aus den inneren Gegenden der Provinz Bahid, das männliche Geschlecht ist mir von dieser Species nicht bekannt geworden.

18. *M. poliocephala.*

Der grauköpfige Ameisenvogel.

A. Oberkopf aschgrau (Scheitel am Weibchen rotbraun); Rücken olivengrau; Flügelrand am Buge weiß; obere kleine Flügeldeckfedern schwarz mit weißlichen Spitzen, die großen olivengrau mit weißlichen Spitzen; Kehle weiß; Untertheile blaßgelb.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Körper kurz und dick, Schwanz kurz, Ferse mäßig hoch. Schnabel stark und dick, höher als breit, Firste sanft gewölbt, hinter dem Häkchen ein kleiner Zahn; Kinnwinkel beinahe halb Schnabellänge, ziemlich stumpf, an der Spitze nackt, Nasenloch eiförmig, an dessen hinterem Ende spannt die Nasenhaut quer über und ist befiedert; Dille vor dem Kinnwinkel heraustretend, alsdann etwas gewölbt sanft aufsteigend; Zunge etwa halb Schnabellänge, mit kaum bemerkbar getheilter Spitze; Flügel etwas länger

als an den vorhergehenden Arten, sie erreichen ein Drittheil des kurzen Schwanzes, sind ziemlich zugespitzt, die fünfte Feder am längsten, die erste kurz; Schwanz schmal, schwach, aus zwölf nach der Spitze hin ein wenig verschmälerten Federchen bestehend; Beine ziemlich kurz und schlank, Ferse mit sechs Tafeln belegt, ihre Sohle ebenfalls getäfelt.

Färbung: Oberkiefer dunkel horngrau-braun, der untere röthlich-weißgrau; Beine weißlich-bleifarben; Iris graubraun; Augenlider an ihrem Bande mit kleinen weißlichen Wimperfederchen; Obertheil und Seiten des Kopfes und Nacken aschgrau, Gegend hinter dem Auge etwas blässer; Kehle weißlich; Obertheile des Körpers blaß grünlich-grau, oder blaß graulich-olivengrün, die langen dichten und weichen Federn des Unterrückens grau, mit grünlichen Spitzen; an dem oberen Flügelrande sind die kleinen Deckfedern weiß, die nächstfolgenden sind schwarz; und die letzte oder größte Ordnung dieser Federn ist graulich-olivengrün; Schwungfedern graubraun, an ihrer Vorderfahne graugrün, eben so der Schwanz; hinterer Rand der inneren Schwungfederfahne weißlich; Brust, Unterhals und Bauch bis zum Steiße hell limonen- oder strohgelb, an den Sei-

ten blafsgrau überlaufen; innere Flügeldeckfedern blafs gelblich.

Weibchen: In der Hauptsache wie das Männchen, aber der Scheitel rothbraun; die Flügel sind weniger grau, dagegen mehr oliven-grünlich überlaufen, man bemerkt nichts Weifses an ihren Schultern und auch die schwarzen Theile des Männchens sind hier nur graubraun. Der männliche Vogel ist ein wenig gröfser als der weibliche.

Ausmessung des Weibchens: Länge 4" 8"
— Breite 6" 10" — L. d. Schnabels 6"
— Br. d. Schn. 2" — Höhe d. Schn. 1½"
— L. d. Flügels 2" 1½" — L. d. Schwanzes 1" 3"
— Höhe d. Ferse 7½" — L. d. äufseren Z. 3½" — L. d. Mittelzehe 4½" — L. d. inneren Z. 2½" — L. d. Hinterzehe 3" — L. d. Mittelnagels 1½" — L. d. äufseren N. 1" — L. d. Hinternagels 2".

Dieser Vogel lebt still in den inneren gröfsen Urwäldern und dichten Gebüsch, und nährt sich von Insecten.

B. Mit schlankem Schnabel, und gestrecktem Nagel der Hinterzehe.

19. *M. calcarata.*

Der olivengrüne Ameisenvogel mit schwarzer Brust.

A. Oberkörper schmutzig olivengrün; Untertheile weißlich, die Brust schwarz, oft nur schwarz gefleckt; Nagel der Hinterzehe spornartig.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Schnabel ziemlich schlank, etwas dreieckig, sehr wenig zusammengedrückt, an der Wurzel etwas breit, die Firste stark kantig erhaben, sehr sanft gewölbt, Oberkiefer nur sehr wenig länger als der untere, mit kaum bemerkbarem Zähnchen hinter der Kuppe; Unterkiefer sehr flach, besonders vor der Spitze des über halb Schnabellänge haltenden Kinnwinkels, welcher sparsam befiedert ist; Dille sehr sanft gewölbt aufsteigend; Nasenloch von der Schnabelwurzel ziemlich entfernt, weit, eiförmig, an der oberen und hinteren Seite von der Nasenhaut umspannt, welche großentheils befiedert ist; Flügel nicht völlig die Schwanzmitte erreichend, die vierte Schwungfeder ist die längste, die erste ist kurz; Schwanz mälsig lang, die äußeren Federn wenig kürzer als die mittleren, daher er ausgebreitet sanft abgerundet erscheint, sei-

— L. d. Mittelnagels $2'''$ — L. d. äußeren N.
 $1'''$ — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{2}'''$.

Dieser Vogel hat in seinem Aeußeren viel Aehnlichkeit mit den Piepern (*Anthus*) und den Lerchen (*Alauda*), lebt aber in dichten Wäldern, wo er sich von Insecten ernährt, an der Erde häufig angetroffen wird, oder auf niederen Zweigen. Das weibliche Geschlecht ist mir nicht vorgekommen.

Die brasilianischen Vögel, welche ich in dieser Familie zusammengestellt habe, vereinigen mit der Bildung der Gang- oder Sitzfüße die Fähigkeit des Kletterns an Baumstämmen.

Alle von mir zu beschreibenden Arten haben ein einfach gefärbtes, meistens oliven- oder röthlich-braunes Gefieder, und nähren sich von Insecten. Das erste Geschlecht dieser Familie habe ich aus einem sonderbaren Vogel zu bilden versucht, der, sowohl in Lebensart als Gestalt, vollkommen den Uebergang von *Myiothera* zu *Dendrocolaptes* macht; sein Klettervermögen ist noch ziemlich eingeschränkt, sein Schnabel ähnelt dem der *Myiothera*, die Farbe der der *Dendrocolaptes*. Alle für die ge-

Fam. XV. Certhiadae, Vigors.

Baumläufer.

Die brasilianischen Vögel, welche ich in dieser Familie zusammengestellt habe, vereinigen mit der Bildung der Gang- oder Sitzfüße die Fähigkeit des Kletterns an Baumstämmen. Alle von mir zu beschreibenden Arten haben ein einfach gefärbtes, meistens oliven- oder röthlich-braunes Gefieder, und nähren sich von Insecten. Das erste Geschlecht dieser Familie habe ich aus einem sonderbaren Vogel zu bilden versucht, der, sowohl in Lebensart als Gestalt, vollkommen den Uebergang von *Myiothera* zu *Dendrocolaptes* macht; sein Klettervermögen ist noch ziemlich eingeschränkt, sein Schnabel ähnelt dem der *Myiothera*, die Farbe der der *Dendrocolaptes*. Alle für die ge-

Der sonderbare Vogel, welcher mich zur Bildung dieses Geschlechtes bestimmte, bildet, wie gesagt, einen deutlichen Uebergang von *Myiothera* zu *Dendrocolaptes*, er kann aber, wegen der bedeutenden Abweichung von beiden Geschlechtern, bei keinem derselben untergebracht werden, daher schien es mir zweckmäßig, ihn ein getrenntes Bindegeschlecht bilden zu lassen. Ich habe nur eine Art desselben kennen gelernt, über welche die nachfolgende Beschreibung einige Auskunft geben wird.

1. *T. fusca*. 2. *T. fusca*. 3. *T. fusca*. 4. *T. fusca*. 5. *T. fusca*. 6. *T. fusca*. 7. *T. fusca*. 8. *T. fusca*. 9. *T. fusca*. 10. *T. fusca*. 11. *T. fusca*. 12. *T. fusca*. 13. *T. fusca*. 14. *T. fusca*. 15. *T. fusca*. 16. *T. fusca*. 17. *T. fusca*. 18. *T. fusca*. 19. *T. fusca*. 20. *T. fusca*. 21. *T. fusca*. 22. *T. fusca*. 23. *T. fusca*. 24. *T. fusca*. 25. *T. fusca*. 26. *T. fusca*. 27. *T. fusca*. 28. *T. fusca*. 29. *T. fusca*. 30. *T. fusca*. 31. *T. fusca*. 32. *T. fusca*. 33. *T. fusca*. 34. *T. fusca*. 35. *T. fusca*. 36. *T. fusca*. 37. *T. fusca*. 38. *T. fusca*. 39. *T. fusca*. 40. *T. fusca*. 41. *T. fusca*. 42. *T. fusca*. 43. *T. fusca*. 44. *T. fusca*. 45. *T. fusca*. 46. *T. fusca*. 47. *T. fusca*. 48. *T. fusca*. 49. *T. fusca*. 50. *T. fusca*. 51. *T. fusca*. 52. *T. fusca*. 53. *T. fusca*. 54. *T. fusca*. 55. *T. fusca*. 56. *T. fusca*. 57. *T. fusca*. 58. *T. fusca*. 59. *T. fusca*. 60. *T. fusca*. 61. *T. fusca*. 62. *T. fusca*. 63. *T. fusca*. 64. *T. fusca*. 65. *T. fusca*. 66. *T. fusca*. 67. *T. fusca*. 68. *T. fusca*. 69. *T. fusca*. 70. *T. fusca*. 71. *T. fusca*. 72. *T. fusca*. 73. *T. fusca*. 74. *T. fusca*. 75. *T. fusca*. 76. *T. fusca*. 77. *T. fusca*. 78. *T. fusca*. 79. *T. fusca*. 80. *T. fusca*. 81. *T. fusca*. 82. *T. fusca*. 83. *T. fusca*. 84. *T. fusca*. 85. *T. fusca*. 86. *T. fusca*. 87. *T. fusca*. 88. *T. fusca*. 89. *T. fusca*. 90. *T. fusca*. 91. *T. fusca*. 92. *T. fusca*. 93. *T. fusca*. 94. *T. fusca*. 95. *T. fusca*. 96. *T. fusca*. 97. *T. fusca*. 98. *T. fusca*. 99. *T. fusca*. 100. *T. fusca*.

W. Ganzes Gefieder dunkel olivenbraun; Unerrückten mehr röthlich-braun; Schwung- und Schwanzfedern schwärzlich-braun; Kehle blässer als der übrige Unterleib.

Mairenik *) botanisch.

Beschreibung des männlichen Kogels:
 Von der Größe eines Steares, Schnabel nur wenig kürzer als der Kopf, gerade, lang gestreckt, schlank, an der Wurzel etwas breiter, von der Mitte an ein wenig zusammengedrückt,

* Durch die Nase etwas undeutlich zu sprechen.

an der Spitze sank herabgekrümmt; die Kuppe nur sehr wenig über die des Unterkiefers herabtretend; ein kleiner Ausschnitt und Zähnehaken dahinter; Firste kantig erhaben; Nasenloch länglich-eiförmig, frei, nach hinten und oben von der Nasenhaut umspannt, welche bis zu demselben befiedert ist; Unterkiefer gerade, Dille mäßig kantig, vor dem zugespitzten, befiederten, mehr als ein Drittel der Unterkieferlänge haltenden Kinnwinkel etwas heraustretend; alsdann bis zu der zugespitzten Kuppe nur sehr unmerklich aufsteigend; Zunge wie weiter oben angegeben; Bartborsten fehlen; Augenlid etwas nackt, am Rande befiedert; Körper gedrungen; Flügel mäßig lang, erreichen nicht völlig die Mitte des Schwanzes, die dritte Feder ist die längste; Schwanz ziemlich breit, mäßig lang, aus zwölf abgestuften Federn zusammengesetzt, wovon die äußerste etwa um acht Linien kürzer ist, als die mittleren, sie haben sämmtlich zugespitzte, nicht gewundene, harte Schaftspitzen, welche indessen nur wenig vortreten; Beine stark, hoch, mit langen, schlanken Zehen; Ferse mit fünf bis sechs langen Tafeln belegt, sie ist länger als die Mittelzehe; zwei äußere Vorderzehen mit einander auf die ganze Länge ihrer beiden Wurzelglieder ver-

wachsen; Zehenrücken gefälet; innerste Vorderzehe bedeutend kürzer als die äußerste, durch diesen Character weicht dieser Vogel, so wie durch den Zahn am Schnabel und die hohen Fersen, hauptsächlich von *Dendrocolaptes* ab, mit denen er übrigens viel Verwandtschaft zeigt; Hinterzehe ziemlich lang und schlank, der Nagel lang und ziemlich gestreckt, dabei sind alle Nägel zusammengedrückt.

Färbung: Iris graubraun; Schnabel am Oberkiefer schwarzbraun, am unteren horngrau; Beine schwärzlich-braun; ganzes Gefieder dunkel olivenbraun, an den Obertheilen, besonders den oberen Schwanzdeckfedern und Unterrücken mehr röthlich-braun, eben so an Stirn und Seite des Unterkiefers; Kehle etwas blässer; Bauch, After, Steiß, Schwanz und Flügel sind mehr schwärzlich-olivenbraun, die grossen Deckfedern mehr röthlich-olivenbraun gerandet.

Ausmessung: Länge 7" 8^{'''} — Breite 11" 9^{'''} — L. d. Schnabels 8½^{'''} — Br. d. Schn. 2½^{'''} — Höhe d. Schn. 2^{'''} — L. d. Flügels 8" 4^{'''} — L. d. Schwanzes 2" 6^{'''} — Höhe d. Ferse 10^{'''} — L. d. Mittelzehe 9½^{'''} — L. d. äusseren Z. 6^{'''} — L. d. inneren Z. 5½^{'''} — L. d. Hinterzehe 5^{'''} — L. d. Mittelnagels

2 1/2 Zoll. In der äußeren Nahe des Lids Hinter-
nagels 3 1/2 Zoll. — (In der äußeren Nahe des Lids Hinter-
nagels 3 1/2 Zoll.) Gefärbt wie das Männchen, der
Unterrücken aber mehr rothbraun, die Kehle
mehr weißlich-grau, mit dunkleren Federrän-
den, die Brust röthlich-braun, und der Un-
terleib heller olivenbraun. An dem in meiner
zoologischen Sammlung aufgestellten Paare hat
das Weibchen den Schnabel um eine Linie län-
ger als das Männchen. Solche Vögel kommen
in diesen sonderbaren Vögeln, die in den dick-
sten, geschlossenen Wäldern meistens einzeln
oder paarweise an der Erde, wo er im trocke-
nen Laube umherläuft, und mit seinem schlän-
ken, langen, degenförmigen Schnabel nach In-
secten, Spinnen und ähnlichen kleinen Thieren
sucht. Er hat dabei die Eigenschaft, die Blätter
mit seinem Schnabel aufzuwickeln, umzudre-
hen, und selbst häufig in die Höhe zu werfen,
woher der von mir beigelegte Name. Man fin-
det diese Vögel auch häufig an dem unteren
Theile alter Waldstämme in hängender Stel-
lung oder kletternd, doch ist ihr Kletterver-
mögen noch eingeschränkt; denn sie wagen
sich an den Stämmen nicht hoch hinauf und
kehren immer bald wieder auf den Boden zu-
rück. — Dieses Beginnen des Klettervermö-

gen, mit einer der Bildung der Myiotheren ähnlichen Gestalt vereint, macht diese Vogelart völlig geeignet, ein Bindeglied zwischen obigem Geschlechte und dem Banthacker (Dendrocolaptes) abzugeben, mit welchem sie durch Farbe, Stimme, Flügel, Schwanz u. s. w. verwandt ist. Eine Stimme habe ich selbst von unserem Vogel nie gehört, doch haben uns die brasilianischen Jäger versichert, daß sie aus mehreren feinen, hohen, öfter wiederholten Tönen besteht. — Wenn man sich in der Nähe eines solchen Vogels befindet, und aufmerksam stille stand, so hörte man ihn beständig raschen, indem er das trockene Laub durchwühlte, umwandte und um sich her warf. Ich erhielt den ersten dieser Vögel in den Urwäldern am Flusse Itabapuna, also unter dem 21sten und 22sten Grade südlicher Breite, mehr nach Norden kam er mir noch öfter vor. Die Bötötuden, in deren Wäldern am Flusse Belmonte er nicht selten ist, nennen ihn *Mairenik*, indem sie dieses Wort undeutlich durch die Nase aussprechen. — Ich habe auch noch von einem andern Vögel gehört, welcher sehr ähnlich ist, doch nicht so häufig vorkommt, und dessen Stimme ich nicht gehört habe. Er ist ebenfalls sehr ähnlich dem Banthacker, doch etwas kleiner, und hat einen etwas andern Schwanz. Er kommt ebenfalls in den Urwäldern am Flusse Belmonte vor, und ist dort ebenfalls nicht selten. Ich habe ihn auch in den Wäldern am Flusse Itabapuna gesehen, doch nicht so häufig. Er ist ebenfalls sehr ähnlich dem Banthacker, doch etwas kleiner, und hat einen etwas andern Schwanz. Er kommt ebenfalls in den Urwäldern am Flusse Belmonte vor, und ist dort ebenfalls nicht selten. Ich habe ihn auch in den Wäldern am Flusse Itabapuna gesehen, doch nicht so häufig.

Gen. 88. *Dendrocolaptes*

Drechselspecht

Lichtenstein hat in seiner Abhandlung über *Dendrocolaptes* eine Species dieses Genus unter dem Namen *turdinus* aufgeführt, welche sich durch ihren Schnabelbau sehr von den wahren Baumhackern unterscheidet. Ich würde für sie den von *Viellot* gegebenen Namen *Dendrocopus* gewählt haben, wenn *Bois* nicht denselben anderweitig benutzt hätte.

Die Characterzüge des genannten Genus lassen sich auf folgende Art feststellen:

Schnabel: stark, gerade, etwa so lang als der Kopf, oder etwas kürzer, breiter als hoch, nicht zusammengedrückt, Firste sanft abgerundet, gerade, an der Spitze zu einem etwas überstehenden Häkchen hinabgewölbt, ohne Zahn oder Ausschnitt; Tomienrand nur wenig eingezogen; **Nasenloch** basal, lateral, mit einer flachen Haut bedeckt, ritzenförmig; **Nasenhaut** befiedert; **Dille** an der Wurzel abgeflacht, sehr wenig aufsteigend, vor der Spitze etwas kantig.

Zunge: halb so lang oder zwei Drittheile des Schnabels erreichend, an der hornartigen Spitze zuweilen etwas gefrants't, zuweilen bloß ein wenig getheilt.

Flügel: mäßig lang, erreichen etwa ein Dritttheil des Schwanzes, die vierte Schwungfeder ist die längste.

Schwanz: stark, aus zwölf etwas Weniges abgestuften Federn, daher ausgebreitet abgerundet; Spitzen der halbsteifen Schäfte zugespitzt, und etwas vortretend, nicht vollkommen gewunden, sondern nur etwas gebogen.

Beine: ziemlich hoch und schlank, zwei äußere Vorderzehen auf anderthalb Gelenke lang an ihrer Wurzel vereint, gleich lang.

Der von mir für dieses Geschlecht von *Dendrocolaptes* abgesonderte Vogel hat etwa den Schnabel eines Fliegenfängers; es fehlt ihm hierzu aber der Zahn und die Bartborsten, übrigens ist seine Lebensart die des nachfolgenden Geschlechts *Dendrocolaptes*; er macht also einen vollkommen natürlichen Uebergang von dem vorhergehenden zu dem nachfolgenden Genus. —

1. *D. turdinus*.

Der rotschwänzige Drösselspecht.

D. Ganzes Gefieder ungesfleckt olivenbraun; Schwanz dunkel rothbraun; Spitzen der Schwungfedern dunkel graubraun; Kehle fahl röthlich-gelb; manche

Individuen am Kopfe mit verloschenen gelblichen
Schaftstrichen.

Dendrocolaptes turdinus, Licht.

Beschreibung des männlichen Kogels

Größe einer Singdrossel. Schnabel gerade, stark,
etwas dick, wie an einem starken Fliegenfänger
(*Muscicapa*), beinahe kegelförmig, ein wenig
kürzer als der Kopf, Oberkiefer mit geraden,
sanft rundlich kantiger Firste, welche an der
Spitze zu einem ein wenig übertretenden Häk-
chen sich hinab wölbt, ohne Zahn oder Aus-
schnitt; Nasenöffnung mit einer flachen Haut
bedeckt, in welcher das lange, ritzenförmige
Nasenloch steht, die Haut großentheils befie-
dert; Kinnwinkel so weit vortretend als das Na-
senloch, mäßig zugespitzt, befiedert; Dille an
der Wurzel sanft rundlich abgeflacht, nachher
nur höchst sanft aufsteigend, nur vor der ein-
wenig hinabgesenkten Spitze sanft kantig; die
Zunge erreicht mit der Spitze zwei Drittheile
der Schnabellänge, oder die Hälfte, sie ist vorn
ein wenig gespalten und nicht gefranst, zuwei-
len etwas getheilt und gefranst; Augenlid ein
wenig nackt, oder nur sparsam mit Pinselfeder-
chen besetzt; die Flügel erreichen noch nicht
ein Drittheil der Schwanzlänge, die vierte
Schwungfeder ist die längste; Schwanz stark,

aus zwölf etwas Weniges abgestuften Federn bestehend, die äußerste ist um neun Linien kürzer als die mittleren, ausgebreitet erscheint er also stark abgerundet; die Federschäfte sind ziemlich steif, ihre Spitzen sind fein stachelartig zugespitzt, und treten etwas vor, sie sind nicht gewunden, haben aber dennoch eine kleine Neigung abwärts, wodurch sie den Uebergang zu der Schwanzbildung der nachfolgenden Vögel bilden; beide Fahnen sind an ihrem Rande nur wenig ungleich; Beine ziemlich hoch und schlank; Ferse mit fünf glatten Tafeln belegt; zwei äußere Zehen auf anderthalb Wurzelgelenke lang vereint, gleich lang, die innerste kürzer; Hinternagel größer als die übrigen.

Färbung: Schnabel blafs horngrau, an Fiste und Wurzel des Oberkiefers bräunlich; Rachen orangengelb; Iris graubraun; Beine bleifarben; ganzer Körper unansehnlich olivenbraun, an den Untertheilen etwas blässer, und auf dem Kopfe, besonders der Stirn, mit sehr feinen, oft kaum bemerkbaren gelblichen Schaftstrichen; Kehle blässer als die übrigen Untertheile, etwa gelbröthlich oder gelblich-fahl olivenbraun; Schwungfedern mehr röthlich-olivenbraun, an der hinteren Fahne rostroth, und an der Spitze breit dunkel graubraun, eine

Farbe, die an den vorderen Schwungfedern auch die Vorderfahne einnimmt; Schwanz gänzlich rothbraun, auf der Oberfläche dunkler als an der unteren, Schäfte auf ihrer Oberseite schwarzbraun, auf der unteren röthlich.

Ausmessung: Länge 8" 3''' — Breite 11" 11''' — L. d. Schnabels 9 $\frac{1}{2}$ ''' — Br. d. Schn. 3''' — Höhe d. Schn. 2 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Flügels 3" 10''' — L. d. Schwanzes 3" 3''' — Höhe d. Ferse 10''' — L. d. Mittelzehe 6''' — L. d. Hinterzehe 3 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. äußeren Z. 6''' — L. d. inneren Z. 4''' — L. d. Mittelnagels 2 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. äußeren N. 2 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinternagels 3''' —

Weibchen: Nicht bedeutend verschieden; die helleren Schaftstriche des Kopfes, die man bei dem andern Geschlechte kaum bemerkt, sind hier deutlicher und mehr ausgedrückt, und sogar der Unterhals ist mit ihnen bezeichnet; *Lichtenstein* scheint daher in seiner *Monographie* (pag. 8) einen weiblichen Vogel vor sich gehabt zu haben. Das Weibchen ist in seinen Farben ein wenig heller als das Männchen, doch ist die Verschiedenheit kaum zu bemerken; dabei sind seine Beine schmutzig bräunlich-bleifarbig; Flügeldeckfedern hell gelblich-rosth.

Ausmessung: Länge 8¹¹ 3¹¹, —

Dieser Vogel ist mir in allen brasilianischen Urwäldern vorgekommen, obgleich nirgends häufig. Am *Itabapua* erhielt ich den ersten Vogel dieser Art, nördlich am Flusse *Catolê* in den Wildnissen an der alten Waldstrasse des *Capitão Filisberto* das Weibchen. Er ist ein stilles einsames Thier, das sich in der Lebensart von dem nachfolgenden Geschlechte nicht unterscheidet.

Gen. 39. Dendrocolaptes, Herrm.

B a u m h a c k e r.

Dieses von *Herrmann* zuerst gebildete, von *Illiger* wieder eingesetzte *Genus*, besteht aus verschiedenen, theils in anderen Geschlechtern vertheilt gewesenen, theils von *Azara* und Andern neuentdeckten Vögeln, und wir verdanken *Lichtenstein* die erste gründliche Aufzählung der jetzt etwa bekannten Arten desselben. Er gab in den Schriften der Berliner Academie eine Abhandlung über die Gattung *Dendrocolaptes*, die allgemein bekannt ist, und auf welche ich mich hier beziehen muß, um nicht durch Wiederholung unnöthig den Umfang die-

der Blätter zu vermehren. *Illiger* stellte diese Vögel nach den Characteren der Füße und des Schwanzes zusammen, nahm aber auf die Bildung des Schnabels gar nicht Rücksicht, welcher in den verschiedenen Species oft so verschieden, daß man genöthiget ist, mehrere Geschlechter aus diesem einen zu bilden. Ich glaube mich vollkommen berechtigt, *Lichtenstein's Dendrocolaptes turdinus, trochilirostris* und *cuneatus*, so wie *Temminck's sylviellus* von den übrigen zu trennen, da ihr Schnabelbau von dem der eigentlichen Baumhacker gänzlich abweicht, für welche ich nachfolgende Charactere zusammenstelle:

Schnabel: kürzer oder länger als der Kopf, gerade oder mehr oder weniger sanft gekrümmt, sehr stark zusammengedrückt, messerförmig, zugespitzt, Kiefferränder auf einander passend, zuweilen etwas eingezogen; *Nasenlöcher* basal, lateral, rundlich oder länglich, frei.

Zunge: kürzer als der Schnabel, nicht ausdehnbar, an der Spitze hornartig, oft ganzrandig, oft ein wenig getheilt.

Flügel: mittelmäßig lang, die dritte oder vierte Schwungfeder die längste, die erste kurz.

Schwanz: stark, mit steifen Schäften, deren stachelartig vortretende Spitzen abgeplattet

und etwas nach unten und außen gewunden sind; innere Fahne vor der Spitze rundlich abgestutzt, von der äußeren Fahne dehnen sich kurze, schwache Bärtchen bis beinahe zur Federspitze aus.

Beine: Beide äußere Vorderzehen länger als die innere, gleich lang.

Die meisten mir bekannten auf diese Art gebildeten Vögel haben ein einförmiges unansehnliches Gefieder, röthlich-braun, zum Theil an Kopf, Hals und Untertheilen etwas weißlich oder gelblich geperlt oder gestrichelt, welches in mehreren Species kaum verschieden ist, und sie gehören in dieser Hinsicht zu den von mir schon öfters erwähnten Wiederholungen thierischer Formen in Brasilien. Bei dieser Einförmigkeit und Aehnlichkeit des Gefieders würden die Baumhacker sehr schwer zu unterscheiden seyn, wenn nicht ihr Schnabelbau und ihre Größe so mannichfaltig abwechselten. Der erstere wird mir Gelegenheit geben, sie in ein Paar Unterabtheilungen zu bringen.

Die Lebensart der Baumhacker ist von *Azara* schon in den Hauptzügen angegeben, sie unterscheidet sich wenig von der unserer Spechte und Baumläufer. Sie sind einsame, stille, phlegmatische Vögel, die nur immer an den Stäm-

men klettern, und welche ich nie auf einem Aste aufrecht sitzen gesehen habe, wie *Buffon* und andere Naturforscher sie abbildeten, sondern die selbst, um auszuruhen, in kletternder Stellung gefunden werden. Sie sind Bewohner der großen Urwälder, wo sie in der Brütezeit gepaart, übrigens einsam ihrer Nahrung nachgehen, die in Insecten besteht, so wie in deren Larven und Eiern, welche man in Brasilien überall in den Ritzen der Rinden, in dem Moose, und selbst an glatten Stellen der Stämme findet. Die größeren Arten, mit starkem, sanft gekrümmtem Schnabel pochen hackend an den alten Waldstämmen, gleich den Spechten. Sie haben zum Theil eine laute, zum Theil eine leisere, kurze, ganz spechtartige Stimme, nisten in hohlen Bäumen, und sollen weißse Eier legen. Oft habe ich diese Vögel stundenlang an einer Stelle hängen gesehen, wo sie sich ohne Mühe mit der Flinte erlegen liessen. Die Brasilianer nennen sie Specht (*Pica-Pao*), und erlegen die großen Arten wie die letzteren, um sie zu essen. Beide Geschlechter sind bei diesen Vögeln, wie schon *d'Azara* bemerkt, wenig verschieden, daher äußerlich nicht leicht zu unterscheiden. Sie sind über den größten Theil von Südamerica, manche Arten von *Guia-*

na bis *Paraguay* ausgebreitet, und ersetzen in jenen Urwäldern die dort fehlenden wahren Baumläufer (*Certhia*), mit welchen einige Arten allerdings viel Aehnlichkeit haben, von welchen sie sich aber dennoch durch die gedrehten Schwanzfederspitzen unterscheiden. In *Azara's* Werk (Französische Uebersetzung) tragen sie die Benennung *Pic-Grimpereau*. Ich habe in meinem Verzeichnisse fünf Arten von ihnen beschrieben, welche ich der Bildung ihres Schnabels zu Folge in zwei Unterabtheilungen bringe.

A. *Baumhacker mit starkem, sanft gewölbtem, zusammengedrücktem Schnabel, der länger ist als der Kopf.*

1. *D. guttatus*, Licht.

Der ö l i v e n b r a u n e B a u m h a c k e r .

B. Schwanz dunkel röthlich-braun; Körper olivenbraun; Kehle gelblich-weiß; Kopf und Bart schwärzlich-braun, mit hell gelblichen länglichen Fleckchen; Brust mit schmalen, länglichen, blafs gelblichen Schaftflecken; Bauch schwärzlich queergewölbt.

? *Dendrocolaptes nigrirostris*, Illig.

? — — *decumanus*, Spix.

Hmin-Hmin botocudisch.

Beschreibung des männlichen Vogels: Ein

starker Vogel, mit starkem Schnabel, Füßen und Klauen. Schnabel länger als der Kopf, beinahe gerade, messerförmig, die Firste sanft abgerundet, nach der Spitze hin sanft hinabgewölbt; Schnabel von der Nase an zusammengedrückt, in der Mitte der Tomienränder ein wenig eingezogen; Oberkiefer mit seiner Kuppe bis auf die des Unterkiefers hinab gebogen; Nasenöffnung eiförmig, in einer Vertiefung an jeder Seite der Oberkieferwurzel, die Federn treten bis gegen die Oeffnung vor; Kinnwinkel etwa ein Dritttheil der Schnabellänge, mäßig zugespitzt, befiedert; Dillenkante mäßig scharf; Auge lebhaft, die Augenlider mit kleinen Pinselfederchen besetzt; Beine hoch und stark, die Ferse mit fünf glatten Tafeln belegt, ihre Sohle schildschuppig; Zehen lang, stark; die beiden gleich langen vorderen Nebenzehen nicht viel kürzer als die Ferse, dabei an ihrer Wurzel in der Länge eines Gliedes mit einander verwachsen; Klauen bogenförmig, stark, zusammengedrückt, scharf, völlig wie an *Picus*; Flügel ziemlich kurz, erreichen etwa ein Dritttheil des Schwanzes, die dritte Feder ist die längste; Schwanz ziemlich lang, stark, durch die starken Schäfte steif, abgestuft, mittlere Federn etwa um anderthalb Zoll länger als die äulse-

ren, welche nur zugespitzte, aber nicht so deutlich gewundene Schäfte haben; Schäfte der übrigen Federn zugespitzt, und an der Spitze ein wenig nach außen gewunden, auch ist an der äußeren Seite der Spitze die Fahne nur kurz, zum Theil von den Stämmen abgenutzt.

Färbung: Schnabel schwarzbraun; Iris graubraun; Beine und Klauen von einer gelblich-grauen Farbe; Scheitel, Nacken, Ohrgegend und Bart an der Wurzel des Unterkiefers schwärzlich-braun, mit netten, hell gelblichen, länglichen Schaftflecken, die am Oberhalse bis zum Rücken gefunden werden; Zügel weißlich-gelb, Ohrgegend mit dieser Farbe matt gestrichelt; zuweilen bilden die gelblichen Flecken hinter dem Auge noch eine Art von Strich; Kehle bis zum Unterhalse ungefleckt gelblich-weiß; alle Obertheile sind olivenbraun, an den Schwung- und großen Flügeldeckfedern röthlich-braun überlaufen; Schwungfedern rostroth, an der Vorderfahne und Spitze olivenbraun; Schwanz von einem ungemischten, dunkel röthlichen Braun, an seiner unteren Fläche heller, mehr roströthlich, wie die Schäfte; Unterhals und Brust auf einem fahl olivenbraunen Grunde, mit verloschenen, weißgelblichen Schaftflecken bezeichnet, welche wieder sehr nett schwärz-

lich eingefasst sind; Bauch und Schenkel ein wenig mehr in's Gelbliche fallend; und mit vielen netten schwarzbraunen Queerstreifen gewellt; Steifs eben so, und dabei mit deutlichen hellgelben Schaftlinien.

Ausmessung: Länge 10" 5''' — Breite 18" 4''' — L. d. Schnabels (so weit er auf der Firs-
te entblöst ist) 1" 7''' — Höhe d. Schn. 4'''
— Br. d. Schn. 4''' — L. d. Flügels 4" 8¼''' —
L. d. Schwanzes 4" 5''' — Höhe d. Ferse 1"
— L. d. Mittelzehe 11''' — L. d. äusseren Z.
9½''' — L. d. inneren Z. 5½''' — L. d. Hinter-
zehe 5''' — L. d. Mittelnagels 4¼''' — L. d.
äusseren N. 4½''' — L. d. inneren N. 4''' — L.
d. Hinternagels 5'''.

Weibchen: Nicht bedeutend kleiner als das Männchen; der Schnabel ist weniger dunkel gefärbt, mehr verloschen schwärzlich - grau; Oberseite des Schwanzes etwas mehr hell rothbraun, und die Untertheile weniger nett und deutlich gezeichnet, indem die Flecken der Brust und des Unterhalses auf einem mehr fahl grau-braunen Grunde auch sehr verloschen angegeben sind, und ihnen die feine, schwärzliche Einfassung fehlt.

Dieser große, starke Baumhacker lebt in allen von mir besuchten großen Waldungen,

und ist nicht selten. Ich fand ihn südlich in der Gegend von *Rio de Janeiro*, *Cabo Frio*, am *Espirito Santo*, überall wo geschlossene Waldungen sich zeigten, und ich habe ihn selbst den menschlichen Wohnungen sehr nahe kommen sehen. Er ist nicht schüchtern, und wird leicht geschossen. Seine Stimme ist ein mehrmals wiederholter heller Kehllaut, und gleicht vollkommen der des europäischen Grünspechts (*Picus viridis*, Linn.). Die Brasilianer unterscheiden diesen wie die nachfolgenden Vögel nicht von den eigentlichen Spechten, und nennen sie, wie diese, *Pica-Paa*. Die Botocuden belegen die Baumhacker mit der allgemeinen Benennung *Hmin-Hmin*, undeutlich durch die Nase ausgesprochen.

Herr Professor *Lichtenstein*, der ein Paar dieser Vögel in meiner ornithologischen Sammlung sah, bestimmte sie für seinen *Dendrocopates guttatus*, dennoch finde ich in der Abhandlung dieses gelehrten Reisenden, die Länge seines *guttatus* nur zu acht und einem halben Zoll angegeben, und die des Schnabels zu anderthalb Zoll, welche erstere geringere Länge vielleicht durch das Ausstopfen des Vogels verursacht worden seyn kann. *Lichtenstein* citirt zu seinem *guttatus* den *Pic-grimpereau com-*

mun des Azara, der mir aber doch von meinem Vogel sehr abzuweichen scheint. Spix's *Dendrocolaptes decumanus* (Tab. 87.) scheint der von mir hier beschriebene Vogel zu seyn; allein sein Schnabel wird auf zwei Zoll lang angegeben, da er bei meiner Species nur anderthalb Zoll misst, welches aber von der Art das Maafs zu nehmen, herkommen kann. Sind beide Vögel identisch, so ist die Abbildung zu sehr graubraun, und nicht hinlänglich röthlichbraun gehalten.

2. *D. obsoletus*, Licht.

Der dünnzehige Baumhacker.

B. Kehle hell gelb; Schwung- und Schwänzfedern rothbraun; Körper gelblich-graubraun, Kopf, Hals und Brust mit länglichen gelblich-weißen Flecken; Schnabel lang, stark, sanft gewölbt, der Unterkiefer weißlich.

Lichtenstein über die Gattung *Dendrocolaptes* pag. 7.

Beschreibung des männlichen Vogels: Schnabel länger als der Kopf, etwa gebildet wie an der vorhergehenden Art, aber im Verhältniß länger, schlanker und weniger hoch; Nase bis zu der Oeffnung befiedert; der Oberkiefertrand tritt über den unteren vor; Kinnwinkel

mälsig spitz, befiedert, die Schnabelspitze an meinem Exemplare defect; Augenlid ein wenig nackt; Beine wie an der vorhergehenden Art, Zehen schlank und dünn; Nägel stark; Ferse mit fünf Tafeln, ihre Sohle mit kleineren Schildschuppen belegt; die Flügel erreichen etwa die Mitte des Schwanzes, der etwa die Bildung wie an No. 1. hat.

Färbung: Oberkiefer dunkel brännlich-fahl, der untere schmutzig weißlich; Iris graubraun; Beine wie an der vorhergehenden Art; Kehle hell röthlich-gelb und ungefleckt; ganzer übriger Rumpf von einer gelblich-graubraunen Farbe, am Kopfe etwas mehr in's Schwärzliche, am Bauche mehr in's Olivenbräunliche ziehend, aber an Kopf, Oberhals, Oberrücken, Unterhals und Brust mit schmutzig weißgelben Längsflecken bezeichnet, die am Kopfe kleiner, mehr nett und lebhaft abgesetzt, an Brust und Unterhals länger und mehr verloschen sind; Bauch und Steiß ungefleckt; Flügel und Schwanz rothbraun, die Schwung- und Schwanzfedern am dunkelsten; vordere Schwungfedern rothbraun mit graubraunen Spitzen.

Ausmessung (nach einem ausgestopften Exemplare): Länge etwa 8" — L. d. Schnabels etwa 1 1/2" bis 5''' — Breite d. Schn. 2 1/2''' —

Höhe d. Schn. 3''' — L. d. Flügels 4'' — L. d. Schwanzes 3'' 4''' — Höhe d. Ferse 8 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Mittelzehe 5 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äußeren Z. 5 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. inneren Z. 3''' — L. d. Hinterzehe 3 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Mittelnagels 3 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äußeren N. 3 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Hinternagels 3'''.

Dieser Vogel hat im Allgemeinen die Lebensart und Manieren der vorhergehenden, ist mir aber nicht so häufig vorgekommen, und ich besitze nur ein Exemplar, dessen Schnabelspitze etwas defect ist. Herr Professor *Lichtenstein* hielt dieses Individuum, bei seiner Anwesenheit, für den *obsoletus* des Berliner Museums.

3. *D. tenuirostris*, Licht.

Der dünn schnäblige Baumhacker.

B. Schnabel etwas länger als der Kopf, schlank; Schwanz und Unterrücken rothbraun; Kehle und Unterhals weißlich; Kopf und Hals graubraun, mit gelblich-weißen Perlflecken bezeichnet, die meist dunkler eingefasst sind; Bauch gefleckt.

Dendrocolaptes Wagleri, Spix Tab. XC. Fig. 2.

Lichtenstein über die Gattung *Dendroc*, pag. 6.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel nur sehr sanft gewölbt, schlank,

schmal zusammengedrückt, zugespitzt, Oberkiefer am Tomienrande nur wenig eingezogen; Kinnwinkel ziemlich zugespitzt, befiedert, tritt kaum über das Nasenloch hinaus; Augenlid nur wenig nackt; Schwanz stark, mit sehr gewundenen Schaftspitzen, die Flügel erreichen etwa ein Dritttheil desselben; Ferse mit fünf bis sechs Schildtafeln belegt; Zehen lang und schlank.

Färbung: Oberkiefer dunkel bräunlich-bleifarben, der untere weißlich; Iris graubraun; Beine bleifarben; Scheitel, ganzer Oberkopf, Hals und Rücken bis zu seiner Mitte röthlich-olivenbraun, eben so Schultern und Flügeldeckfedern, Kopf und Oberhals dunkel graubraun überlaufen, aber überall, und selbst bis zur Mitte des Rückens mit hell röthlich-gelben Schaftflecken bestreut, welche am Kopf kleiner und mehr gelb, am Rücken mehr länglich, an der Spitze breiter, und rundum fein schwärzlich begränzt sind; über oder vielmehr hinter dem Auge zeigt sich bei einigen Individuen mehr, bei andern weniger, ein von den weißlichen Flecken gebildeter, undeutlicher Längsstreifen, der sich an der Seite des Halses verliert, unter demselben ist der Backen und die

Ohrgegend ein wenig schwärzlich-braun, mit helleren Fleckchen und Strichen; Kehle ungefleckt gelblich-weiß; Brust gelblich-weiß, so wie der Unterhals, allein alle Federn mit einem dunkel graubraunen Saume eingefasst; Bauch, After und Steiß gelblich-graubraun, mit verloschenen, länglichen, gelblich-weißen Flecken; Schwungfedern rothbraun, ihre Spitzenhälfte an der hinteren Fahne graubraun, hintere kurze Schwungfedern gänzlich rothbraun; Unterrücken, obere Schwanzdeckfedern und der Schwanz selbst sind lebhaft rothbraun, die Federn des letztern an ihrer unteren Fläche blässer, ihre Kiele ebenfalls rothbraun.

Ausmessung: Länge ungefähr 5" 9''' — Breite 8" 1''' — L. d. Schnabels 10''' — Höhe d. Schn. 2''' — Br. d. Schn. 2''' — L. d. Flügels 3" 1''' — L. d. Schwanzes etwa 2" 6''' — Höhe d. Ferse $7\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Mittelzehe $4\frac{2}{3}$ ''' — L. d. äußeren Z. $4\frac{2}{3}$ ''' — L. d. inneren Z. $2\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinterzehe $2\frac{4}{5}$ ''' — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äußeren N. $2\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Hinternagels $2\frac{4}{5}$ ''' . —

Weibchen: Ich habe zufällig nur männliche Vögel dieser Species erhalten, allein bei allen diesen Vögeln sind beide Geschlechter nur

sehr wenig verschieden, und das Weibchen zeichnet sich durch geringere Lebhaftigkeit der Färbung und mehr verloschene Flecke aus.

Dieser Baumhacker ist gemein in den von mir bereis'ten Brasilianischen Wäldern, findet sich auch in mehr gemischten offenen Gegenden, und kommt selbst, wie unsere *Certhia familiaris*, den Wohnungen nahe. Seine Stimme ist ein kurzer Lockton. Er ist nicht schüchtern, sucht an den Stämmen und Zweigen die Insecten ab, wo es ihm an Ameisen, Spinnen, Termiten und dergleichen Thieren nicht fehlt. Sein Flug ist kurz und bogenförmig von einem Stamme zu dem andern. Dr. v. Spix giebt eine ziemlich gute Abbildung dieses Vogels, allein die weißlichen Flecken sind nicht deutlich genug angegeben, auch ist die Iris in der Natur anders gefärbt.

4. *D. rufus*.

Der rothbraune Baumhacker mit weißlichen Untertheilen.

B. Scheitel dunkel graubraun, mit gelblichen Schaftstrichen; durch das Auge ein schwärzlich-graubrauner, und über demselben ein breiter gelblich-weißser Streifen; Obertheile rostroth; Untertheile

gelblich-weiß, höchst verloschen gefleckt; Spitzen der Schwungfedern graubraun.

? *Le Pic-Grimpereau commun d'Azara, Voyag. Vol. III. pag. 472.*

Dendrocolaptes bivittatus, Spix Tab. 90. Fig. 1.

Beschreibung des männlichen Vogels: Ein sehr schöner Baumhacker. Schnabel etwas länger als der Kopf, schlank, sanft gekrümmt, stark zusammengedrückt, Oberkiefer nur sehr wenig länger als der untere, Firste und Dille mälsig scharf kantig, die Nase bis zu der Oeffnung befiedert; Kinnwinkel kurz und befiedert; Zunge kurz, ihre Spitze erreicht noch nicht ein Drittheil der Schnabellänge, ist schmal und sehr zugespitzt, ganzrandig, glatt, aber so fein und hornartig dünn, dals sie durchsichtig ist, wie ein Mohnblatt; Augenlider ein wenig nackt; Flügel mälsig stark, erreichen gefaltet noch nicht ein Drittheil der Schwanzlänge, die dritte Feder ist die längste; Beine mälsig stark, ziemlich schlank, die Ferse ein wenig unter der Fußbeuge befiedert und alsdann an ihrem nackten Theile mit vier glatten Tafeln belegt; Hinternagel stärker als die vorderen; Schwanz stark, breit, etwas abgestuft, die äußerste Feder etwa neun Linien kürzer als die mittleren, ihre Spitzen etwas gewunden, mit spitzigem,

aber mäßig steifem Stachel, an der äußeren Seite mit abnehmender Fahne.

Färbung: Schnabel am Oberkiefer blaß graubraun, Unterkiefer weißlich-grau; Iris graubraun; Beine gelblich-grau; ein Streifen durch das Auge bis hinter das Ohr, so wie der ganze Oberkopf bis in den Nacken haben eine schwärzlich-graubraune Farbe, auf dem ganzen Kopfe mit schmalen, gelbröthlichen Schaftstrichen bezeichnet; auf der Nase entspringt ein breiter, gelblich-weißer Streifen, der über dem dunkeln Augenstreifen hinläuft, und sich an der Seite des Hinterkopfes verliert; Kinn, Kehle, Backen, Unterhals und Brust sind ungefleckt gelblich-weiß, die übrigen Untertheile beinahe eben so, nur ist die Farbe an diesen Theilen etwas dunkler, mehr graugelblich, und man bemerkt bei genauer Betrachtung an den Seiten der Brust und des Bauches sehr verloschen dunklere Ränder an den Federn, wodurch eine blasse Zeichnung entsteht, die man aber kaum bemerkt; Steiß fahl gelbröthlich, ohne alle Flecken; alle Obertheile des Vogels vom Nacken an sind ohne anderweitige Zeichnung hell lebhaft rostroth, an Rücken, Schwanz und Flügeln ganz gleich, nur sind die Spitzen der vorderen und mittleren Schwungfedern an der hinteren Fahne dunkel

graubraun, auch haben einige der großen Deckfedern diese Farbe; innere Flügeldeckfedern röthlich - gelb, lebhafter als der Unterleib; Schwungfederschäfte schwärzlich.

Ausmessung: Länge 8" 2''' — Breite 10" 8''' — L. d. Schnabels 1" — Br. d. Schn. 2''' — Höhe d. Schn. 2''' — L. d. Flügels 3" 6''' — L. d. Schwanzes 2" 11''' — Höhe d. Ferse 6½''' — L. d. Mittelzehe 4½''' — L. d. äußeren Z. 4½''' — L. d. inneren Z. 2½''' — L. d. Hinterzehe 3½''' — L. d. Mittelnagels 2½''' — L. d. äußeren N. 2½''' — L. d. Hinternagels 3'''.

Weibchen: Ist mir nicht vorgekommen, es dürfte aber von dem männlichen Vogel nur wenig verschieden seyn.

Dieser schöne Baumhacker lebt im Sertong oder den inneren Gegenden der Provinzen *Minas* und *Bahia* auf den hohen Rücken in Gebüsch und Waldungen, also selbst in den *Catingas* und *Carascos* (Niederwaldungen), wo man ihn an alten Stämmen picken und hacken sieht. Er scheint den an den Baumstämmen in zahlreichen Colonnen auf- und abziehenden Ameisen nachzustellen, so wie die meisten *Dendrocolaptes* mit gekrümmtem Schnabel. Selten ist dieser Vogel nicht, ob ich gleich zufällig nur wenige Exemplare desselben erhielt.

Diese Species hat viel Ähnlichkeit mit *Azard's Pic - Grimpereau commun* (Vol. III. pag. 1412), oder dem *Pic - Grimpereau à bec court*, welche wahrscheinlich zu ein und derselben Species zu gehören scheinen, und ich mals sie dafür halten. *Lichtenstein* bezieht diesen Vogel des spanischen Ornithologen auf seinen *Dendroc. guttatus*, allein wenn die Bestimmung richtig ist, welche *Lichtenstein* meinen Exemplaren der unter No. 1. aufgeführten Species gab, so kann *Azard's* Vogel nicht zu *guttatus* gehören, da meine Exemplare des letzteren und mein *rufus* sehr verschieden von einander sind. *Spix* bildet die von mir hier beschriebene Species ziemlich gut ab, allein die Iris ist unrichtig colorirt, so wie einige andere Theile.

— 99 —
 — 100 —

B. Baumhacker mit geradem Schnabel, der länger oder eben so lang ist als der Kopf.

— 101 —

Abbildung 5. *D. Picus*, Herrm.

Der Specht - Baumhacker.

B. Schnabel gerade, zusammengedrückt; Körper olivenbräunlich, Kopf, Hals und Brust mit breiten, weissen, dunkel graubraun eingefassten, länglichen

Penfleckens Schwanz, Flügel und Rücken rothbraun; Schnabel an der Spitzenhälfte weißlich.

Le Talapiot, Buff. in *Encyclop. Méth.* 1789.

Le Grimpart Talapiot, Levaill.

Dendrocopus rectirostris, Vieill.

Dendrocopos rectirostris, Spz. Tab. XCI. Fig. 2.

Lightenstein über die Gattung *Dendroc.* pag. 701.

Beschreibung des männlichen Vogels: Der Schnabel ist völlig gerade, etwas länger als der Kiefer, sehr zusammengedrückt, die Firste fällt in gerader Mittellinie eben so viel ab, als die Dille aufsteigt, zugespitzt, der Oberkiefer ist länger als der untere, Firste und Dillen mäßig zugeshärft, Nasenloch in der Nasenhaut eiförmig geöffnet, die Federn laufen zur Oeffnung von; Kinnwinkel tritt nur wenig weiter vor als die Nasenöffnung, ist mäßig zugespitzt und befiedert; Augenlid mit kleinen Inselfederchen besetzt; Flügel stark, sie reichen beinahe über ein Drittheil des Schwanzes hinaus, die dritte und vierte Feder sind die längsten, die erste ist kurz; Schwanz abgestuft, mit starken, etwas gewundenen Stachelspitzen, deren Fahnen vorn abgenutzt sind; eine stark, Ferse mit vier bis fünf glatten Talen belegt; zwei äußere Zehen am Wurzelgelenke verbunden.

Färbung: Kopf und Hals graubraun, am

Rücken in's Rothbraune übergehend, eine Mischung, die Rücken, Flügel und Schwanz bedeckt; Oberkopf mit zierlichen, weißlichen, etwas in die Länge gezogenen Perlflecken besetzt, die im Nacken an Grösse zunehmen, und auf dem Oberhalse mehr länglich sind; hinter dem Auge bilden die weissen Perlflecken durch ihre nähere Vereinigung eine zusammengesetzte weiße Linie; Kinn und Kehle beinahe gänzlich gelblich oder schmutzig weils; an der Kehle zeigen sich schon dunkle Federrändchen, der Unterhals ist mit grossen, weißlichen Flecken bedeckt, wo aber jede Feder einen dunkeln Rand hat, dieser Theil ist also schwärzlich geschuppt; Brust und alle Untertheile fahl olivenbraun, an ersterer mit verloschenen weißlichen Flecken, die weiter hinab bis zu den Beinen nur schmale Längsstreifen sind, und am Bauche manchen Exemplaren gänzlich fehlen; Ober Rücken olivenbraun, stark rothbraun überlaufen; Mittel- und Unterrücken, Flügel und Schwanz lebhaft rothbraun; grosse Schwungfedern mit fahl graubrauner Spitze, hintere Schwungfedern an der Spitze zuweilen etwas weils, doch ist dieses nicht oft der Fall; Schwanzfederschäfte an der Oberseite dunkel rothbraun, an der unteren röthlich-gelb; Schna-

Penfleckens Schwarz, Flügel und Rücken roth-
braun, Schnabel an der Spitzenhälfte weißlich.

Le Talapiot, Buff. in Proc. Acad. Sci. Paris 1800, 1801.

Le Grimpart Talapiot, Levaill.

Dendrocopus rectirostris, Vieill.

Dendrocopos rectirostris, Spix Tab. XCI. Fig. 2.

Lichtenstein über die Gattung *Dendroc.* pag. 711.

Beschreibung des männlichen Vogels: Der
Schnabel ist völlig gerade, etwas länger als der
Kopf, sehr zusammengeedrückt; die Firste fällt
zur geraden Mittellinie eben so viel ab, als
die Dille aufsteigt, zugespitzt, der Oberkiefer
kaum länger als der untere, Firste und Dillen-
kantenmäßig zugescharft; Nasenloch in der Na-
senhaut eiförmig geöffnet, die Federn laufen
bis zur Oeffnung von; Kinnwinkel tritt nur we-
nig weiter vor als die Nasenöffnung, ist mäßig
zugespitzt und befiedert; Augenlid mit kleinen
Pinsel Federchen besetzt; Flügel stark, sie rei-
chen beinahe über ein Drittheil des Schwanz-
es hinaus, die dritte und vierte Feder sind
hier längsten, die erste ist kurz; Schwanz ab-
gestuft, mit starken, etwas gewundenen Sta-
chelspitzen, deren Fahnen vorn abgenutzt sind;
Beine stark, Ferse mit vier bis fünf glatten Ta-
feln belegt; zwei äußere Zehen am Wurzelge-
lenke verbunden;
Färbung: Kopf und Hals graubraun, am

gleich Herr Professor *Lichtenstein Azara's Pic-Grimpereau à bec court* zu *Dendr. Picus citini*, so möchte ich doch diesen lieber nicht hierher deuten. Unser Vogel ist den Naturforschern längst bekannt gewesen. Er lebt in den großen Urwäldern, und gleicht in der Hauptsache dem *tenuirostris* sehr, ist aber ein wenig größer, auch durch die Bildung des Schnabels und die mehr weißse, stärkere Perlzeichnung nicht zu verkennen. Er hat die Lebensart mit jenem und dem großen Baumhacker gemein, sie rücken gleich den Spechten an den Stämmen und Aesten hinauf, und pochen gegen die Rinde. Obgleich der eigentliche Aufenthalt unseres Vogels in den großen Urwäldern ist, so kommt er doch in der kalten Jahreszeit, nach vollendeter Brut, den menschlichen Wohnungen nahe. Seine Stimme ist ein heller, öfters wiederholter Ton. Er ist nicht schüchtern. Seine Brut bringt er in Baumhöhlen aus, und man findet ihn nach der Paarzeit oft in kleinen Gesellschaften. In seinem Magen Ueberreste von Insecten.

Buffon bildet (*pl. enl. No. 605.*) diesen Vogel in einer Gestalt und Stellung ab, die völlig einen Pirol darstellt, und also unrichtig ist; er sollte vielmehr die Gestalt und Stellung

eines Spechtes haben. *Spix's* zweite Figur auf der 91sten Tafel scheint hieher zu gehören.

Gen. 40. Xiphorhynchus, Swains.

S ä b e l s p e c h t.

Es scheint mir zweckmäfsig, wenn *Swainson* den von *Temminck* unter der Benennung des *Dendrocolaptes procurvus* abgebildeten Vogel zu einem besonderen *Genus* erhebt, dessen Characterzüge etwa folgendermaafsen festzustellen wären:

Schnabel länger als der Kopf oder sehr lang, bogenförmig gekrümmt, dünn, sehr zusammengedrückt, mit beinahe parallellaufender Firste und Dille, zugespitzt, beide Kiefer etwa gleich lang. *Nasenloch* eiförmig, in sanfter Vertiefung an der Seite der Schnabelwurzel.

Zunge sehr kurz, kürzer als der Kinnwinkel, breit, zugespitzt, mit ganzem Rande und Spitze.

Beine wie an *Dendrocolaptes*; zwei hintere Zehen am Wurzelgliede vereint, gleichlang.

Flügel ziemlich kurz, erreichen etwa $\frac{1}{4}$ der Schwanzlänge, die vierte Feder scheint die längste zu seyn.

Schwanz aus zwölf mit Stachelschäften versehenen, starken Federn zusammengesetzt, abgestuft, Federspitzen etwas gewunden.

Die einzige in den nachfolgenden Zeilen zu beschreibende Species dieses *Genus*, hat in Färbung, Lebensart und Manieren die größte Aehnlichkeit mit *Dendrocolaptes*, wozu man sie bisher zählte.

1. *X. trochilirostris*.

Der Sichelspecht mit dem Colibrischnabel.

S. Schnabel röthlich-braun; Rumpf olivenbraun, Kopf, Hals und Brust gelblich-weiß gestrichelt; Kehle weiß; Flügel und Schwanz dunkel röthlich-braun.

Dendrocolaptes procurvus, Temm. pl. col. 28.

Dendrocopus falcularis, Vieill., Gal. pl. 175.

Dendrocol. trochilirostris, Lichtenst. über die Gattung *Dendrocol.* pag. 11.

Meine Reise nach Bras. B. II. p. 141.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt schlank, Kopf klein, Schnabel sehr lang und hochbogig gewölbt. Dieser Schnabel ist sehr merkwürdig, in gerader Linie gemessen über zweimal so lang als der Kopf, linear, das heißt mit beinahe parallellaufender Firste und Dille, von geringem Höhendurchmesser, sehr zusam-

mengedrückt und stark bogenförmig gewölbt, zugespitzt, die beiden Kiefer etwa gleich lang; Firste sanft abgerundet; das Nasenloch liegt in einer sanften Vertiefung an der Seite der Schnabelwurzel, ist in der Nasenhaut eiförmig geöffnet, und letztere bis zu demselben befiedert; Kinnwinkel sehr kurz, er tritt kaum über die Nasenlöcher vor, ist ziemlich stumpf, dabei befiedert, und die ihn bildenden Schenkel des Unterkiefers (*Gnathidia*, *Illig.*) laufen nackt noch bis unter das Auge fort; der Unterkiefer paßt ein wenig in den oberen; öffnet man die Kiefer, so findet man die beiden Schnabeltheile beinahe gar nicht ausgehöhlt, sondern voll; Zunge sehr kurz, kürzer als der Kinnwinkel, breit, zugespitzt, ganzrandig und mit ganzer Spitze; Augenlid sparsam befiedert; Beine ziemlich schlank; zwei äußere Zehen am Wurzelgliede vereint, Fuß- und Zehenrücken getäfelt, man zählt an der Ferse fünf große Schildtafeln; Flügel ziemlich kurz, sie reichen etwa bis auf den vierten Theil der Schwanzlänge, die vierte Feder scheint die längste zu seyn; Schwanz aus zwölf mit Stachelschäften versehenen starken Federn zusammengesetzt, abgestuft, da die mittleren Federn um neun und eine halbe Linie länger sind als die äußeren; die Federspitzen sind

nur wenig gedreht, an der äußeren Seite der Spitze die Fahne sehr kurz, an der inneren weiter vortretend.

Färbung: Schnabel röthlich-braun, der Unterkiefer an seiner Sohle oder Dille blässer, oder gelblich, die Gegend der Nase am Oberkiefer ist dunkler als der übrige Theil desselben; Iris dunkel graubraun; Beine schmutzig fleischbraun; der ganze Rumpf ziemlich dunkel olivenbraun, am Scheitel mehr dunkel graubraun; Kopf, Hals, Oberrücken und Brust sind einzeln mit fahl röthlich-gelben Schaftstrichen oder Fleckchen bezeichnet, die am Scheitel kleiner und schmaler, am Unterhalse größer und mehr verloschen sind; Seiten des Kopfs stark weißlich gestrichelt; Kinn ungefleckt weiß, die Kehle auf weißem Grunde schon etwas gelblich gestrichelt; Bauch und Steiß ungefleckt, an ersterem kommen zuweilen ein Paar feine Schaftstriche von hellerer Farbe vor; Mittelrücken und kleine Flügeldeckfedern ungefleckt olivenbraun, die großen Deckfedern sind schon rothbraun an ihrer Spitze, und diese Farbe deckt die Schwung- und Schwanzfedern, so wie den ganzen Unterrücken; Schwungfedern an der inneren Fahne in's Rostgelbe übergehend, die vorderen an ihren Spitzen dunkel graubraun;

Schwanzfedern an der unteren Fläche heller röth braun als an der oberen; ihre Schäfte dunkelbraun; untere Fläche der Schwungfedern hell rostroth, die kleinen inneren Flügeldeckfedern olivenbräunlich-gelb.

Ausmessung: Länge 9" 5''' — Breite 11" 3''' — L. d. Schnabels (auf der Sehne gemessen, von den Nasenfedern bis zur Spitze) 2" — L. d. Schn. über die Wölbung gemessen 2" 4''' — Höhe d. Schn. $2\frac{1}{2}$ ''' — Br. d. Schn. (vor den Nasenlöchern) $1\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Flügels 3" 9 $\frac{1}{4}$ ''' — L. d. Schwanzes 3" 3 bis 4''' — Höhe d. Ferse 8''' — L. d. Mittelzehe $5\frac{1}{8}$ ''' — L. d. äusseren Z. $5\frac{1}{8}$ ''' — L. d. inneren Z. $2\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinterzehe $3\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelnagels 3''' — L. d. äusseren N. 3''' — L. d. Hinternagels $3\frac{1}{2}$ ''' —

Diesen sonderbaren Vogel fand ich in den grossen ununterbrochenen Waldungen am *Rio da Cachoeira*, an der verwilderten Waldstrasse des *Capt. Filisberto*, welche von *Ilhéas* in den Sertong der Provinz *Bahia* führte. Hier beobachteten wir ihn paarweise, aber nicht häufig, und nur der männliche Vogel wurde geschossen. Er klettert beständig an den Stämmen und Aesten, und nie haben wir ihn in aufrechter Stellung auf einem Zweige sitzen ge-

sehen. In seinem Magen fand ich Käfer und andere kleine Insecten, ich kann aber weiter nichts über die Lebensart dieser, gewöhnlich im dichtesten Urwalde verborgenen Vögel hinzufügen.

Lichtenstein beschrieb diesen Vogel zuerst in dem Nachtrage zu seiner Abhandlung über *Dendrocolaptes*, er hatte ihn im Jahre 1818 aus Brasilien erhalten, wo ich ihn schon 1817 fand, und unter der Benennung des *Dendroc. falcatus* beschrieb, seitdem aber den schon gedruckten Namen *Lichtenstein's* für diese Species annahm. *Temminck* hat diesen originellen Vogel später unter der Benennung des *Dendr. procurvus* (*Grimpart Promérops*) auf seiner 28sten Tafel sehr gut abgebildet, nur kann der mit größter Strenge urtheilende Richter an derselben die Farbe des Schnabels, der Iris, so wie allenfalls die aufrecht sitzende Stellung tadeln.

Viellot hat unsern Vogel in seiner *Galerie des oiseaux* unter der Benennung des *Dendrocopus falcularius* abgebildet.

Gen. 41. Sittasomus, Swains.

Baum schlüpfer.

Swainson hat den von *Temminck* unter der Benennung des *Dendr. sylviellus* abgebildeten Vogel als besonderes *Genus* von *Dendrocolaptes* getrennt, und ich folge ihm in dieser Hinsicht. Die charakteristischen Züge dieses Geschlechtes sind etwa folgende:

Schnabel kürzer als der Kopf, schlank, zugespitzt, gerade, an der Wurzel etwas ausgeteilt, vor der Spitze zusammengedrückt, daher diese etwas kolbig; Firste ziemlich scharf erhaben; *Nasenlöcher* ritzenförmig, in der zum Theil befiederten Haut.

Zunge halb so lang als der Schnabel, schmal, dünn, hornartig, an der Spitze ein wenig getheilt.

Flügel ziemlich kurz, $\frac{1}{3}$ der Schwanzlänge erreichend, die dritte Schwungfeder die längste.

Schwanz stark abgestuft, mit starken, steifen, stachelartig vortretenden gewundenen Schäften.

Beine schlank und zierlich, gebildet wie an *Dendrocolaptes*; der Hinternagel wie an den Sängern (*Sylvia*), ein wenig gestreckt.

1. *S. olivaceus*

Der olivenfarbige Baumschlüpfer.

B. Körper olivengrün; Schwanz, Unterrücken und hintere Schwungfedern rostroth; übrige Schwungfedern schwärzlich, mit einem gelben Flecke an der hinteren Fahne.

Grimpard fauvette, Temm. pl. col. 72. Fig. 1.

Dendrocolaptes sylviellus, Temm.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt und Größe etwa von einem Sänger (*Sylvia*), Schwanz lang und stark, mit starken gewundenen Stachelschäften. Schnabel zart, kürzer als der Kopf, schlank zugespitzt, an der Wurzel etwas breit, vor der Spitze zusammengedrückt, daher diese etwas kolbig; Firste ziemlich scharf erhaben; Nasenlöcher in der zum Theil befiederten Haut nur wenig geöffnet, ritzenförmig; Kinnwinkel groß und breit, bis auf die halbe Schnabellänge vortretend, mälsig zugespitzt, etwas borstig befiedert; Zunge halb so lang als der Schnabel, schmal, dünn, hornartig, vorn mit ein wenig getheilter Spitze; Augenlid etwas nackt; die Flügel erreichen etwa ein Dritttheil der Schwanzlänge, ihre dritte Schwungfeder ist die längste; Schwanz stark abgestuft, mit steifen, zwei und eine halbe Linie lang vortretenden, nach außen gewunde-

nen, zugespitzten Schäften, die äussere Feder ist über einen Zoll kürzer als die mittleren, an der äusseren Seite der Federspitzen ist die Fahne allmählig abnehmend, an der inneren ist sie beinahe rechtwinklig ausgeschnitten; Beine sehr schlank und zierlich, die Ferse mit vier glatten Tafeln belegt; Hinternagel wenig gekrümmt, nach Art der Sänger gestreckt.

Färbung: Schnabel dunkel schwärzlich-graubraun; Rachen röthlich; Mundwinkel gelb; Iris dunkel schwärzlich braun; Beine dunkel bleifarben; Kopf, Hals, Rücken, Kinn, Kehle, Brust und Untertheile bis zum After schmutzig olivengrün, die Federn an der Wurzel aschgrau; Unterrücken, Schwanz und Steifs, oder untere Schwanzdeckfedern rostroth; die Flügel sind bunt gezeichnet, bald wie an *Xenops genibarbis*. Kleine Flügeldeckfedern olivenfarben, die grossen schwarzbräunlich mit olivenfarbenen Rändern; Schwungfedern schwärzlich-braun, mit einem roströthlichen Vordersaume, die mittleren mit rostrothen Spitzen, die hinteren ohne andere Mischung rostroth; alle grossen vorderen Schwungfedern haben an ihrer inneren Fahne einen grossen, vorn eckigen, rostgelben Fleck, der, wenn der Flügel ausgebreitet ist, eine rostrothe, über alle Federn hin-

laufende breite Binde erzeugt, die vorn mehr gelblich, nach hinten aber mehr rostroth gefärbt ist; Schwanz sehr lebhaft rothbraun, an der Unterseite heller, Schäfte ebenfalls rothbraun, an ihrer Unterseite gelblich.

Ausmessung: Länge 6" 6''' — Breite 8" 9''' — L. d. Schnabels 6''' — Br. d. Schn. 2½''' — Höhe d. Schn. 1½''' — L. d. Flügels 2" 10½''' — L. d. Schwanzes etwa 2" 6''' — Höhe d. Fesse 7''' — L. d. Mittelzehe 4''' — L. d. äußeren Z. 4''' — L. d. inneren Z. 1½''' — L. d. Hinterzehe 2½''' — L. d. Mittelnagels 2''' — L. d. äußeren N. 2½''' — L. d. Hinternagels 3'''.

Den *weiblichen Vogel* habe ich nicht erhalten, der von *Temminck* abgebildete könnte aber vielleicht von diesem Geschlechte gewesen seyn, da ihn die Abbildung an den Untertheilen mehr gelblich, oder heller gefärbt angiebt, als es der meinige ist.

Dieser schöne niedliche Baumschlüpfer ist mir nur einmal vorgekommen, scheint daher in der von mir bereis'ten Gegend nicht häufig zu seyn, ich erhielt ihn in den inneren großen Urwäldern. In seinem Magen befanden sich Ueberreste von Insecten. Herr *Temminck* bildet den Vogel sehr gut ab, allein die Stellung

ist nicht die richtige, da sie kletternd und mit mehr zusammengezogenem Körper seyn sollte, auch sind Iris und Schnabel nicht in der richtigen Farbe angegeben. Der in meiner Sammlung befindliche Vogel ist, wie gesagt, an den Untertheilen weniger gelblich, als die genannte Abbildung zeigt.

Gen. 42. Glyphorhynchus.

Meißelspecht.

Lichtenstein führt in seiner *Monographie* des *Genus Dendrocolaptes* einen Vogel unter der Benennung *cuneatus* auf, der einen so verschiedenartigen Schnabelbau zeigt, daß ich ihn unmöglich bei dem genannten Geschlechte belassen kann. Sein Schnabel hat dagegen schon viel Aehnlichkeit mit dem der Steigschnäbel (*Xenops*), weicht aber auch von diesem ab, und ist deshalb ein vollkommen natürliches Bindeglied zwischen *Dendrocolaptes* und *Xenops*. Ich nehme folgende Characterere an:

Schnabel: kegelförmig, gerade, an der Wurzel etwas ausgebreitet, dann nur sanft zusammengedrückt; Firste abgeflacht, nach der Spitze hin sanft ausgehöhlt; Spitze meißelartig

plattgedrückt, vorn scharf und abgerundet; Oberkiefer etwas länger als der untere; Nasenloch ritzenförmig in der Nasenhaut, erhöhte Leisten erstrecken sich vorwärts; Unterkiefer an der Dille sehr stark aufsteigend, wie bei *Xenops*, seine Kuppe abgeplattet und abgestutzt.

Flügel: mälsig lang, erreichen ein Drittheil des Schwanzes, die dritte und vierte Feder sind die längsten.

Schwanz: lang und stark abgestuft, mit stark vortretenden, gewundenen Stachelspitzen.

Beine: schlank, äufsere Zehen gleich lang, länger als die innerste, an der Wurzel vereint.

Ich kenne nur eine Species dieses Geschlechts, welche mit *Xenops* und *Dendrocolaptes* einerlei Lebensart zeigt. Sie bildet zu ersterem Geschlecht einen vollkommen natürlichen Uebergang.

1. *G. ruficaudus*.

Der Meisselspecht mit gefleckter Kehle.

M. Gefieder olivenbraun; Kehle, Seiten des Kopfs und Oberbrust gelblich - weifs gefleckt; Schwanz dunkel rothbraun.

Dendrocolaptes cuneatus, Licht. pag. 8.

Spix Tab. 91. Fig. 8.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel kürzer als der Kopf, kegelförmig, stark, auf Firste und Dille abgerundet, an der Wurzel etwas ausgebreitet, breiter als hoch, dann etwas zusammengedrückt; Firste gerade, aber vor der Spitze etwas ausgehöhlt; diese ist meißelartig plattgedrückt, vorn abgerundet und scharf; Tomienrand ein wenig eingezogen; Nasenlöcher ritzenförmig in der Nasenhaut, ein Paar erhöhte Leisten ziehen von ihnen vorwärts nach dem Schnabelrande hin; die eine von der oberen Seite des Nasenloches, begrenzt äußerlich die Kuppe des Oberkiefers, die zweite entspringt auf dem vorderen Ende der Nasenhaut, ein wenig über dem Nasenloche, die dritte endlich entspringt von dem unteren Rande der Nasenhaut, und diese beiden letzteren ziehen schief nach vorn nach dem Schnabelrande hin; der Kinnwinkel tritt so weit vor als das Nasenloch, ist abgerundet und befiedert; die Dille ist abgerundet, sie steigt plötzlich sehr stark auf, wie bei *Xenops*; Kuppe des Unterkiefers abgeplattet und abgestutzt. — Flügel etwa ein Drittel theil des Schwanzes erreichend, die dritte und vierte Feder sind die längsten; Schwanz ziemlich lang, stark, mit drei Linien lang vortretenden, gewundenen Stachelspitzen wie an den

vorhergehenden Arten, dabei sind die Federn stark abgestuft, die äußeren an jeder Seite etwa um zehn Linien kürzer als die mittleren. — Beine schlank, die Ferse mit vier Tafeln belegt; Hinternagel ziemlich gestreckt, d. h. ohne starke Biegung.

Färbung: Der Schnabel hat ein bräunliches Horngrau, Spitze etwas dunkler; Beine dunkel bleigrau; ganzes Gefieder dunkel olivenbraun, an Rücken und Flügeln rothbraun überlaufen, an den Untertheilen heller; eine undeutlich punctirte Linie über dem Auge, und die Seiten des Kopfs fein gelblich-weiß gefleckt; Kinn, Kehle und Unterhals mit großen gelblich-weißen Flecken, indem die Federn diese Farbe, und um dieselbe einen dunkeln Rand haben; an der Brust stehen noch einzelne, wenig hellere Schaftstriche; der Unterleib ist ungefleckt, aber etwas blässer als die Brust; Schwungfedern schwärzlich-graubraun, mit oliven- und die hinteren mit röthlich-braunem Vordersaum; hinterste Schwungfedern gänzlich röthlich-olivenbraun; Schwanz dunkel rothbraun, an der Unterseite etwas heller.

Ausmessung: Länge 4" 8''' — L. d. Schnabels 4½ bis 5''' — Br. d. Schn. 2½''' — Höhe d. Schn. 1½''' — L. d. Flügels 2" 5½''' — L. d. Schwan-

zes 2" 3^{'''} — Höhe d. Ferse 5¹/₂" — L. d. Mittelzehe 3¹/₂" — L. d. äußeren Z. 3¹/₂" — L. d. inneren Z. 2¹/₆" — L. d. Hinterzehe 1¹/₂" — L. d. Mittelnagels 2" — L. d. äußeren N. 2" — L. d. Hinternagels 2¹/₂".

Weibchen: Von dem Männchen nicht wohl zu unterscheiden; die Farben scheinen vielleicht ein wenig heller, wenigstens der Scheitel, die Brust vielleicht etwas mehr gefleckt.

Dieser kleine Klettervogel kriecht wie die Steigschnäbel an den Stämmen und Aesten umher, lebt in Gebüsch und Waldungen, ist mir aber südlich nie vorgekommen, ich habe ihn überhaupt nur selten erhalten.

Spix giebt eine Abbildung unseres Vogels, die zwar nicht zu verkennen, allein dennoch ziemlich schlecht ist.

Gen. 43. Xenops, Illig.

Steigschnäbel.

Die Steigschnäbel, zuerst durch den wissenschaftlichen Eifer des Grafen v. Hoffmanns-egge aus Brasilien zu uns gebracht, und von *Levaillant* und *Illiger* bekannt gemacht, sind Vögel, welche in ihrer Lebensart mit den

Spechtmeisen (*Sitta*) viel Aehnlichkeit zeigen, Ihr sonderbar am Unterkiefer aufsteigender und auf der Firste geradliniger Schnabel giebt ihnen zwar eine ganz besondere, originelle Bildung, allein der übrige Körper stimmt ziemlich mit dem der Spechtmeisen überein, ihr Schwanz ist aus weichen, abgerundeten Federn zusammengesetzt, und ihre Füße sind stark, und zum Klettern und Anhalten an Baumstämmen und Aesten geeignet. Ich vermuthe auch, daß beide Vogelgeschlechter einerlei Nahrung haben; denn wenn die Steigschnäbel gleich vorzüglich von Insecten leben, so vermuthe ich dennoch, daß sie auch Nüsse verzehren. Mit dem Schnabel des vorhergehenden Geschlechtes hat der der Steigschnäbel sehr viel Aehnlichkeit; allein er ist durchaus zusammengedrückt, und es fehlt ihm gänzlich die horizontale Abplattung der Spitze, wie bei jenen Vögeln. Die Steigschnäbel klettern so geschickt, wie unsere europäischen Spechtmeisen, und ich habe sie nie aufrecht sitzen gesehen. Sie pochen gegen die Bäume, wie die Spechte, sind aber nicht so lebhaft und laut als unsere *Sitta europaea*, sondern einsame, stille Waldvögel, die man nach der Paarzeit in kleinen Gesellschaften oder Familienweise, außerdem aber einzeln oder

paarweise findet. Eine bedeutende Stimme habe ich nicht von ihnen vernommen. Sie scheinen über ganz Brasilien verbreitet, kommen südlich bei *Rio* und nördlich bei *Pará* vor. Ihr Nest sollen sie in Baumhöhlen anlegen. Sie sind nicht schüchtern, und kommen den menschlichen Wohnungen nahe, wie unsere Baumläufer (*Certhia familiaris*).

1. *X. genibarbis*, Illig.

Der Hoffmannseggische Steigsehnabel.

St. Ein gelblich-weißer Streifen über dem Auge, ein weißer Fleck unter dem Ohre; Kehle weißlich; Körper olivenbraun, unten heller; Flügel graubraun und rothbraun gestreift; mittlere Schwanzfedern rothbraun, die nächsten schwarzbraun, die äußeren schwarzbraun mit rostrothen Spitzen.

Illiger prodromus Mammal. et Av. pag. 213.

Sittine Hoffmannsegg, Temm. pl. col. 150. Fig. 1.

Nepps ruficauda, Vieill.

Swains. Zool. illustr. Vol. II. pl. 100.

Beschreibung des männlichen Vogels: Ein kleiner Vogel mit ziemlich gedrungenem Körper. Schnabel kürzer als der Kopf, sehr zusammengedrückt, zugespitzt, beide Kiefer ziemlich gleich lang, Firste gerade, kaum merklich

aufsteigend, mäßig scharfkantig; Tomienraum ein wenig eingezogen; Nasenloch mit der Haut umgeben, ritzenförmig, die Stirnfedern treten bis zu demselben vor; Kinnwinkel kaum weiter vortretend als das Nasenloch, ziemlich breit und befiedert; Dille des Unterkiefers vor dem Kinnwinkel sanft abgerundet, alsdann plötzlich sehr steil aufsteigend; Zunge etwas über die Mitte des Schnabels hinausreichend, hornartig, länglich zugespitzt *). — Die Flügel erreichen etwa die Mitte des Schwanzes, die vierte Schwungfeder ist die längste, allein die dritte ist kaum kürzer, die erste die kürzeste; Schwanz abgerundet, indem die äußeren Federn etwa um zwei Linien kürzer sind, als die mittleren; Beine stark, Ferse mit vier bis fünf glatten Tafeln belegt; mittlere Vorderzehe die längste, die äußerste Zehe länger als die innerste, beide sind an der Wurzel verwachsen, und diese ist kürzer als die Hinterzehe; Nägel stark und zusammengedrückt, wie an *Dendrocolaptes*.

Färbung: Oberkiefer dunkel graubraun, der untere röthlich-weiß, oft auch bräunlich

*) Illiger und Temminck haben den Zungenbau dieses Geschlechts noch nicht gekannt, eine Lücke, die ich ausfüllen kann.

am Kieferrande; Iris graubraun; Beine bleifarben; Obertheile röthlich-olivengraun, auf dem Kopfe mehr dunkel, und mit undeutlichen dunklern Fleckchen gestrichelt; hinter dem Auge zeigt sich ein blaß gelbröthlicher Strich; Backen und Ohrgegend braun, darunter läuft von der weißlichen Kehle aus ein rein weißer Streifen oder Fleck, der den Backen umgiebt; Oberrücken und kleine Flügeldeckfedern röthlich-olivengraun, Unterrücken röthlich-braun; Unterhals, Brust und alle Untertheile dunkel bräunlich-olivengraun, auf der Brust kaum merklich heller gestrichelt; große Deck- und Schwungfedern dunkel graubraun, über sie alle läuft schief ein breiter rostrother Streifen, die hinteren haben die ganze Vorderfahne rostroth; zwei mittlere Schwanzfedern rostroth, die beiden an jeder Seite darauf folgenden gänzlich schwarzbraun, die nächstfolgende schwarzbraun mit kleiner rostrother Spitze, die äußerste an der Wurzel schwarz, und ihr größter Theil nach der Spitze hin rostroth.

Ausmessung: Länge 5" 3''' — L. d. Schnabels $4\frac{2}{3}$ ''' — Höhe d. Schn. $1\frac{3}{4}$ ''' — Breite d. Schn. $4\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Flügels 2" $1\frac{3}{4}$ ''' — L. d. Schwanzes etwa 1" 6''' — Höhe d. Ferse $5\frac{1}{3}$ ''' —

L. d. Mittelzehe $4'''$ — L. d. äußeren Z. $3\frac{1}{4}'''$
— L. d. inneren Z. $2\frac{1}{4}'''$ — L. d. Hinterzehe
 $3\frac{1}{4}'''$ — L. d. Mittelnagels $2'''$ — L. d. äußeren N. $1\frac{1}{4}'''$ — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{4}'''$.

Varietäten oder Altersverschiedenheit:

Man bemerkt oft bei diesen Vögeln, daß der untere weiße Backenstreifen fehlt, dies sind vielleicht junge Vögel.

Dieser kleine Klettervogel ist gemein in allen von mir bereis'ten brasilianischen Wäldern, wo er an den Stämmen pocht, und gleich unseren Meisen an den Aesten umherschaut. Er klettert sehr geschickt. Sein Nest habe ich nicht gefunden, es soll in der Höhlung eines Astes oder Stammes stehen.

Temminck giebt auf seiner 150sten Tafel die Abbildung unseres Vogels, allein in aufrechter Stellung, welches mir nie vorgekommen ist, auch ist der Schwanz seines Vogels anders gefärbt, als der der *Illiger'schen* und meiner Exemplare. Wahrscheinlich hatte Hrn. *Temminck's* Vogel die beiden mittleren rostrothen Schwanzfedern in der Mauser verloren. Der Schnabel der *Temminck'schen* Abbildung ist zu lang und schlank, die Brust mehr weiß, und der Unterrücken weniger rostroth als an

meinen Exemplaren. *Swainson's* Figur ist weniger zu empfehlen als die des Herrn *Temminck*.

? 2. *X. rutilans*, Licht.

Der rostschwänzige Steigschnabel.
St. Kopf graubraun, gelbröthlich gestrichelt; ein gelblicher Strich über dem Auge, ein weißer unter den Backen; Obertheile rothbraun; Schwanz nur an ein Paar Federn schwärzlich, übrigens rothbraun; Untertheile graubraun, mit vielen weißlichen Längsflecken; Kehle weiß; Flügel bunt.

Sittine bibrande, Temm. pl. col. 72. Fig. 2.

Beschreibung des weiblichen Vogels: Gestalt und Bildung von No. 1.; Zunge nicht völlig die Mitte der Schnabellänge erreichend, hornartig, länglich zugespitzt, vorn etwas abgerundet und gefranst.

Färbung: Backen- und Augenstreifen wie an No. 1.; Oberkopf graubraun, mit gelbröthlichen Schaftstrichen; Kinn und Kehle weißlich; Rücken und kleine Flügeldeckfedern rothbraun; alle Untertheile graubraun, sehr stark mit großen weißen Längsflecken besetzt, die an After und Steiß Schaftstriche bilden; Schwungfedern dunkel schwärzlich-graubraun, eine rostrothe

Binde läuft schief über alle hinweg, dabei ist ihr Vorder- und Spitzensaum von dieser Farbe; Schwanz gänzlich lebhaft rostroth, nur die vierte Feder von außen hat die ganze innere Fahne schwärzlich-graubraun, vielleicht noch ein Ueberrest der ersten Jugendfedern; Beine schmutzig bleifarben; Schnabel wie an der vorhergehenden Art.

Ausmessung: Länge $4'' 9'''$ — Breite $7'' 1'''$ — L. d. Schnabels $5'''$ — Br. d. Schn. $1\frac{1}{3}'''$ — Höhe d. Schn. $2'''$ — L. d. Flügels $2'' 4\frac{1}{2}'''$ — L. d. Schwanzes $1'' 6'''$ — Höhe d. Ferse $4\frac{2}{3}'''$ — L. d. Mittelzehe $5\frac{1}{2}'''$ — L. d. äußeren Z. $3\frac{1}{2}'''$ — L. d. inneren Z. $3\frac{1}{2}'''$ — L. d. Hinterzehe $3\frac{1}{2}'''$ — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{3}'''$ — L. d. äußeren N. $1\frac{3}{4}'''$ — L. d. Hinternagels $3'''$. —

Dieser Steigschnabel hat mit dem vorhergehenden viel Aehnlichkeit, zeigt aber dennoch einige Verschiedenheiten, so daß ich ihn, *Lichtenstein* zu Folge, der wahrscheinlich auch männliche Vögel erhalten haben wird, die mir nicht vorgekommen sind, als besondere Art aufführe. Ich hielt den hier beschriebenen, mir zu *Muribeca* am *Itabapua* zuerst überbrachten Steigschnabel immer für das Weibchen des *genibarbis*, und ich habe bis zu völliger Ent-

scheidung dieser Frage, die Species No. 2. mit einem ? versehen. Nach Herrn *Temminck* soll *Xenops rutilans* größer seyn, als die vorhergehende Art, welches vielleicht von dem Ausstopfen herrühren könnte; denn den frisch gemessenen Vogel fand ich kleiner. Lebensart und Manieren, so wie die kurze, kleine Stimme, sind bei beiden Vögeln völlig gleich.

Fam. XVI. Anabatidae.

Kletterdrosselartige Vögel.

Vigors hat die *Anabates* in seine Familie der *Certhiadae* aufgenommen, weil noch Niemand die Lebensart ersterer Vögel beschrieben hat. Sie sind aber keine eigentlichen Klettervögel, wie *Dendrocolaptes*, *Xenops*, *Sitta*, *Tichodroma*, *Certhia* u. a. Geschlechter, sondern hüpfen mehr schief an den Zweigen herum, steigen hüpfend, hängen sich auch wohl an, sind aber durchaus keine wahren Klettervögel, da sie meistens sitzend oder auf den Zweigen hüpfend angetroffen werden. Sie stehen zwischen *Dendrocolaptes*, *Xenops*, den Pirolen und Sängern in der Mitte, haben eine laute, sonderbare Stimme, nähren sich von Insecten, und bauen ein originelles, oft hängendes, meistens oben verschlossenes Nest.

Gen. 44. *Anabates*, Temm. gehört
 zu den Kleinvögeln. Es existirt in den brasilianischen Urwäldern ein ziemlich zahlreiches Vogelgeschlecht, welches mit den Sängern (*Sylvia*), mit den Baumhackern (*Dendrocolaptes*) und mit den Ortolan (*Ortolus*) Aehnlichkeit hat, und von diesen Geschlechtern einige Züge in seiner Organisation trägt. Wer diese Vögel zuerst kennen lernt, weiß nicht, wohin er sie ordnen, ob ihnen Geschlechtern er sie einverleiben, oder zwischen welche er sie einschalten soll. Einige dieser Vögel waren bekannt, und wurden zu den Sängern (*Sylvia*) gebracht, so standen *Sylvia rubricata*, *striolata* und *rufifrons* bei den letzteren, die meisten Arten waren aber nicht bekannt. Herr Temminck legte ihnen die generische Benennung *Anabates* (*Anabate*) bei, welche ich auch für dieses Verzeichniß beibehalte. Dr. v. Spix begreift unsere Vögel unter der Benennung *Philydor* (wasserliebend), ich glaube aber nicht, daß diese Benennung mit Grund auf sie angewendet werden kann. Die Kennzeichen des Genus *Anabates* sind folgende:

Schnabel: gerade, kürzer oder so lang als der Kopf, zusammengedrückt, an der Wurzel

höher als breit, an der Spitze sanft gebogen, ohne Zahn oder Ausschnitt *); *Nasenlöcher* basal, lateral, eiförmig, zum Theil von einer befiederten Haut geschlossen.

Zunge: halb oder zwei Dritttheile so lang als der Schnabel, länglich, zugespitzt, an der Spitze hornartig, entweder ganz oder ein wenig getheilt, an jeder Seite derselben mit ein Paar feinen Borsten versehen.

Flügel: kurz; zwei vordere Schwungfedern kürzer als die dritte, vierte und fünfte, welche die längsten sind.

Schwanz: abgestuft, mit zehn oder zwölf weichen, zarten Federn, deren Schäfte nicht stechend sind.

Beine: Ferse länger als die Mittelzehe, zwei äußere Zehen zum Theil bis zur zweiten Articulation verwachsen, zum Theil nur sehr wenig vereint, innere Zehe zum Theil an der Wurzel vereinigt; äußere Vorderzehen einander ziemlich gleich.

*) Herr Dr. v. Spix giebt für sein Geschlecht *Philydor* an dem Schnabel einen Ausschnitt an; allein ich kann versichern, und muß in dieser Hinsicht mit *Temminck* übereinstimmen, daß alle meine Exemplare aus diesem Geschlechte, weder einen Zahn noch Ausschnitt an diesem Theile zeigen.

Die Kletterdrosseln sind Vögel von der Gröfse eines Sängers (*Sylvia*) bis zu der eines grofsen Baumbackers (*Dendrocolaptes*), und ihre Gestalt gleicht, wie gesagt, zum Theil mehr den einen, zum Theil mehr den andern. Sie sind meist lebhafte, gewandte Vögel des Urwaldes, und ob sie gleich nicht eigentlich wie die Spechte und Baumläufer klettern, so thun diefs doch einige von ihnen zuweilen, andere nie, sie steigen aber doch sämmtlich wie die Meisen hüpfend an den Zweigen umher, hängen sich sämmtlich an dieselben an, einige hüpfen zum Theil schwerfällig von der Seite an ihnen umher, andere klettern ziemlich geschickt, alle untersuchen die Knospen, Rinden, Blätter und Zweige nach Insecten, kurz sie sind gewandte Steiger, Hüpfen und Kletterer zugleich, und haben, wie es scheint, Insectennahrung.

Ihr Nest bauen mehrere Arten, bei welchen ich dasselbe zu beobachten Gelegenheit hatte, in merkwürdiger Gestalt, und hängen es an einer dünnen Schlingpflanze oder an einem dünnen Zweige schwebend auf. Ihre Stimmen sind gewöhnlich nicht melodisch, dagegen aus einigen lauten Tönen zusammengesetzt. Einige von ihnen durchkriechen die dichten Gebüsche und hohen Baumkronen hüpfend, an-

dere, wegen ihres langen, starken Schwanzes, schief und ungeschickt springend. Ausser der Paarzeit ziehen sie Familienweise in kleinen Gesellschaften umher, sind nicht schüchtern, und können leicht mit der Flinte erlegt werden.

A. Baumhackerartige Kletterdrosseln.

Schnabel stark, länger oder eben so lang als der Kopf, Beine stark und zum Klettern eingerichtet. Schwanz zwölf federig.

1. A. ferruginolentus.

Die baumhackerartige Kletterdrossel.

K. Körper röthlich-braun, an Kopf und Rücken mit hellrothrothen Schaftstrichen, über dem Auge eine weisslich-gelbe Linie; Kehle gelblich-weiss; Untertheile röthlich-braun, mit gelblich-weissen Längsflecken; Schwanz hell rothroth.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Grölse etwa einer Drossel. Schnabel stark, gerade, so lang als der Kopf, weniger zusammengedrückt als an den nachfolgenden Arten, und zwar nur in der Mitte, Firste sanft abgerundet, gerade, an der Spitze sich etwas herabsenkend, ihre Kuppe etwas über die des Unterkiefers vor- und herabtretend; Tomienrand in der Mitte

ein wenig eingeszogen; Nasenloch eiförmig, die Nasenhaut bis dahin befiedert; Kinnwinkel etwa bis auf ein Dritttheil der Schnabellänge vortretend, mälsig abgerundet, befiedert; die Dille steigt an dessen Spitze sehr sanft bis zur geraden Horizontallinie auf, und ist mälsig scharfkantig; Zunge zwei Dritttheile der Schnabellänge erreichend, vorn etwas hornigt, mit ganzrandiger Spitze, und an jeder Seite derselben ein Paar kleinen Fransen; Auge lebhaft; Augenlid befiedert; Flügel ziemlich kurz, erreichen gefaltet kaum ein Viartheil der Schwanzlänge, ihre vierte Feder ist die längste; der Schwanz besteht aus zwölf zarten, weichen, ziemlich schmalen Federn, ist abgestuft, indem die äusseren Federn etwa um einen Zoll kürzer sind, als die mittleren; Beine dick und stark, gebildet wie an *Dendrocolaptes*, allein die mittlere Vorderzehe ist über ein Dritttheil länger als die nebenstehenden, welche einander ziemlich gleich sind, doch ist die innere Zehe ein wenig kürzer als die äussere; sie sind ziemlich frei, nur die beiden äusseren Vorderzehen an der Wurzel ein wenig vereint; Fufsrücken mit starken Tafeln belegt, deren man auf dem Fersenrücken sechs bis sieben zählt; Nägel stark und mälsig gebogen, der hinterste ist der grös-

te, und stärker gewölbt als die vorderen, sie haben sämmtlich an ihrer Sohle hinter der Spitze einen kleinen Ausschnitt.

Färbung: Schnabel horngraubraun, Kinnkante und Rand des Unterkiefers weißlich; Iris sehr dunkel graubraun; Beine blafs olivengrünlich; alle Obertheile röthlich-braun, auf Kopf, Hals und Oberrücken dunkler braun, aber auf einer jeden Feder mit einem hell rostrothen Schaftstriche; über und hinter dem Auge zeigt sich eine gelblich-weiße Linie; Unterrücken ungefleckt rothbraun; Schwanz noch weit heller und lebhafter rostroth, an seiner Unterfläche blässer; Flügel dunkel röthlich-braun, die Schwungfedern an ihrer Hinterfahne und die mittleren an ihrer ganzen Seite dunkel graubraun; ganzer innerer Flügel hell fahl gelbroth, nur die vorderen Schwungfedern auf dieser Fläche dunkel aschgrau; Kinn und Kehle ungefleckt hell gelblich oder weißlich-gelb; Seiten und Unterhals röthlich-braun und gelblich gestrichelt; Brust und alle Untertheile graulich-rothbraun mit länglichen, hell gelblichen Flecken, die an Bauch und Steifs verloschen und etwas graulich überlaufen sind.

Weibchen: In allen Theilen dem ersteren ähnlich, allein in seinen Farben ein wenig hel-

ler, die Brust besonders mehr weißlich, mehr mit großen helleren Flecken bezeichnet, und daher weit heller; der Schnabel ist länger und stärker als an dem männlichen Vogel, weshalb ich denselben für jünger halte als den weiblichen.

Ausmessung: Länge 8" 3''' — Breite 11" 3''' — L. d. Schnabels 11''' — Br. d. Schn. 2½''' — Höhe d. Schn. 3''' — L. d. Flügels 3" 8''' — L. d. Schwanzes etwas über 3" — Höhe d. Ferse 9''' — Höhe d. Ferse so weit sie unbefiedert 7½''' — L. d. Mittelzehe 6¾''' — L. d. äußeren Z. 5½''' — L. d. inneren Z. 4''' — L. d. Hinterzehe 4¼''' — L. d. Mittelnagels 3½''' — L. d. äußeren N. 2¾''' — L. d. Hinternagels 4''' —

Der *männliche* in meiner Sammlung befindliche Vogel ist etwas größer, allein sein Schnabel mißt in der Länge nur 9¾''' —

Dieser Vogel macht unter den mir bekannten Arten des Geschlechts *Anabates* den vollkommenen Uebergang zu *Dendrocolaptes*, deren Habitus er in der Hauptsache noch hat, die Zahl zwölf ihrer Schwanzfedern, auch klettert er an den Stämmen wie ein ächter Baumhacker. Ich habe ihn im Sertong der Provinz *Bahía* gefunden, aber nirgends häufig, auch

erhielt ich während meiner ganzen Reise nur ein Paar Exemplare dieser Species. Seine Nahrung scheint in Insecten zu bestehen. Die Stimme habe ich nicht kennen gelernt.

B. Eigentliche Kletterdrosseln.

Schnabel stark, etwas kürzer als der Kopf; Beine etwas schwächer als an der vorhergehenden Abtheilung; äussere Zehen an ihrer Wurzel nur wenig vereint; Schwanz aus zehn bis zwölf Federn bestehend; die Vereinigungslinie oder der Schnitt der geschlossenen Augenlider ist nicht horizontal, sondern schief nach vorn geneigt. Diese Vögel klettern zum Theil ziemlich gut.

a. Mit zwölf Schwanzfedern.

2. *A. leucophthalmus*.

Die weisssaugige Kletterdrossel.

K. Grösse einer Singdrossel; Oberkörper röthlich-braun; Schwanz hell rostroth; Kehle schön geblich-weiß; Brust und übrige Untertheile fahl bräunlich-olivengrau; Iris weiß.

Meine Reise nach Bras. Bd. II. pag. 141.

Philydor albigularis, Spix Tom. II. pag. 74. Tab. 74.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Schnabel kürzer als der Kopf, mälsig zusammengedrückt, aber mehr als an der vorherge-

henden Art, hoch, die Dille etwa so viel aufsteigend, als die Firste abfällt, Oberkuppe nur wenig über die untere vortretend; Kinnwinkel etwas über ein Dritttheil der Schnabellänge haltend, befiedert, ziemlich stumpf; Nase wie an der vorhergehenden Art; Zunge halb so lang als der Schnabel, schmal, hornartig, vorn ein wenig getheilt; Auge lebhaft und feurig; Augenlid befiedert, der Schnitt desselben schief gestellt; die Flügel reichen kaum über die Schwanzwurzel hinaus, die fünfte Schwungfeder scheint die längste; Schwanz abgestuft, aus zwölf zarten, weichen, ziemlich schmalen Federn bestehend; Beine stark, ziemlich hoch, Ferse mit vier bis fünf grossen glatten Tafeln belegt; Zehenrücken ebenfalls getäfelt; äusserste Vorderzehe ein wenig länger als die innere, die Mittelzehe ist die längste; Zehen an der Wurzel ein wenig verwachsen; Ausschnitt an der Sohle der Klauenspitze weniger bemerkbar als an der vorhergehenden Art.

Färbung: Schnabel dunkel horngraubraun, Unterkiefer blafs hornfarben; Iris blafs perlfarben-weiss oder silberfarben; Beine hell schmutzig gelblich-olivengrau; Federn des Scheitels etwas lang, sie werden im Affecte aufgerichtet; alle Obertheile dunkel rostbraun oder röthlich-

braun, Stirn mehr roströthlich überlaufen, *uropygium* allmählig in's hell lebhaft Rostrothe übergehend, eben so der ganze Schwanz, an der Unterfläche aber blässer, und dessen Schäfte an der Wurzel ihrer Oberseite schwarzbraun, an ihrer Unterfläche rostroth; innere Flügeldeckfedern hell rostgelblich; äussere Flügeldeckfedern wie der Rücken, allein die Schwungfedern an der inneren Fahne dunkel schwärzlich-graubraun, Vorderfahne rostbraun, der Rand der hinteren Fahne hell gelblich eingefasst; Kinn, Kehle und Unterhals sind rein hell gelblich-weiß; nach der Brust hin wird diese Farbe mehr gelblich-schmutzig überlaufen, und am Bauche herrscht eine fahl graugelbliche Farbe, in den Seiten etwas olivenbraun überlaufen; Steifs blafs bräunlich-gelb, sehr hell; an der Seite der Kehle und des Unterhalses zeichnet sich die gelblich-weiße Farbe sehr nett und höchst sauber gegen die röthlich-braune der oberen Theile ab, ein Zug, woran man diesen Vogel schon von Ferne erkennt.

Ausmessung: Länge *) 8" 2" — Breite 11" 3" — L. d. Schnabels $8\frac{1}{2}$ " — Br. d. Schn.

*) Diese Vögel befanden sich noch etwas in der Mauser, daher könnten andere Exemplare vielleicht noch um etwas größer befunden werden.

$2\frac{1}{2}'''$ — Höhe d. Schn. $2\frac{3}{4}'''$ — L. d. Flügels $3''$
 $6'''$ — L. d. Schwanzes etwas über $3''$ — Höhe
d. Ferse $10'''$ — L. d. Mittelzehe $6\frac{1}{4}'''$ — L. d.
äufseren Z. $4\frac{1}{8}'''$ — L. d. inneren Z. $3\frac{1}{2}'''$ — L.
d. Hinterzehe $5\frac{1}{4}'''$ — L. d. Mittelnagels $2\frac{3}{4}'''$
— L. d. äufseren N. $2\frac{1}{2}'''$ — L. d. inneren N.
 $2'''$ — L. d. Hinternagels $3\frac{1}{2}'''$.

Weibchen: Am Unterschnabel sind die Federn schon ein wenig gelblich eingefasst oder beschmutzt, wodurch ein etwas gestricheltes Ansehen entsteht, die Stirn hat kleine rothgelbliche Fleckchen, auch bemerkt man am Oberkopfe einige hellere Schaftstriche, doch sehr unbedeutend; Bauch etwas weniger graulich überlaufen, und weniger olivenbraun in den Seiten; untere Schwanzdeckfedern etwas mehr roströthlich gefärbt; *uropygium* und Schwanz etwas dunkler rothbraun; Kinn, Kehle, Unterhals und Backen mehr weißlich; Schnabel an der Wurzel des Unterkiefers etwas gelblich; Schwanz etwas abgenutzt.

Ausmessung: Länge $8''$ — L. d. Schnabels $8'''$ — L. d. Schwanzes $3''$. —

? *Varietät:* Ich besitze noch einen solchen Vogel, der etwas kleiner, dessen Schnabel sehr stark, und etwas mehr gekrümmt, der Schwanz schmaler, kleiner und kürzer ist, und bin zwei-

felhaft, ob er nicht eine verschiedene Species bildet.

Ausmessung: Länge des Schnabels 9^{'''} — Höhe d. Schn. 2 $\frac{1}{2}$ ^{'''} — L. d. Schwanzes beinahe 3^{'''}. —

Ich fand diese schöne Art in den Urwäldern am Flusse *Ilhéos*, unweit der verwilderten Straße des damaligen *Capitão Filisberto*, nachherigen *Tenente-Coronel*. Diese Vögel klettern und steigen an den Aesten, auch wohl zum Theil an den Stämmen umher, und lassen eine laute, sonderbare Stimme hören. Sie sind nicht schüchtern, wir haben sie aber nicht häufig gefunden. In der Beschreibung meiner Reise nach Brasilien (Bd. I. pag. 141) habe ich eine Notiz von diesem Vogel gegeben, bei Gelegenheit der Stelle, wo wir ihn zuerst entdeckten.

Herr Dr. v. *Spix* erwähnt höchst wahrscheinlich meines hier beschriebenen Vogels in seinem *Philydor albogularis*, seine Exemplare scheinen jung gewesen zu seyn, da ihr Kopf gestrichelt war. Er hat sie am *Rio Verde* gefunden.

b. Mit zehn Schwanzfedern.

3. *A. erythrophthalmus.*

Die Kletterdrossel mit rostrother Stirn und Kehle.

K. Körper oliven-graubraun, Schwanz, Stirn und Kehle rothbraun oder rostroth; Iris feuerroth.

Meine Reise nach Bras. Bd. II. pag. 147.

Beschreibung des sehr vollkommenen weiblichen Vogels: Etwas größer als eine Lerche, schlank, mit kurzen Flügeln und ziemlich langem Schwanze. Schnabel etwas kürzer als der Kopf, ziemlich gerade, wenig zusammengedrückt, Firste etwas messerförmig, erhaben, gegen die Kuppe sehr sanft hinabgesenkt, und diese am Oberkiefer etwas über den unteren vortretend; dieser ist vom Kinnwinkel an sehr sanft und ziemlich geradlinig aufsteigend, etwas in den Oberkiefer einpassend; Nasenloch wie an den übrigen Arten, an dem unteren Rande der Nasenhaut länglich-eiförmig-ritzenartig geöffnet, die Federn laufen über der Oeffnung so weit als diese vor; Kinnwinkel nicht gänzlich bis zur Mitte des Schnabels vortretend, mälsig zugespitzt, befiedert; Dille sehr abgerundet; zwischen dem Nasenloche und dem Tomienrande des Oberkiefers läuft eine etwas vortretende Leiste hin; Zunge zwei Dritttheile der Schnabellänge haltend, vorn hornartig, getheilt, und an jeder Seite der Spitze mit einer kleinen Bor-

ste versehen; das Auge steht nahe über dem Mundwinkel, der Schnitt seiner geschlossenen Augenlider ist nicht horizontal, sondern stark schief nach vorn geneigt; Flügel kurz, sie reichen gefaltet kaum über die Schwanzwurzel hinaus, die fünfte und sechste Feder sind die längsten; Schwanz lang, stark, aus zehn abgestuften Federn bestehend, daher abgerundet und zuweilen etwas fächerartig ausgebreitet, die äußerste Feder etwa um einen Zoll kürzer als die mittelsten, sie sind weich, zart, und am Ende mälsig abgerundet; Beine stark, Ferse hoch, mit sechs glatten Tafeln belegt, Zehenrücken ebenfalls getäfelt; die Mittelzehe bedeutend länger als die Nebenzehen, die innerste kürzer als die äußerste, die hintere etwa so lang als die äußerste; zwei äufsere Zehen an der Wurzel nur sehr wenig vereint; Hinternagel bedeutend gröfser als die übrigen.

Färbung: Iris hoch feurig mennigroth, oder feuerroth; Oberkiefer horngraubraun, der untere am Rande eben so, in der unteren Gegend silber- oder weifslich-grau; Füfse schmutzig graulich-olivengrün; Stirn, Kinn, Kehle und der gröfste Theil des Unterhalses, so wie der ganze Schwanz sind lebhaft rostroth, letzterer weniger lebhaft als Stirn und Kehle; der ganze übrige

Körper oliven-graubraun, an Brust und Bauch etwas mehr in's Röthlich-rostgelbe fallend; die kleinen kurzen Flügel haben einen starken Anstrich von Rostroth; alle Deckfedern dunkel graubraun, roströthlich gerandet, Schwungfedern an der Vorderfahne und der Wurzel der inneren ebenfalls hell rostroth; innere Flügeldeckfedern rostroth; Schwanzfederschäfte an ihrer Wurzelhälfte auf der Oberseite schwarzbraun, nach der Spitze hin rothbraun, an ihrer Unterseite rostgelb.

Ausmessung: Länge 7" 9''' — Breite 7" 8''' — L. d. Schnabels, so weit er von Federn entblößt, $6\frac{2}{3}$ ''' — Br. d. Schn. 2''' — Höhe d. Schn. $2\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Flügels 2" 7''' — L. d. Schwanzes 3" 2 bis 3''' — Höhe d. Ferse 10''' — Ferse von Federn entblößt auf $8\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelzehe $6\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äusseren Z. 4''' — L. d. inneren Z. $3\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinterzehe $4\frac{3}{4}$ ''' — L. d. Mittelnagels $2\frac{3}{4}$ ''' — L. d. äusseren N. 2''' — L. d. inneren N. $1\frac{7}{8}$ ''' — L. d. Hinternagels $3\frac{1}{5}$ '''.

Männchen: Vom Weibchen nicht bedeutend verschieden, doch zieht sich die rostrothe Farbe des Unterhalses und der Kehle ein wenig weiter bis auf die Oberbrust hinab. Grösse vollkommen die des weiblichen Vogels.

Junger Vogel: Alle seine Farben sind blässer und weniger nett ausgedrückt, die Stirn ist sehr wenig, d. h. nur blaß rostroth, so wie die Kehle, auch fehlte ihm das Hauptkennzeichen, die prachtvoll mennigrothe Iris, die bei ihm hell graugrünlich gefärbt war.

Einige dieser Vögel fand ich voll einer sehr kleinen Art gelbbraunlicher Läuse.

Dieser schöne Vogel ist mir einer der interessantesten der brasilianischen Urwälder, weil ich seine Lebensart zufällig habe besser beobachten können. Er gehört dort zu jenen Vögeln der geschlossenen Waldungen, welche man von Ferne an ihrer sonderbaren, aus einigen immer gleichartig modulirten Tönen bestehenden, lauten Stimme erkennen kann. Ich hatte diese Species auf meiner ganzen Reise noch nicht beobachtet, bis ich im geschlossenen Urwalde an das Flüschen *Catolé* kam, wo *Capitão Filisberto* bei Anlegung seiner nun verwilderten und kaum mehr erkennbaren Waldstrasse eine Rosse oder ein *Roçado* (Anrodung) zu einer Mandioca - Pflanzung angelegt hatte. In der alten noch hier befindlichen Hütte hielt ich mich mehrere Tage auf, und hörte nun beständig in den hohen von den mannichfaltigsten Schlinggewächsen verflochtenen Waldstämmen,

welche die niederen Gebüsche in der verwilderten Pflanzung umgaben, die sonderbare aus sechs Tönen bestehende Stimme eines Vogels, den ich nicht kennen zu lernen vermochte, bis mir der Zufall endlich günstig war. Dieser Vogel lebt in den inneren dichten, hohen Urwaldungen, in der Brütezeit gepaart, im übrigen Theile des Jahres Familienweise. Als ich in der Mitte des Januar's mich am Flusse *Catolé* aufhielt, wohnte eine solche Familie nahe bei uns und ich konnte sie vollkommen beobachten. In der mit niederem Gebüsche bedeckten Pflanzung standen einzelne alte, hohe, der Zerstörung bei der Urbarmachung dieses Fleckes entgangene Stämme, mit stark belaubter Krone, von deren einem, an einer dünnen langen Schlingpflanze, von einem Seitenzweige ein Bündel von Reisig herabhing, welches das Nest dieser Vögel war. Es bestand in einem länglichen, hohen Ballen von dünnen aufeinander geschichteten, und in einander verflochtenen Reischen, in welchen ohne Zweifel ein kleiner Eingang von der Seite führte, da wir täglich die Vögel hier einkriechen sahen. — Leider habe ich dieses Nest nicht herabnehmen können, da es zu hoch und isolirt hing, ich hätte den Baum niederhauen müssen, allein in

meiner hilflosen Lage in dem endlosen Walde, durfte ich meine Aexte nicht ohne Noth der Gefahr des Zerbrechens aussetzen, Am Tage durchstrichen diese Vögel, zwei alte, und die beiden völlig erwachsenen Jungen, die benachbarten Waldungen, wobei sie beständig ihre laute, sonderbare Stimme hören ließen, die etwa in folgenden Tönen besteht:



Zuweilen hört man vier Töne, oder auch wieder einzelne, lang ausgehaltene, immer höher steigende, und die Vögel haben dabei verschiedene andere Locktöne. Sobald der Abend herankam, hörte man die Familie sich nähern, und sah nun diese Vögel einzeln hinter einander von Ast zu Ast hüpfen, alsdann aber, wahrscheinlich die beiden Jungen, schnell an das hängende Nest fliegen und einkriechen, wo sie beständig, auch schon im erwachsenen Zustande, zu übernachten pflegten. So wie am Morgen der Tag erschien, verließen sie ihren Aufenthalt wieder, ließen sogleich im hohen Walde ihre Stimme hören, und antworteten sich sämmtlich. Sie scheinen muntere, einander sehr liebende Vögel zu seyn, da sie sich beständig antworten und am Abend vereinigen. Wenn

sie in ihr Nest eingekrochen waren, so konnte man mit einem starken Pfeile mehrere Mal gegen dasselbe schießen, bevor sie es verließen. Sie hüpfen mit ihrem langen, gewöhnlich unordentlich bündelförmig ausgebreiteten, ein wenig aufgerichtet getragenen Schwanze, und ihren kurz eingezogenen Füßen auf den Zweigen umher, auch bewegen sie zuweilen diesen rostrothen Schwanz, steigen in allen Richtungen an den an den Waldstämmen mannichfaltig verflochtenen Schlingpflanzen oder *Cipós* hin und her, jedoch seitwärts und nicht nach Art der Spechte, gewöhnlich hüpfend. Es glückte uns, die beiden alten Vögel und den einen der jungen in einem dichten Strauche vereint zu erlegen, und ich fand nun ihre Mägen mit Ueberresten von Insecten angefüllt. Ihre Brut hatten diese Vögel in der Mitte des Monats Januar schon vollendet. Weder vorher noch nachher habe ich diese Vögel wieder erhalten, welche nur der Zufall in jenen weitläufigen, undurchdringlichen Waldungen dem Jäger in die Hände führt. In dem zweiten Bande der Beschreibung meiner Reise nach Brasilien (pag. 147) habe ich die erste Notiz von diesem schönen interessanten Vogel gegeben. Herr Dr. v. Spix scheint ihn nicht gekannt zu haben.

C. *Großschwänzige Kletterdrosseln.*

Schnabel schlank, Beine plump, Ferse hoch, Zehen ziemlich schlank, Schwanz aus zehn abgestuften, weichen, breiten Federn bestehend, die buschig aufgerichtet, bündelförmig und etwas aufgerichtet getragen werden. Sie hüpfen viel, aber sehr ungeschickt und von der Seite, klettern wenig.

? 4. *A. striolatus*, Temm.

Die breitschwänzige Kletterdrossel.

K. Obertheile röthlich-braun, mit hell rostrothen oder rostgelben Schaftflecken; Untertheile olivengraubraun, mit gelblich-weißen, breiteren Schaftflecken; Deckfedern der Flügel ungefleckt röthlich-braun; Schwanz breit, lang, hell brennend rostroth.

Anabates macrourus, s. meine Reise nach Brasilien
Bd. II. p. 147.

Anabate mouchetii, Temm. pl. col. 238. Fig. 1.

Beschreibung des männlichen Vogels:

Größe der Nachtigal, Körper ziemlich schlank, nur mit sehr kurz eingezogenen Beinen und etwas aufgerichtetem Schwanz hüpfend. Schnabel schlank, ziemlich gerade, von der Mitte an nach vorn stark zusammengedrückt, kürzer als der Kopf, die Spitze des Oberkiefers sanft hinabgeneigt, mäßig zugespitzt, kaum länger als die untere; Dille ziemlich gerade, der Kinn-

winkel nicht vollkommen die Mitte der Schnabellänge erreichend; Zunge halb so lang als der Schnabel, Spitze hornartig, ein wenig getheilt, mit einigen Barstfasern an jeder Seite; Augenlid mit kleinen Federchen besetzt, hinter dem Auge befindet sich eine kleine nackte Hautstelle; Flügel gefaltet kaum über die Schwanzwurzel hinausreichend, die vierte Feder ist die längste; Schwanz lang und stark, gebildet wie an der vorhergehenden Art, abgestuft, mit zehn zarten, weichen, breiten Federn, welche gewöhnlich etwas unordentlich bündelförmig und halb aufgerichtet getragen werden, die äußerste Schwanzfeder ist um acht bis neun Linien kürzer als die mittleren; Beine hoch, Zehen schlank, Ferse mit sechs glatten Tafeln belegt, Zehenrücken gefaltet; Mittelzehe bedeutend länger als die Nebensehen, die innerste etwas kürzer als die äußerste, Hinterzehe etwa so lang als die äußerste Vorderzehe; Nägel schlank und sehr zugespitzt, der hinterste ein wenig aufgerichtet und am größten.

Färbung: Iris hell roth, etwas in's Gelbliche fallend; Beine hell olivengrün, Nägel etwas gelblich; Schnabel bräunlich-bleifarben, nach der Wurzel dunkler, nach der Spitze und an den Tornien etwas schmutzig weißlich-horn-

farben; volle Oberseite rostbraun, sehr stark in's Rostrothe ziehend; Scheitelfedern schwärzlich-braun, eine jede mit einem dunkelrothen Längsflecke oder Schaftstriche; Oberhals und Rücken mehr in's Graubraune fallend, mit längeren und helleren rostgelben Schaftflecken; Schulter- und Deckfedern röthlich-braun, mit einigen hell-rostrothen Schaftstrichen an der Vorderfahne und dunkel-graubraun an der hinteren; Schwungfedern dunkel-graubraun, die Vorderfahne rostbraun, der hintere Rand der inneren Fahne gelblich-fahl; innere Flügel blei-roströthlich; Unterrücken und obere Schwanzdeckfedern bräunlich-rostroth, ersterer verloschen heller und lebhafter gestrichelt; der ganze Schwanz hat eine sehr schöne hell brennend rostrothe Farbe, bloß auf der Unterfläche der Federn etwas matter; die Federschäfte sind an der Oberseite der Wurzelhälfte schwärzlich-braun, übrigens rostroth; Kehle weißlich-gelb, die Federn schmutzig gerandet; Unterhals, Brust, Bauch und Steiß graubraun, olivenfarben überlaufen, eine jede Feder mit einem schmutzig weißgelblichen Längsstreifen, welche an Unterhals und Brust mehr zugespitzt sind; Grundfarbe der Brust mehr in's Graubraune, die des Bauchs mehr in's Röthliche fallend;

Seiten des Kopfes und Halses gelblichlich gestrichelt, aber über dem Auge befindet sich ein etwas undeutlich gefleckter weißlicher Längsstreifen. — Der mittlere Hals nützlich, jedoch nicht sehr. —
Ausmessungen: Länge 6 $\frac{1}{2}$ 10 $\frac{1}{2}$ — Breite 8 $\frac{1}{2}$ 11 $\frac{1}{2}$ — L. d. Schnabels 6 $\frac{1}{2}$ — Br. d. Schn. 1 $\frac{1}{2}$ — Höhe d. Schn. 1 $\frac{1}{2}$ — L. d. Flügel 2 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{1}{2}$ — L. d. Schwanzes etwa 3 $\frac{1}{2}$ — Höhe d. Ferses 9 $\frac{1}{2}$ — L. d. Mittelfeher 6 $\frac{1}{2}$ — L. d. äußeren Z. 4 $\frac{1}{2}$ — L. d. inneren Z. 3 $\frac{1}{2}$ — L. d. Hinterzehe 3 $\frac{1}{2}$ — L. d. Mittelnagels 2 $\frac{1}{2}$ — L. d. äußeren N. 2 $\frac{1}{2}$ — L. d. inneren N. 2 $\frac{1}{2}$ — L. d. Hinternagels 3 $\frac{1}{2}$. —

Das Weibchen dieser Art habe ich nicht zu vergleichen Gelegenheit gehabt.

Der sonderbare Vogel dieser Beschreibung ist mir in den großen Urwäldern, und zwar daselbst in dichten niederen Gebüschern vorgekommen, wo er mit kurz eingezogenen Beinen und schüsselförmig aufgeblähtem, ein wenig aufgerichtetem Schwanz scheinbar ziemlich ungeschickt von Ast zu Ast hüpfte, und die verwerrensten, finsternsten Schlupfwinkel durchkriecht. An Stämmen klettert er nicht, wenigstens habe ich dieses nie gesehen, jedoch an Zweigen wohl ein wenig, gewöhnlich hüpfte er aber in dicht verflochtenen Gebüschern, und

läßt seine einfache Lockstimme hören. Ob er noch eine andere lautere Stimme hat, weiß ich nicht, doch vermute ich es. Sein sehr starker, schön hell rostrother Schwanz macht ihn schon von Ferne kenntlich, und da dieser, wenn gleich nicht ganz besonders lang, dennoch im aufgeblähten Zustande einen bedeutenden Umfang hat, so benannte ich den Vogel danach, besonders da die gestrichelte Zeichnung mehrerer dieser Vögel zukommt; ich habe aber nun, seitdem Herr Temminck einen anderen Namen gegeben, zur Vermeidung unnöthiger Vervielfältigung, den letzteren für die *se* Species beibehalten.

Sollte wirklich Temminck's *Anabates striolatus* der hier von mir beschriebene Vogel seyn, wie ich vermuthen muß, so ist die Abbildung (Tab. 338. Fig. 19) nicht gut. Die Gestalt ist hier durch den Mangel der lebendigen Stellung verfehlt, und auch die Farben stimmen nicht ganz mit meinen Exemplaren überein. Sie sind überall zu dunkel, besonders die Schaftstriche auf den Obertheilen, und dem Schwanze fehlt die schön hell rostrothe Farbe, auch sind Füße und Iris unrichtig colorirt. Sollte der von mir beschriebene Vogel ein anderer als Temminck's *Anabates striolatus* seyn, so würde man ihm

die von mir gegebene Benennung; *Anacrocorax* belassen können.

Die Gestalt ist sängerartig, der Schnabel ist lang, die Füsse sind stark, die Flügel sind mittel.

Die Sängervogelartige Kletterdrösel.
Gestalt sängerartig, angenehm, Schnabel ziemlich kurz, höher als breit, Füsse länger als die Mittelzehe, Schwanz aus zwölf Federn bestehend.

5. *A. atricapillus*.

Die schwarzplattige Kletterdrösel.

K. Körper rötlich-olivabrun; Kopf und Schwanz rostroth; Scheitel, ein Streifen durch das Auge und ein ähnlicher unter demselben schwarzabrun.

Sylvia rubricata, Illig.
Meine Reise nach Bras. B. II. p. 127.

Philydor superciliosus, Linn. Syst. Nat. pag. 79. Taf. 79.
Fig. 11. (Linn.)

Beschreibung des männlichen Vogels.

Größe einer Lerche. Schnabel, wie weiter oben angegeben, gerade, mäßig zusammengedrückt, die Dille etwas so viel aufsteigend, als die Füsse abfallend ist; Spitze des Oberkiefers nur sehr wenig über die des unteren vortretend; Nasenhaut über und hinter dem Nasenloche befiedert; Kinnwinkel erreicht nicht die halbe Schnabellänge und ist befiedert; Rand des Augenlides ziemlich nackt; Flügel länger als an der nach

folgenden Art, sie erreichen aber nicht das erste Drittheil des Schwanzes, die vierte Feder ist die längste, die dritte und vierte sind beinahe gleich lang, die erste ist die kürzeste; der Schwanz besteht aus zwölf zarten, weichen, schmalen Federn, ist abgestuft, die äußere Feder etwa um neun Linien kürzer als die mittleren; Beine mäßig stark und hoch; Ferse mit fünf Tafeln belegt, Zehenrücken gefäelt; Verhältniß der Zehen wie angegeben, sie scheinen an der Wurzel beinahe frei, sind also nur wenig vereint; Hinternagel viel größer als die vorderen.

Färbung: Ueber dem Auge hin zieht ein hell rothrother Streifen, der sich an der Seite des Hinterkopfs verliert, unter diesem bemerkt man durch den Zügel und das Auge einen schwarzbraunen Strich, der sich über dem Ohre endigt, unter diesem wieder einen helleren, der alsdann an seiner Unterseite wieder durch einen schwarzbraunen Streifen begrenzt ist, letzterer entspringt am Unterkiefer und verliert sich unter dem Ohre; alle Obertheile des Vogels zeigen ein dunkles, röthliches Braun, welches am Unterrücken zum lebhaften Rothbraun wird, und in einer noch helleren, lebhafteren Mischung den ganzen Schwanz ohne andere Zeichnung bedeckt; Kehle, Seiten und Unter-

hals lebhaft hell rostgelb, in's Rostrothe fallend, über der Brust entsteht aber schon wieder eine mehr trübe Farbe, ein fahles Rostbraun, welches ungefleckt den ganzen Unterkörper bedeckt, und am Steisse schon wieder mehr in's Rostrothe fällt; Flügel dunkel röthlich-braun, etwas olivenbraun überlaufen; große Deck- und Schwungfedern schwärzlich-graubraun, mit breitem röthlich-olivenbraunem Saume und Vorderfahne, hinterer Rand der inneren Schwungfederfahne fahl gelblich; innere Flügeldeckfedern hellgelbbrüthlich; Schnabel schwärzlich-hornbraun, die Ränder des Mundwinkels gelb; Iris braun; Beine hell olivenfarben.

Ausmessung: Länge ungefähr 6" — L. d. Schnabels $6\frac{3}{4}$ " — Breite d. Schn. 2" — H. d. Schn. $2\frac{1}{4}$ " — L. d. Flügels 3" $2\frac{1}{4}$ " — L. d. Schwanzes 2" 11" — Höhe d. Ferse $7\frac{1}{4}$ " — L. d. Mittelzehe $5\frac{1}{4}$ " — L. d. äußeren Z. $3\frac{3}{4}$ " — L. d. inneren Z. $3\frac{1}{4}$ " — L. d. Hinterzehe $3\frac{1}{4}$ " — L. d. Mittelnagels $2\frac{1}{4}$ " — L. d. äußeren N. 2" — L. d. inneren N. $1\frac{1}{4}$ " — L. d. Hinternagels $2\frac{1}{4}$ ".

Weibchen: Es findet in dem Gefieder der beiden Geschlechter kein bedeutender Unterschied statt, das Weibchen scheint bloß ein wenig kleiner, und seine Färbung etwas heller,

an den Obertheilen scheinbar mehr in's Rötliche, an den Untertheilen mehr in's Gelbliche ziehend. Dr. *u. Spix* glaubt, daß in dem Schnabel beider Geschlechter eine Verschiedenheit existire; allein ich kann versichern, daß bei sehr vielen Exemplaren, welche ich in dieser Hinsicht untersuchte, mir kein Abweichen bemerkbar geworden ist, auch ist mir bei diesen Vögeln nie ein gezählter Schnäbel vorgekommen, welches wohl nur als Ausnahme stattfinden dürfte.

Dieser Vogel lebt außer der Paarzeit in kleinen Gesellschaften in den geschlossenen Urwäldern, zieht von Baum zu Baum umher, ist lebhaft, sehr beweglich, steigt an den Zweigen umher, an welche er sich, gleich unseren Meisen (*Parus*), anhängt, die Blätterknospen und die Rinde nach Insecten, ihren Eiern und Puppen durchsuchend. Im August und Anfange des Septembers fand ich diese Vögel in kleinen Flügen vereint, sie eilen schnell von einem Ast zu dem andern, und verschwinden auf diese Art bald aus dem Gesichte des Beobachters. Ihre Stimme ist zirrend. In der Beschreibung meiner Reise (Bd. II. pag. 147) habe ich von dieser Species eine kurze Beschreibung und Notiz gegeben, sie war von *Müller* im

Museo zu Berlin unter der Benennung der *Sylvia rubricata* aufgestellt, nachdem sie Sieber aus Brasilien gesandt hatte. Sie scheint über ganz Brasilien verbreitet zu seyn, da sie Spix auch in Minas fand. Die Spix'sche Abbildung ist nicht zu verkennen, allein die Beine sind an denselben nicht naturgetreu, ihre Farbe und Stellung verfehlt.

Sylvia rufifrons, Illig. *Anabates rufifrons*, Spix Av. Tab. 85. Fig. 1. Die roststirnige Kletterdrossel.

K. Körper hell bräunlich-olivengrau, unten blässer; Stirn dunkel rostbraun; Schwanzfedern röthlich-olivengrün überlaufen; ein weißlicher Strich über dem Auge.

Siehe meine Reise nach Bras. Bd. II. pag. 177.

Sylvia rufifrons, Illig.

? *Sphenura frontalis*, Licht. Verz. pag. 42.

Anabates rufifrons, Spix Av. Tab. 85. Fig. 1.

Beschreibung des weiblichen Vogels: Gestalt und Gröfse einer *Sylvia*, Schwanz mehr schmal und unten sanft rundlich zugespitzt, Flügel kurz. Schnabel kürzer als der Kopf, stark zusammengedrückt, mehr als an No. 5., ziemlich gerade, aber etwas weniger als an der eben genannten Art, nur die Oberkieferkuppe sehr sanft über die des geraden Unterkiefers herab

geneigt; Kinnwinkel etwa ein Drittel der Schnabellänge, besiedert; alle übrigen Theile, selbst die Zunge wie an *Arabates erythrophthalmus*; Auge lebhaft; Augenlid ein wenig nackt; Flügel kurz und abgerundet, reichen kaum über die Schwanzwurzel hinaus; die vierte Schwungfeder die längste; Schwanz aus zwölf schmalen, abgestuften, mälsig rundlich zugespitzten Federn bestehend, welche einander in der Ruhe ziemlich decken, die äußerste über einen Zoll kürzer als die mittleren; Beine hoch und stark, Lauf- und Zehenrücken getäfelt, ersterer mit fünf glatten Tafeln belegt; äußerste Zehe nur sehr wenig länger als die innerste, Hinterzehe etwa so lang als die innerste, die Mittelzehe um ihr ganzes Vorderglied länger als die innerste; Vorderzehen an der Wurzel ein wenig vereint; Nägel etwa wie bei den Sängern (*Sylvia*).

Färbung: Oberkiefer dunkel horngrau-braun, Unterkiefer weißlich - horngrau; Iris aschgraulich; Beine blaß bleifarben, an den Zehen ein wenig graubräunlich überlaufen; alle Obertheile haben ein leichtes, blasses Graubraun, hier und dort ein wenig gelblich überlaufen; Stirn und Scheitel mit schmalen, zugespitzten Federn bedeckt, die aber keine Haube bilden;

Stirn dunkel rostbraun; über das Auge hin zieht ein undeutlicher, blaß weißgrauer Strich; alle unteren Theile blaß bräunlich-weißgrau, an After und Seiten stark gelblich überlaufen, die Kehle und Mitte des Bauchs fallen am stärksten in die weiße Farbe; Schwungfedern graubraun mit blaßröthlichem Olivenschimmer auf der Vorderfahne; Flügel so wie alle Obertheile etwas olivenbräunlich überlaufen.

Ausmessung: Länge 6'' 9''' — L. d. Schnabels 5 $\frac{1}{4}$ ''' — Höhe d. Schn. 2''' — Br. d. Schn. 1 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Flügels 2'' 3 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Schwanzes etwa 2'' 6''' — Höhe d. Ferse 7 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelzehe 6''' — L. d. äußeren Z. 3 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. inneren Z. 3''' — L. d. Hinterzehe 3 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Mittelnagels 2''' — L. d. äußeren N. 1 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Hinternagels 2 $\frac{1}{2}$ ''' . —

Männchen: Von dem weiblichen Vogel kaum zu unterscheiden, bei sehr genauer Vergleichung findet man auf der Stirn des ersteren ein wenig mehr Rothbraun, auch ist der Unterleib etwas mehr rein graubräunlich-weiß. Auch in der GröÙe scheint der Unterschied unmerkbar.

Dieser niedliche aber einfach gefärbte Vogel ist mir in den großen Küstenwäldern nie

storgekommen, und ich habe ihn bloß in den inneren, höheren, von der Sommerhitze ausge- trockneten Gegenden des Sertong der Provin- zen *Minas Geraës* und *Bahia* gefunden, wo er die offenen, mit Gebüsch abwechselnden Gegenden bewohnt, und behende von einem Baum oder Strauche zu dem andern fliegt und schlüpft. In der Lebensart scheint er dem *Anabates erythrophthalmus* nahe zu stehen. Ich fand ihn zuerst in der Gegend von *Anji- cos*, unweit *Barra da Vareda*, wo er sehr gemein war. Seine Nahrung scheint in Insec- ten zu bestehen. Dieser Vogel ist höchst in- teressant durch seinen merkwürdigen Nestbau. Ich fand dieses Nest in der Mitte Monats Fe- bruar, wo es Eier enthielt. An niederen, schlanken Seitenästen mittelmässig hoher Bäu- me fand ich ihrer sehr viele, sobald ich die großen Waldungen verlassen hatte. Dieses Nest bildet einen länglich-runden großen Bündel von kurzen, zum Theil halbfingerdicken Reisern, welche auf mannichfaltige Art quer durch ein- ander gefilzt und auf einander gehäuft sind, ihre Enden stehen sämmtlich nach allen Seiten unordentlich hinaus, so daß man ein solches, zum Theil drei und mehrere Fuß langes Nest, kaum angreifen kann. Die Reischen sind sämmt-

lich mit verschiedenartigen Bindematerialien zusammen befestiget. Nahe an der Basis oder dem unteren herabhängenden Ende hat der Vogel einen kleinen runden Eingang, er steigt alsdann inwendig aufwärts, und hat nun in dem äusseren grossen Reisigbündel das eigentliche Nest, von Moos, Wolle, Fäden, Bast und dürrem Grase recht dicht zusammengewebt, in welchem ich vier rundliche, rein weisse Eier fand. Reisst man den äusseren grossen Reisigbündel auseinander, so findet man darin, wie gesagt, das eben beschriebene, kleine, rundliche, ebenfalls oben geschlossene Nest von Moos, in welchem der Vogel sehr weich, warm und sicher sitzt. Auf diese Art vergrößert er alljährlich sein Nest, indem er immer in der nächsten Paarzeit auf den vorjährigen Reisigbündel, rings um den schlanken Zweig herum, einen neuen setzt, und darin sein kleines Moosnest erbaut. Man findet diese sonderbaren Gebäude, wie gesagt, oft drei bis vier Fuks lang an einem Aste herabhängen, und sie sind zum Theil so schwer von Holz, daß ein Mann sie kaum schwebend zu halten vermag. Oeffnet man diesen originellen Bau, so findet man zu oberst jedesmal das neue, und unter diesem eine Reihe von alten Nestern, die oft von Mäu-

sen bewohnt werden, wie ich in dem zweiten Bande der Beschreibung meiner Reise nach Brasilien (pag. 423) angegeben habe.

Spix fand diesen Vogel in der Provinz *Minas Geraës*, er behielt in seinem ornithologischen Werke, den von mir gegebenen Namen bei. Seine Abbildung ist ziemlich deutlich, allein die Beine sind schlecht gezeichnet, wie an allen jenen Abbildungen, und die Untertheile sind zu dunkel gefärbt. Ich füge schliesslich noch hinzu, daß der hier beschriebene Vogel auch in das *Genus Synallaxis* gesetzt werden könnte, daß aber sein Schnabel stärker und höher ist, weshalb ich vorzog ihn hierher zu stellen. Er zeigt auch in Lebensart, Manieren und Nestbau mehr Aehnlichkeit mit *Anabates*, macht aber hier einen vollkommenen Uebergang zu *Synallaxis* und den Sängern.

Sect. 7. Gregarii, Illig.

Fam. XVII. Oriolidae, Boi.

Pirolartige Vögel.

Man könnte die gegenwärtige Familie mit *Illiger Gregarii* nennen, da sie meist Gesellschaft liebende Vögel enthält, welche selbst zum Theil gesellschaftlich nisten. Sie sind zahlreich, lebhaft, beweglich, meist Omnivoren, bauen ein künstliches oft beutelförmiges Nest, haben ein oft bunt abwechselndes, mit schwarz und gelb, schwarz und roth, oder braun bezeichnetes Gefieder, eine laute, oft abwechselnde, oft flötende Stimme, sind den Baum- und Feldfrüchten gefährlich, und man stellt ihnen deshalb nach. In ihren Geschlechtern zeigt sich ein vollkommener Uebergang zu den Krähenarten (*Corvus*), auch gehen sehr viele von ihnen, wie diese, auf dem Boden umher,

besonders zwischen dem waidenden Viehe auf den Triften.

Gen. 45. Icterus, Briss.

Trupial.

Ich nehme dieses *Genus* wie *Daudin*, der davon einige Vögel ausschied, nachdem es von *Brifson* aufgestellt war. Die Trupiale sind in *America*, besonders der südlichen Hälfte dieses Continents, zahlreich an Arten und Individuen, ihre Gesellschaften beleben die Gebüsche, die Wälder, die Rohrbrüche und die Viehtriften. Sie haben meistens ein schwarzes, mit braun, gelb oder roth mannichfaltig gezeichnetes Gefieder, zum Theil einen abwechselnden, flötenden Gesang, zum Theil bloß laute abwechselnde Stimmen, und die Gabe andere Vogelstimmen nachzuahmen. Sie bilden den Uebergang von den Drosseln zu den Cassiken, und diese schliessen sich an die Krähen (*Corvus*) an. Sie nähren sich von Früchten und Insecten, und bauen meistens ein beutelförmig oder korbformig aufgehängtes, oft ein oben verschlossenes Nest. Den Pflanzungen von Mais und Reis sind sie gefährlich, sie richten darin zuweilen Verwüstungen an, weshalb man ihnen

nachstellt. Viele werden ihrer empfehlenden Eigenschaften wegen im Käfig gehalten.

A. Trupiale, deren Schnabel auf der Firste sanft gewölbt, oder geradlinig ist.

1. *I. Jamacaii*, Daud.

Der schwarz und feuerfarbige Trupial, Soffré.

T. Kopf, Vorderhals, Flügel, Oberrücken und Schwanz schwarz; ein weißer Fleck auf dem Flügel; übriges Gefieder feuerfarbig oder lebhaft orangenroth.

Oriolus Jamacaii, Linn., Gmel., Lath.

Daudin ornithol. II. pag. 335.

Carouge du Brésil, Briss., Buff.

Pendulinus Jamacaii, Vieill. tabl. encycl. 706.

Meine Reise nach Bras. B. II. p. 175.

Soffré im östlichen Brasilien.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt zierlich und schlank. Schnabel so lang als der Kopf, gerade, kegelförmig, höher als breit, sehr zugespitzt, beide Kiefer etwa gleich lang, von der Nase an zusammengedrückt, die Tomien beider Kiefer von der Mitte an eingezogen; Firste gerade, rundlich-kantig, nach der Spitze kaum merklich hinabgesenkt; Nasenloch in einer kleinen Vertiefung, rundlich-ei-

förmig, von oben durch eine kleine Hautschuppe geschützt, die Nasenfedern treten bis dahin vor; Unterkiefer an der Wurzel breiter als der obere; Kinnwinkel kaum ein Dritttheil der Schnabellänge, mälsig zugespitzt, befiedert; Dille geradlinig, an der Wurzel abgeflächt, gegen die Spitze hin abgerundet; Bartborsten fehlen; Zunge schmal, etwas rinnenförmig, vorn getheilt und an beiden Seiten kammförmig gefranst; Auge sehr lebhaft, die Augenlider nackt, am Rande mit Wimperfederchen besetzt; Flügel zugespitzt, mälsig lang, die dritte Schwungfeder ist die längste; Schwanz abgerundet, ziemlich lang, die zwölf Federn schmal, ein wenig zugespitzt, die äufsere um zehn Linien kürzer als die mittleren; Beine stark, ziemlich hoch, Ferse mit sechs glatten Tafeln belegt, die Sohle hat an der inneren Seite eine Tafel, an der äufseren einige wenige; zwei äufsere Zehen an der Wurzel ein wenig vereint; Hinternagel stark und gewölbt.

Färbung: Iris im Auge blafs weifslichgelb; Schnabel schwarz, die Wurzel des Unterkiefers bleifarben; Beine bläulich-bleifarben, beinahe himmelblau; nackte Augenlider aschgrau; Kopf, Kinn, Kehle, ganzer Unterhals mit der Mitte der Oberbrust schwarz, so wie der

Mittlrücken, Flügel und Schwanz; am Hinterkopfe sind die Federn orangefarben mit schwarzen Spitzen, doch bemerkt man äußerlich nur das Schwarze; Oberhals mit einem Theile des Oberrückens, *uropygium*, Seiten des Halses und der Brust, so wie der ganze übrige Unterkörper bis zum Schwanze prächtig orangeroth oder feuerfarben; von derselben schönen Farbe ist das Achselgelenk, oder die oberen kleinen Flügeldeckfedern am Buge; ein Theil der hinteren Schwungfedern mit einem weißen Streifen an der Vorderfahne, wodurch ein geschlossener weißer Fleck entsteht; innere Flügeldeckfedern orangefarben; Schwanzfedern an der Wurzel ein wenig weißlich, übrigen schwarz.

Ausmessung: Länge 10" 1" — Breite 13" — L. d. Schnabels 11" — Br. d. Schn. 2 $\frac{3}{4}$ " — Höhe d. Schn. 3 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Flügels 4" 5 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Schwanzes 4" 5" — Höhe d. Ferse 1" 1" — Sie ist unbefiedert auf 10 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Mittelzehe 7 $\frac{1}{2}$ " — L. d. äußeren Z. 5 $\frac{1}{2}$ " — L. d. inneren Z. 5 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinterzehe 5 $\frac{3}{4}$ " — L. d. Mittelnagels 2 $\frac{7}{8}$ " — L. d. äußeren N. 2 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinternagels 4".

Weibchen: Etwas kleiner als das Männchen, eben so gefärbt, aber weniger lebhaft

und feurig, besonders sind die Untertheile weniger lebhaft orangeroth.

Ausmessung: Länge 9" 5^{'''}. —

Junges Männchen: Ein Theil der kleinen Flügeldeckfedern schwarz, schmal gelb eingefasst; die orangefarbenen Theile sind nur gelb mit orangerothen Federspitzen, an Bauch und oberen Schwanzdeckfedern feuerfarben, oft verloschen und blafs.

Junges Weibchen: Farbe des vorhergehenden; Iris sehr blafs weißlich-gelb; Beine weißlich-bleifarben.

Dieser schöne Vogel ist eine der größten Zierden der dicht belaubten Baumkronen. Er ist mir weder in den südlichen Gegenden, noch an der ganzen Ostküste vorgekommen, ich traf ihn dagegen, als ich in den inneren Sertong der Provinzen *Bahia* und *Minas* kam. *Azara* führt ihn nicht auf. Wir fanden ihn zuerst zu *Tamburil*, wo ich sein prächtvoll feuerfarbiges Gefieder wie eine Flamme im dunkeln Laube glänzen sah, während seine Stimme uns unterhielt. Sie ist höchst abwechselnd und mannichfaltig, indem er andern Vögeln nachahmt, dabei allerlei originelle Strophen einmischt, und mancherlei Töne hervorbringt, auch ersetzt hier etwa dieser Vogel unsern deutschen

Pirol (*Oriolus galbula*, Linn.) durch die Schönheit des Gefieders und die laute volltönende Stimme. Der Soffré lebt in der Brütezeit gepaart, man sieht ihn auf der Spitze eines mäßig hohen Baumes, oder an der äußeren Seite einer dickbelaubten Baumkrone, in welche er sogleich einschlüpft, sobald man sich ihm nähert, ohne jedoch ganz besonders scheu zu seyn. Nach der Paarzeit soll er in kleinen Gesellschaften oder Familien vereint umherstreichen, doch mehr einzeln und weniger gesellig als andere nachfolgend beschriebene Vögel. Seine Manieren sind angenehm, die Gestalt schlank, er ist sehr lebhaft, gewandt, in steter Bewegung, und hält sich besonders gern da auf, wo die dichten Waldungen an Pflanzungen, offene oder urbar gemachte Stellen gränzen. In seinem Magen fand ich Ueberreste von Insecten, allein er sucht besonders alle Arten reifender Früchte auf, stellt vorzüglich den Orangen und Bananen nach, thut auch an diesen in Gesellschaft anderer Vögel Schaden. Zur Zeit der Reife jener Früchte kommt er den menschlichen Wohnungen sehr nahe. Die Bewohner der dortigen Gegenden kennen ihn unter der Benennung *Soffré*, welche zum Theil seine Stimme ausdrücken soll.

Einer meiner Jäger fand das Nest eines Paares dieser Vögel, welches aber nicht nach der Art gebaut war, wie man es gewöhnlich beschreibt. Es stand etwa acht bis neun Fuß hoch auf einigen horizontalen Baumzweigen, beinahe nach der Art des Nestes unseres europäischen Pirols, jedoch war es nicht hängend, bildete einen Ballon von dürrn Reischen, war oben verschlossen, und hatte den Eingang an der einen Seite; man fand es in der Mitte Februar's eben vollendet, aber noch leer.

Der von *Buffon pl. enl. No. 532* abgebildete Vogel giebt eine sehr richtige Idee unseres hier beschriebenen Trupials, wenn man den oberen weissen Queerstreifen des Flügels wegnimmt, und einen gelben dafür hinsetzt, auch sind alsdann Schnabel und Beine anders zu coloriren.

2. *I. cayanensis*, Daud.

Der gelbschultrige Trupial.
T. Ganzer Körper schwarz, ein Fleck auf den Schultern gelb; Schenkelfedern gelb gemischt.

Oriolus cayanensis, Linn., Gmel. Lath.

Le Carouge de l'isle St. Thomas, Buff. pl. enl. 535.

Fig. 2.

Daudin ornith. II. pag. 336.

*Le Troupiale noir à couv. des ailes jaunes, d'Azara
Voy. Vol. III. pag. 184.*

Meine Reise nach Bras. B. II. pag. 341.

*Paga im östlichen Brasilien, in andern Gegenden In-
contro.*

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt schlank und zierlich, Gröſse einer Lerche. Schnabel etwas kürzer als der Kopf, vollkommen gebildet wie an No. 1., allein etwas weniger hoch, dennoch weit höher als breit, sehr zugespitzt, Oberkiefer etwas länger als der untere; Nasenloch eiförmig, nach oben mit einer Hautschuppe bedeckt; Kinnwinkel mehr als ein Dritttheil der Schnabellänge, befiedert; einige schwarze Bartborsten am Mund- und Kinnwinkel; Zunge beinahe so lang als der Schnabel, vorn tief getheilt, etwas gefranst; Augenlid ziemlich nackt, am Rande ein wenig bewimpert; Flügel mäſsig lang, erreichen etwas mehr als ein Dritttheil des Schwanzes, die dritte und vierte Schwungfeder sind die längsten; Schwanz lang und schmal, abgerundet, die Federn am Ende stark abgenutzt, die äußerste an diesem Exemplare um beinahe einen Zoll kürzer als die mittleren; Beine mäſsig hoch, schlank; Ferse mit fünf glatten Tafeln belegt, ihre Sohle scharf zusammengedrückt; Zehen wie an No. 1.

hoch pfeifenden Ton dieses Vogels, welches ich öfters hörte. In der kalten Jahreszeit, besonders im Monat August, fliegt er stark auf die Orangenbäume, Mammonen (*Carica*) und andere Früchte. Sein Nest soll dieser Vogel vorzüglich gern in den verlassenen beutelförmigen Wohnungen des *Japú* oder *Guasch* (*Cassicus cristatus* und *haemorrhous*) aufschlagen, ich habe aber nie ein solches gefunden.

Buffon's Abbildung ist ziemlich gut, doch ist mancher Zug darin verfehlt, auch Iris und Beine unrichtig gefärbt.

3. *I. unicolor*, Licht.

Der schwarze Trupial mit zugespitzten Halsfedern.

T. Schwarz, mit einem leichten bouteillengrünen Schimmer; Federn des Kopfes und Halses schmal zugespitzt.

Lichtenstein's Verz. d. Doubl. d. berl. Mus. pag. 19.

Le Chopi, d'Azara Voy. Vol. III. pag. 173.

Joncogo im Sertong von Bahía.

Virabosta in den mehr südlichen Gegenden.

Beschreibung des männlichen Vogels:
Größe etwa einer Amsel. Schnabel stark, kürzer als der Kopf, höher als breit, von der Mitte nach vorn zusammengedrückt, Tomien eingezogen, Firste sanft gewölbt, in einer Flä-

che mit der Stirn liegend, stark abgerundet, und ziemlich breit, beide Kiefer zugespitzt, der obere ein wenig länger als der untere; Nasenloch eiförmig, an der Spitze der befiederten Nasenhaut, mit einer gewölbten Schuppe überdeckt; Unterkiefer an der Wurzel höher und breiter als der obere; der Oberkiefer ist von dem Nasenloche nach seinem Rande hin mit schiefen, erhöhten Linien oder Streifen bezeichnet, der untere hat ganz ähnliche, welche von dem unteren Winkel der Wurzel desselben nach dem Rande schief hinauflaufen; Kinnwinkel etwa ein Dritttheil des Schnabels, mälsig abgerundet, befiedert; Zügel und Kinnwinkel mit kurzen, schwarzen Borsten besetzt; Augenlider nackt; Federn des Obertheils des Kopfs und Halses schmal lancettförmig zugespitzt; Flügel stark, erreichen etwa ein Dritttheil des Schwanzes, die dritte Schwungfeder ist die längste; Schwanz ziemlich stark, beinahe gleich, geöffnet sanft abgerundet, die äußersten Federn drei Linien kürzer als die mittleren; Beine stark, Ferse zusammengedrückt, ihr Rücken mit fünf glatten Tafeln belegt, die Sohle scharf zusammengedrückt und gestiefelt; Mittelzehe viel länger als die Nebenzehen, die beinahe einander gleich sind; zwei äußere Vorderzehen an der Wurzel

vereint, alle auf ihrem Rücken getäfelt, wie an allen verwandten Vögeln; Nägel gestreckt.

Färbung: Iris graubraun; Schnabel und Beine schwarz; ganzes Gefieder schwarz, mit etwas dunkel bläulich-bouteillengrünem Glanze; die Schwungfedern haben diesen Glanz an der Vorderfahne, an den Schwanzfedern fehlt er beinahe gänzlich.

Ausmessung: Länge 9" 3''' — Breite 14" 9''' — L. d. Schnabels 10 $\frac{1}{8}$ ''' — Br. d. Schn. 3''' — Höhe d. Schn. 3 $\frac{5}{8}$ ''' — L. d. Flügels 4" 7 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Schwanzes 3" 8''' — Höhe d. Ferse 1" $\frac{2}{3}$ ''' — Sie ist befiedert auf 9 $\frac{7}{8}$ ''' — L. d. Mittelzehe 9 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. äußeren Z. 6 $\frac{1}{3}$ ''' — L. d. inneren Z. 6 $\frac{2}{3}$ ''' — L. d. Hinterzehe 5 $\frac{1}{2}$ ''' — L. d. Mittelnagels 3''' — L. d. äußeren N. 2 $\frac{1}{3}$ ''' — L. d. Hinternagels 4 $\frac{1}{8}$ '''.

Weibchen: Hat weniger Glanz als das Männchen, den jungen Vögeln fehlt er gänzlich, *Azara* hat wahrscheinlich einen solchen beschrieben. *Nosedá* sagt bei *Azara* (Vol. III. pag. 177), daß der Metallglanz sich verliere, sobald der Vogel ausgewachsen sey, allein dieß hat sich in meiner Erfahrung nicht bestätigt; denn die alten Männchen habe ich immer mit grünem, wenn gleich nicht sehr starkem Metallglanze befunden.

Zu den Nachrichten, welche *d'Azara* von unserem Vogel giebt, will ich Folgendes hinzufügen. Ich traf ihn in ziemlich zahlreichen Flügen oder Gesellschaften, als ich im Monat Februar die offenen Triften des Inneren der Provinzen *Bahía* und *Minas* erreichte. Auf jenen weiten Viehtriften in der Nähe von *Angicos* und *Vareda* waren diese Vögel sehr gemein. Sie hüpfen in der Nähe der Wohnungen umher, suchten zwischen dem waidenden Rindvieh Insecten und Körner, fielen zuweilen auf einen Zaun oder ein Gebüsch ein, und ließen das Concert ihrer mannichfaltigen Töne hören. Sehr gerne fuhren die zahlreichen Flüge besonders auf den Gesträuchen in der Nähe der Triften, zuweilen auf einem hohen Baume, sie blieben daselbst in einem beständigen Zwitschern und Singen, wie unsere Staare (*Sturnus*) in gewisser Jahreszeit, und flogen nach den Viehtriften ab und zu. Sie haben mit unseren Staaren in der Lebensart sehr viel Aehnlichkeit. Ihre Stimme ist abwechselnd und mannichfaltig, sie hat einige melodische Strophen, mitunter auch einige helle Pfliffe. Das Nest dieses Vogels beschreiben *Azara* und *Nosedá*, ich habe nicht Gelegenheit gehabt, ein solches zu finden.

Man findet zwischen den Schwärmen dieser Pirole immer noch ähnliche, weit kleinere Vögel, welche ich mit *Azara* für Junge halte. In den nördlichen von mir bereis'ten Gegenden wird der eben beschriebene Vogel *Joncongo*, mehr südlich *Virabosta* genannt.

4. *l. violaceus.*

Der violettglänzende Troupial.

T. Ganzer Körper schwarz, im Lichte an allen Theilen gleichartig prächtig violett schillernd; Flügel ein wenig mehr bläulich schillernd.

Le Troupiale commun, d'Azara Voy. Vol. III. p. 169.

Oriolus violaceus, s. Beschr. meiner Reise nach Bras.

B. I. p. 53 u. a. a. Orten.

? *Petit Troupiale noir*, Buff.

? *Oriolus niger*, Linn.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt angenehm, im Allgemeinen die der vorhergehenden Art, allein mehr schlank, Schnabel im Verhältniß ein wenig höher. Der Schnabel ist viel höher als breit, etwas kürzer als der Kopf, zugespitzt, der Oberkiefer ein wenig länger als der untere; Firste an der Wurzel ein wenig abgeplattet, diese Bildung macht daher einen kleinen Uebergang zu *Cassicus*; Tomien stark eingezogen; Kinnwinkel abgerundet; Dille

an der Wurzel abgeflacht, vor ihrer Spitze ein wenig kantig; unteres Augenlid nackt; die Flügel sind ziemlich stark, fallen über ein Drittheil des Schwanzes hinaus, sind schlank, zugespitzt, die dritte Feder die längste; Schwanz mässig stark, sehr sanft abgerundet, die äusserste Feder um zwei und eine halbe Linie kürzer als die mittleren; Beine ziemlich hoch, Ferse stark zusammengedrückt, mit sechs glatten Tarseln belegt; Zehen schlank, die mittlere viel länger als die Nebenzehen; zwei äusserste Vorderzehen, an der Wurzel ein wenig vereint; Nägel schlank und etwas gestreckt, zum Gehen auf dem Boden eingerichtet, wie bei der vorhergehenden Art.

Färbung: Iris braun; Schnabel und Beine schwarz; der ganze Vogel ohne Ausnahme schwarz, mit einem prächtigen, sehr glänzenden und lebhaften violetten Schiller, der vorzüglich, im Sonnenlichte im höchsten Grade glänzt; an allen Theilen des Körpers ist dieser Glanz gänzlich gleichartig, nur an den grossen Deck- und Schwungfedern der Flügel, so wie am Schwanze, fällt er mehr in's Bläuliche.

Ausmessung: Länge 7" 1^{'''}. — Breite 12" 3^{'''}. — L. d. Schnabels 7⁷/₈" — Höhe d. Schn. 3¹/₂" — Br. d. Schn. 2¹/₂". — L. d. Flügels 4"

3 1/2 Zoll d. Schwanzes etwa 3 1/4 Zoll Höhe d. Bürse; 11 1/2 Zoll — bislang ist entblößt auf 9 Zoll — L. d. Mittelfeße 3 1/4 Zoll L. d. äußeren Z. 5 1/4 Zoll L. d. inneren Z. 5 1/2 Zoll L. d. Hinterzehe 4 1/4 Zoll L. d. Mittelnagels 3 3/4 Zoll L. d. äußeren N. 3 1/4 Zoll L. d. inneren N. 3 1/4 Zoll L. d. Hinter nagels 4 1/4 Zoll

Weibchen: Ganzer Körper bräunlich-aschgrün, an den Obertheilen etwas bläulich glänzend, Flügel und Schwanz ein wenig mehr ins Bräunliche ziehend; über dem Auge eine undeutliche hellere Linie; Bauch etwas undeutlich dunkler längsgefleckt oder gestrichelt; Kehle etwas blässer als die übrigen Untertheile; Iris braun; Beine und Schnabel bräunlich-schwarz; untere Schwanzdeckfedern mit hellerem Spitzensaume.

Messung: Länge 7 1/4 Zoll — Breite 11 1/4 Zoll.

Jünger Vogel: Bedeutend kleiner. Er ist an den Untertheilen noch heller gefärbt, als das Weibchen, dabei weniger gefleckt, der Metallglanz fehlt an den Obertheilen, die Flügeldecken sind heller gerandet, übrigens wie das Weibchen.

St. Dieser Trupial ist besonders häufig in der Gegend des *Parakyba* und bei *Cabo Rio* auf allen Vögeln, wo er zum Theil in zahlrei-

ehen Gesellschaften lebt. Man trifft ihn auch an freien Stellen im Walde, aber immer in offenen Triften. Hier hüpfet er auf der Erde umher, schreitet wie unser Staar mit aufgerichteten Körper zwischen dem weidenden Viehe, und giebt gewöhnlich keine Lockstimme von sich, ob er gleich ziemlich angenehm singen soll. Er sucht Insecten, Gewürze und Samen, setzt sich auch auf den Rücken des Viehes, um die Insecten abzulesen. Männchen, Weibchen und Junge, in dem ganz verschiedenartigen Kilde, sind mit einander gemischt, und man hält sie anfänglich für ganz verschiedene Arten. Sie ziehen in Flügen umher, sitzen am Rande der Waldungen, ich habe aber ihr Nest nicht gefunden. Zum Essen sind sie sehr gut, man kann über oft mehrere auf einen Stuhl verlegen. Die Brasilianer in den südlichen Gegenden nennen sie *Kirabosta*, im Sertão von Bahia *Juchongo*. Ich weis nicht, ob dieser in obigen Zeilen beschriebene Vogel vielleicht der *Troglodytes communis* des Azara ist, ich habe ihn deshalb mit einem ? versehen. Mir scheint *Icterus virens* eine andere Species zu bilden. Wegen obiger Beschreibung

Die Trupiale, deren Schnabelfarbe etwa so aussieht, wie auf dem Foto zu sehen ist, ist geschweifelt.

5. 5. 11. atrocolineae

Der kollektiven burleske Truppiant.
T: Oberkörper schwärzlich olivengrün; Schwanz
und Flügel beinahe schwarz; Federn des Halses
und Rückens olivengrün; gerandete Kinn-, Kehle,
Unterhals, Mitte der Brust und das Bauches plü-
vengrün.

Beschreibung des weiblichen Vogels. Et-
was größer als eine Lerche, Flügel ziemlich
kurz. Der Schnabel ist etwa so lang als der
Kopf, gerade, sädelförmig zugespitzt, kegel-
förmig, weit höher als breit, zusammenge-
drückt, die Tomien, besonders am Unterkiefer,
eingezogen; Firste abgerundet, sehr sanft con-
cav; Nasenloch länglich, hoch am Schnabel,
die Nasenfedern treten bis dahin vor; Unter-
kiefer an der Wurzel breiter als der obere;
Kinnwinkel kurz, nicht ein Drittheil der Schna-
bellänge, mäßig abgerundet, kurz und dicht
befiedert, die Federn zum Theil mit schwarzen
Borsten endigend; einige kurze Borsten zwis-
chen den Federn des Zügels; Flügel ziemlich
abgerundet, sie reichen etwa bis zu einem
Drittheile des Schwanzes, die dritte und vierte

Feder sind die längsten; Schwanz mälsig lang, abgerundet und etwas abgestuft, die äußerste Feder um fünf und drei Viertheil Linien kürzer als die mittleren; Beine mälsig hoch, Fersentrücken mit fünf bis sechs Tafeln bedeckt; zwei äußerste Vorderzehen an der Wurzel stark vereint.

Färbung: Iris graubraun; Schnabel schwarz; Beine röthlich-graubraun; alle oberen Theile des Vogels sind schwärzlich-olivengrün, die Federn an Kopf, Hals und Rücken beinahe schwarz, aber mit dunkel olivengrünen Rändern, alles sehr dunkel, und die Ränder nur kaum bemerkbar; Flügel und Schwanz dunkel schwarzbraun, mit sehr feinen, schwachen, olivengrünen Rändchen; Kinn, Kehle, Unterhals, Mitte der Brust und des Bauches schmutzig olivengrün, an den Seiten dieser Theile schwärzlich-olivengrün überlaufen, weil hier die dunkel grauen Federwurzeln durchblicken; Steißfedern schwärzlich-grau, mit olivengrünen Rändern.

Ausmessung: Länge 7" — Breite 10" 6"
— L. d. Schnabels 8½" — Br. d. Schn. 2½"
— Höhe d. Schn. 2½" — L. d. Flügels 3"
3½" — L. d. Schwanzes 2" 10" — Höhe d. Ferse 10½" — ~~die ist von Federn enthalten~~

$8\frac{1}{2}'''$ — L. d. Mittelzehe $7\frac{1}{2}'''$ — L. d. äusseren Z. $4\frac{1}{2}'''$ — L. d. inneren Z. $5\frac{1}{2}'''$ — L. d. Hinterzehe $3\frac{1}{2}'''$ — L. d. Mittelnagels $3'''$ — L. d. äusseren N. $2\frac{2}{3}'''$ — L. d. Hinternagels $4'''$. —

Der männliche Vogel ist mir nicht zu Gesicht gekommen.

Von dieser Art der Trupiale traf ich einst an der Ostküste von Brasilien, in der Gegend von *Coral de Batuba*, bei der *Lagoa Feia*, zwischen den 22sten und 23sten Grad südlicher Breite eine große Menge in einem Rohrsumpfe an, wo sie einen bedeutenden Lärm verursachten. Meine Jäger schossen ein Paar dieser Vögel, wovon ich den einen beschrieben habe.

Unbestimmte Arten des Genus *Icterus*.

In der Nähe der Hauptstadt *Bahia* lebt eine Art der Trupiale, welche man in dieser Gegend *Cupido* nennt. Ich habe diesen Vogel zufällig in der kurzen Zeit meines Aufenthaltes daselbst nicht erhalten, kann ihn daher nicht genau beschreiben. Er ist schwarz, das Männchen soll die Brust gefärbt haben, wie

den Tucan, oder noch röthlicher. Ich sah diese Vögel auf der Insel *Taparica* in Menge fliegen; sie lebten in der Nähe der Wohnungen, und selbst in dem Städtchen in Flügen, und stellen besonders den Orangen, Mango's und andern Früchten nach. Ihre Lockstimme ist kurz und laut, dabei haben sie eine Art kurzen Gesang.

Gen. 46. *Cassicus*, Vieill.

Die Cassicken sind schöne, lebhaftere und bewegliche Vögel, welche in ihrem Lebensart viel Aehnlichkeit mit den Trupialen zeigen, aber nicht, wie der grössere Theil der letzteren, in Triften und offenen Gegenden, sondern in den Wäldern, und immer auf Bäumen leben. Sie nähern sich den menschlichen Wohnungen und Pflanzungen in der Zeit des Reifens der Früchte ohne Scheu, und thun diesen vielen Abbruch, weshalb man sie jagt. Sie haben ein schön buntes Gefieder, der Körper ist meist schwarz, braun oder olivengrün, aber immer von Abzeichen lebhafter, glänzender Farben gehoben. Die von mir in Brasilien beobachteten Arten haben sämmtlich eine schön

blaue Iris, wie auch *Sonnini* bemerkt. Ihre Stimme ist abwechselnd und hat zuweilen einige flötende Töne, sie ahmen andere Vögel nach. Ihre Nahrung besteht in Insecten und Früchten. Sie leben meist gesellschaftlich, hängen ihr beutelförmiges Nest an schlanken Zweigen, gern in der Nähe des Wassers auf, und gewöhnlich beobachtet man eine Menge dieser Nester an ein und demselben Baume. Sie erziehen zwei Junge. *Azara* hat sehr richtig die Hauptzüge des *Genus Cassicus* zusammengefaßt, ich verweise deshalb auf jenes Werk. Er bemerkt sehr richtig, daß die Cassicken den Uebergang von den Trupialen zu den Krähen machen.

1. *C. cristatus*, Licht.

Der schwarzgehäubte Cassicke mit gelbem Schwanze, oder der Schapú.

C. Körper bräunlich-schwarz; Unterrücken und Steiß dunkel rothbraun; zwei mittlere Schwansfedern schwarz, die übrigen gelb; ein kleiner Federbusch am Hinterkopfe.

Oriolus cristatus, Linn., Gmel., Lath.

Le Cassique huppé de Cayenne, Buff. Sonn. Vol. 9. pag. 206.

Buff. pl. enl. No. 344.

Coccyz ornatus, Daud. II. pag. 326.

L'Yapou proprement dit, Azara Voy. Vol. III. p. 160.

Meine Reise nach Bras. B. II. p. 341.

Japú im östlichen Brasilien.

Jakersiun-gipakiu botocudisch.

Beschreibung des männlichen Vogels: Ein großer, starker, schöner Vogel. Schnabel mit seinem Stirnblatte beinahe noch einmal so lang als der Kopf, knöchern, kegelförmig zugespitzt, beide Kiefer etwa gleich lang, von der Mitte an ein wenig zusammengedrückt, Firste abgerundet, an ihrer Wurzel ausgebreitet, abgeflacht, in einer Fläche mit dem Scheitel, in die Stirnfedern mit einer ebenen, rund abgesetzten Platte hineintretend, welche im Leben etwas runzlich, nachher glatt ist; Tomien nur sehr wenig eingezogen; Nasenloch frei, eine Linie hoch über dem Kieferrande, elliptisch, an der Seite des Oberkiefers, die Federn treten bis zu demselben vor; Unterkiefer an der Wurzel so hoch als der obere, aber breiter, da, wo die Federn beginnen, befindet sich ein perpendiculär laufender Absatz, welcher die Gränze des Unterschnabels ist; Kinnwinkel mehr als ein Dritttheil der Unterkieferlänge, ziemlich zugespitzt, an der Spitzenhälfte nur sparsam besiedert, die Federn enden zum Theil in kurze schwarze Borsten; Bartborsten am Zügel feh-

len; Augenlid nackt, am Rande mit kleinen Wimperfederchen besetzt; Zunge hornartig, mit scharfem Rande, gegen die getheilte Spitze hin gefranst; auf der Mitte des Scheitels und am Hinterkopfe stehen sehr schmale, zugespitzte, beinahe linienförmige, über anderthalb Zoll lange Federn zerstreut, welche in der Ruhe über den Hinterkopf hinab hängen, und im Affecte zu einer sehr lockeren, kleinen Haube aufgerichtet werden können; Flügel stark und ziemlich lang, sie erreichen beinahe die Mitte des Schwanzes, die dritte und vierte Schwungfeder sind die längsten; Schwanz stark, aus zwölf ziemlich schmalen, an der Spitze ein wenig zugespitzten, abgestuften Federn zusammengesetzt, deren äußerste etwa einen Zoll und acht Linien kürzer ist, als die mittleren; Beine ziemlich kurz, stark, krähenartig; Ferse mit fünf bis sechs glatten Tafeln auf ihrem Rücken, ihre Sohle scharf zusammengedrückt, gestiefelt; Zehenrücken rauh getäfelt; äußere Vorderzehe an der Wurzel ein wenig vereint, Hinterzehe stark; Nägel krähenartig.

Färbung: Iris sehr schön dunkel himmelblau; oder ultramarinblau *); Schnabel blafs

*) Azara nennt sie unbegreiflicher Weise grün, aber Sonnini stimmt mit mir überein.

weisslich-grüngelb; Beine bräunlich-schwarz; ganzes Gefieder bräunlich-schwarz; mit grünlichem Metallschimmer nach dem Lichte; Unterrücken, Aftargegend, Steiss, untere und obere Schwanzdeckfedern dunkel rothbraun; zwei mittlere Schwanzfedern bräunlich-schwarz, alle übrigen schön rein gummiguttgelb; die langen Scapularfedern sind oft braun gerandet und gemischt, wahrscheinlich bei jüngeren Vögeln.

Autmessung: Länge 15" 6" — Breite 28" 4" — L. d. Schnabels 2" 2½" — Br. d. Schn. 5½" — Höhe d. Schn. 7¼" — L. d. Flügels 7" 8" — L. d. Schwanzes 6" 9" — Höhe d. Fesse 1" 9" — sie ist von Federn entblöst auf 1¼ 1½" — L. d. Mittelzehe 1" 1¼" — L. d. äusseren Z. 9½" — L. d. inneren Z. 9½" — L. d. Hinterzehe 8½" — L. d. Mittelnagels 5½" — L. d. äusseren N. 5" — L. d. Hinternagels 7½".

Varietät: Am Unterhals, den Seiten der Brust, auf den Scapular- und grossen Flügeldeckfedern, auch am Bauche stehen einzelne, zerstreute, gelbe Federn, übrigens alles wie gewöhnlich.

Weibchen: Weit kleiner und weniger dunkel gefärbt als das Männchen, daher vielleicht der Glaube, es existirten zwei verschiedene Ba-

gen unter diesen Vögeln, den unter andern *Picil-*
lot ausspricht; alle dunkeln Theile des Weib-
chens fallen mehr in's Braune; Bauch und Rück-
ken stark röthlich-braun überlaufen, der Steiß
mehr hellrothbraun, die mittleren Schwanzfe-
dern weniger schwarz, die gelben nicht so
lebhaft, und oft verloschen fein graubräunlich
punctirt.

Ausmessung: Länge 18" 7^{'''} — Breite 16"
6¹/₂^{'''} — L. d. Schnabels 1" 8¹/₂^{'''} — Höhe d.
Ferse 1" 5^{'''} — L. d. Mittelzehe 11¹/₂^{'''} — L.
d. Hinternagels 6¹/₂^{'''}.

Dieser interessante Vogel ist längst be-
kannt, doch hat erst *Azara* seine Lebensart
recht genau geschildert, ich will alles bisher
über diese Species Gesagte vorerst nicht be-
rücksichtigen, sondern nur meine eigenen Be-
merkungen mittheilen. Der *Japú* (zu Deutsch
etwa Schapú, das J wie im Französischen auszu-
sprechen) und nicht *Yapú*, wie *Buffon* schreibt,
ist ein großer schöner Vogel, der nur die Wäl-
der bewohnt und in deren Nähe den Pflanzun-
gen und menschlichen Wohnungen sich nähert.
In den vom Walde entfernten, bewohnten Ge-
genden sieht man ihn nicht, dagegen aber
meistens, sobald man große Waldungen er-
reicht, alsdann ist er zahlreich, besucht die

Pflanzungen nach ihren Fruchtbäumen, und scheut den Menschen wenig. Er ist über den größten Theil von Südamerika verbreitet, indem er in *Guiana*, Brasilien und *Paraguay* gefunden wird. Nach *Azara* ist er jedoch dort nicht häufig, und geht nicht über den 26sten Grad hinab. In Brasilien ist er in manchen Gegenden seltener als die nachfolgende Art, in anderen viel häufiger. Dort lebt er etwa wie unser Häher (*Corvus glandarius*) gesellschaftlich, ist lebhaft, stets in Bewegung, immer lockend und Stimmen von sich gehend, fliegt von einem Fruchtbäume auf den anderen, hängt sich mit seinen starken Klauen an die Zweige, ergreift zuweilen eine Frucht und fliegt damit ab, um sie anderwärts zu verzehren. In den Mägen dieser Vögel fand ich Ueberreste von Insecten und Beeren, den Orangen, Bananen, Mammonen u. s. w. stellen sie angemein nach, und es versammeln sich ihrer zur Zeit der Reife dieser Früchte eine große Menge, auch schießt man sie alsdann in Menge und ist ihr Fleisch, da sie leicht zu erlegen sind, theilhaftig. Diese Vögel sind höchst gesellschaftlich und nisten auch auf diese Art. Man findet sie zur Brütezeit in Menge, oft dreißig und vierzig und mehrere Paare auf einem kleinen Raume

vereint, und ihre merkwürdigen Nistplätze hängen alsdann beinahe an allen Zweigen eines oder mehrerer hoher, ausgebreiteter Urwaldbäume. Ich fand einst in einem romantischen, dunkel schattigen, von allen Seiten von Waldbergen geschützten Seitenthale, unweit *Pilha Velha do Espírito Santo*, eine höchst zahlreiche, interessante Colonie dieser Vögel, und ähnliche an mehreren Orten. Die Vögel beleben (daselbst dargestellt) die interessante Waldscene, daß man seine Aufmerksamkeit nicht genug auf einen Punkt heften konnte, und ihr ganzes Brutgeschäft war hier auf die interessanteste, leichteste Art zu beobachten. Der ganze Wald hallte von ihrer, in dieser Zeit besonders belebten Stimme wieder. Gewöhnlich hört man von ihnen einen kurzen, ruckartigen, etwas krächzenden Lockton, dem der nachfolgenden Art ähnlich, dann aber lassen sie abwechselnde Töne hören, einen lauten sonderbaren Kehlpfiff, der gleichsam flötend und nicht unangenehm klingt, doch gibt der Vogel oft nur ein Paar solche Pfiffe, zuweilen aber diesen Ton in der Ausdehnung einer halben Octave und mehr; andere verschiedenartige Töne mit dem obigen vereint, bringen oft ein nicht unangenehmes, sonderbares Concert her-

ver, da man eine Menge dieser Vögel täglich
 könn. Der *Jupit* befestiget sein merkwürdiges Nest
 zuweilen auf sehr hohen, zuweilen auf mäßig
 hohen Bäumen. Es ist beutelförmig, fünf bis
 sechs Zoll weit, schmal, lang, unten abgerun-
 det, oft drei bis vier Fuß lang), oben auf
 einem ziemlich schlanken, etwa fingerdicken
 Zweige fest geschlungen und stark befestiget,
 wo sich auch eine längliche ganzlich unbe-
 schützte Oeffnung zum Eingange befindet. Die
 Gestalt und die biegsame, dem lockeren Filze
 ähnliche Masse dieses Nestes, giebt dasselbe
 vollkommen der Gewalt des Windes preis, des-
 sen Spiel, selbst bei einer leisen Luftbewegung,
 es ist. Der Vogel fliehet und flüzt dieses Beu-
 telnest auf die künstlichste Art aus *Tillandsia*
 und *Gravatha* Fäden so fest ineinander, daß
 man es nur mit Mühe zerreißen kann. Unten
 im Grunde dieses tiefen Beutels findet man
 zur Unterlage der jungen Vögel Moos, dörres
 Laub und Bast, worauf ich ein oder zwei Eier
 fand. Sie sind von länglicher Gestalt, da-
 rauf
 nach ihm *Vireo*, giebt diesem Neste nur
 eine Länge von 36 Zoll, welches unrichtig ist, er hat
 nur wenige solcher Nester zu beobachten Gelegenheit ge-
 habt.

weißlichem Grunde, blaß violett-röthlich verwaschen marmorirt, und haben einzelne irreguläre dunkel schwarzviolette Striche und Puncte. Gewöhnlich fand ich nur ein Junges in diesen Nestern, doch muß man die Anzahl eigentlich auf zwei annehmen; unrichtig würde es aber seyn, wenn man dieselbe mit *Azara* auf drei festsetzen wollte. Die jungen Vögel haben eine laute, rauhe Stimme, und gleichen schon im ersten Gefieder den alten, da die gelben Schwanzfedern sogleich hervorkommen. Oft findet man ein Nest an das andere angebaut, d. h. das eine theilt sich etwa in seiner Mitte, und hat einen beutelförmigen Seitenauswuchs, der ebenfalls eine Wohnung ist. Auf einem Baume zeigen sich dreißig, vierzig und mehrere Nester, besonders gern scheint sie der Vogel an dünnen, trockenen Zweigen zu befestigen. Im Monat November fand ich Nester, welche noch leer waren, in anderen Eier und junge Vögel. Ein solcher mit Nestern beladener Baum, auf welchem diese großen schönen Vögel sich geschäftig ab und zu bewegen, bietet dem Ornithologen und Jäger ein höchst interessantes Schauspiel dar. Das weit größere, schönere Männchen breitet seinen prächtigen Schwanz aus, bläht, wie der Schwan, seine Flügel auf, bringt

den Kopf unterwärts, wobei es den Kopf aufbläst, und läßt alsdann seinen sonderbaren flötenartigen Kehllaut hören. Fliegt der Vogel mit seinem leichten schnellen Fluge ab, so verursacht er mit seinen Flügeln ein Geräusch. Man kann, ohne diese Thiere zu verschrecken, stundenlang der Unterhaltung genießen. Wenn die Brütezeit verstrichen ist, ziehen sie gesellschaftlich nach den Fruchtbäumen umher, und wir haben ihrer dann viele auf den Genipabäumen (*Genipa americana*) und anderen erlegt. Dieses habe ich besonders häufig an den Flüssen *Belmonte* und *Ilhéos* gesehen, wo sie äußerst zahlreich und gemein sind. Ihr Fleisch ist ziemlich essbar, obwohl grob und oft hart, wir haben an demselben nie einen besonderen Geruch wahrgenommen, wie einige Schriftsteller sagen. Die Botocuden, welche den *Japú* — *Jakereiun* nennen, schiessen ihn mit Pfeilen, theils um ihn zu essen, theils wegen seiner gelben Federn. Sie lieben dieselben ganz vorzüglich, bilden mit Wachs einen Fächer aus ihnen, und befestigen ihn vor der Stirn, welches besonders ehemals unter ihnen Gebrauch war, und sie nannten einen solchen Federfächer — *Japú-Schwanz* (*Jakereiun-Jokä*). *Buffon*, so wie *Sonnini*, schreiben, wie ich weiter oben schon

anmerkte, die brasilianischen Namen *Japú* und *Japut* richtig mit einander, denn man sagt nicht *Yapú*, sondern *Japú*, wie im Französischen ausgesprochen. Buffon's Abbildung (pl. enl. No. 344) ist ziemlich gut.

2. *C. haemorrhous*, Licht.

Der Cassike mit rothem Unterrücken, Guasch.
C. Körper schwarz, mit schön blauem Stahlglanze;
Unterrücken und obere Schwanzdeckfedern prächtig scharlachroth; Schnabel bläß gelb; Iris ultramarinblau.

- Méacgrave* pag. 199.
Oriolus haemorrhous, Linn., Gmel., Lath.
Variété de l'Yapou, Buff., Sonn. Vol. 9. pag. 199.
Buff. pl. enl. No. 482.
Cacicus haemorrhous, Daudt. II. pag. 328.
Meine Reise nach Bras. Bd. II. pag. 150. 878. Bd. II. 119. 341.
Guache (Guasch), *Japira* oder *Joneongo* im östlichen Brasilien.
Tiack-wick-mung botocudisch.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt der vorhergehenden Art, nur weit kleiner und schlanker. Schnabel gebildet wie an No. 1., nur die Stirnplatte desselben etwas weniger abgesetzt, und die Tomlenränder stärker eingezogen; Federn des Kopfs sämmtlich glatt, es ist

also keine Haube vorhanden; Flügel stark, lang und zugespitzt, sie erreichen die Mitte des Schwanzes, ihre dritte Schwungfeder ist die längste, die vierte etwa eben so lang; Schwanz nur sehr unmerklich abgerundet, die äußerste Feder um zwei Linien kürzer als die mittleren; Beine ziemlich kurz, gebildet wie an No. 1.; Ferse mit vier bis fünf Tafeln belegt; ihre Sohle gestieft und zusammengedrückt; zwei äußerste Vorderzehen an der Wurzel ein wenig vereint.

Färbung: Schnäbel sehr blass grünlich-gelb; Iris lebhaft ultramarinblau; Beine bräunlich-schwarz; ganzes Gefieder schwarz, mit schönem dunkelblauem Glanze des polirten Stahles; der Rücken von seiner Mitte bis zum Schwanz ist prächtig glänzend feurig zinnoberröth; ganzer innerer Flügel schwarz.

Ausmessung: Länge *) zwischen 10 und 11" — L. d. Schnabels 1" 5''' — Höhe d. Schn. 5''' — Br. d. Schn. 4½''' — L. d. Flügels 6" 5''' — L. d. Schwanzes etwa 4" — Höhe d. Ferse 1" — sie ist von Federn entblößt auf 9''' — L. d. Mittelzehe 8½''' — L. d. äußeren Z. 7½''' — L.

*) Durch Zufall bin ich verhindert worden, die Länge und Breite dieses Vogels nach dem Leben zu messen.

d. inneren Z. 5''' — L. d. Hinterzehe 6 $\frac{1}{2}$ ''' —
L. d. Mittelnagels 3 $\frac{7}{8}$ ''' — L. d. äußeren N. 2 $\frac{1}{2}$ '''
— L. d. Hinternagels 4'''.

Weibchen: Bedeutend kleiner als der männliche Vogel, mit bräunlich-schwarzem Gefieder, überhaupt weniger lebhaften Farben.

Junge Vögel: sind schwärzlich-braun, ihr Roth ist verloschen und gelblich gemischt, alle Farben matt.

Der Guasch oder die *Japira* ist einer der gemeinsten brasilianischen Waldvögel, den man in allen von mir bereisten Gegenden findet, der mir aber dennoch in den südlichen Gegenden der Ostküste weit häufiger vorgekommen ist, als mehr nördlich. Schon am Flusse *Belmonte*, zwischen dem 15ten und 16ten Grade südlicher Breite, fand ich den Guasch seltner, er wurde von nun an durch den *Japú* ersetzt, fand sich aber abwechselnd, oder mit letzterem vereint hier und dort wieder. Südlich kennt man ihn unter der Benennung Guasch, mehr nördlich am *Belmonte* heißt er *Japira*, und im Sertong der Provinz *Bahia* trägt er den Namen *Joncongô*. Er lebt stets in Gesellschaften, welche lärmend mit ihrem kurzen, rauhen Locktone: Guasch! Guasch! umherstreichen, die Früchte aufsuchen, und auch gesellschaftlich

nisten. Sie sind lebhafte, unruhige, keugelige Vögel, welche die Raubvögel, und besonders die Eulen, unter mancherlei Stimmen necken, den Ruf anderer Vögel nachahmen, und selbst, wie unsere Nulshäher (*Corvus glandarius*), den Jäger im Walde durch ihren vereinten Lärm verrathen. In der Hauptsache haben sie Lebensart und Nahrung mit Noth gemein, doch ist der *Japú* in einem noch höheren Grade gesellschaftlich. Den Guach, nistet gesellschaftlich, oft ist ein großer Baum mit solchen Nestern bedeckt, gewöhnlich an einem Flußufer im Walde, eine *Mimosa*, *Jugá*, *Bignonia*, *Cecropia* oder anderer Baum, öfters auch nisten sie im inneren Walde vom Wasser entfernt. Die Nester hängen meist an den Enden der Zweige, sind gestaltet wie die des *Japú*, schneal, anderthalb bis zwei und einen halben Fuß lang, aus Fäden von *Titlandia*, *Gravatha* und Haaren zusammengefügt, daher grau und schwärzlich von Farbe, und haben an ihrem oberen Theile den Eingang. *Sonnini* sagt, dieser Eingang sey geschützt, allein ich habe ihn immer gänzlich frei gefunden, er ist nur eine längliche Spalte; da aber der Vogel sehr tief unten sitzt, so ist er dennoch vollkommen vor dem Wetter geschützt. Männchen und Weibchen bauen

gemeinschaftlich, oft benutzen sie auch ein altes Nest. Im November und December fand ich Eier. Sie sind länglich; hell bläulich von Farbe und mit violetten Pünctchen besprenkt, öfters fanden wir alsdann auch zwei Junge. In dieser Zeit sind diese Vögel sehr geschäftig und erheben heftigen Lärm, sobald man sich ihrem Baume nähert. Nach der Brütezeit fliegen sie stark nach den Fruchtbäumen, wo man ihnen vieles schielst, die ein ziemlich gutes Essen geben.

Buffon giebt (No. 482) eine sehr schlechte, plumpe, unrichtig gestellte und illuminirte Abbildung unseres Vogels. Er hielt ihn für eine Varietät seines Yapou, ein Irrthum, welchen schon Sonnini berichtigt, der indessen diesem Vogel einen übeln Geruch beilegt, den wir in Brasilien nicht bemerkt haben. Marcgrave erwähnt des Guasch nur beiläufig.

3. *C. persicus*, Licht.

Der schwarz und gelbe Cassicke, Schapu.

C. Schwarz, mittlere Flügeldeckfedern, Unterrücken und Wurzelhälfte des Schwanzes, so wie der Steiß gelb; Schnabel blafs grünlich-gelb; Iris blau.

Jupuiuba seu Japú; Maregr. pag. 193.

Le Cacique jaune du Brésil ou l'Yagou, Buff. Sonn.
Vol. 9. pag. 188 u. ferner.

Büff. pl. enl. No. 184.

Oriolus (peiriscus) Linnaeus [Gmel], *Lath.* 10: 511.

Meine Reise nach Bras. B. I, p. 340. B. II, 104-341.
Japuy im östlichen Brasilien.

Jakereiun botobardisch.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt und Größe der vorhergehenden Art. Körper etwas mehr gedrungen. Schnabel auf der Firste zuweilen etwas mehr gewölbt, zuweilen gänzlich geradlinig, die Stimplatte ein wenig breiter als an No. 2; Tomien des Unterkiefers ein wenig eingezogen; Nasenloch beinahe ritzenförmig, in einer kurzen Rinne, die Federn treten bis zu demselben vor; Zunge an der Spitze gespalten, gefranst; Augenlid etwas nackt, am Rande bewimpert; Flügel stark, lang und zugespitzt, erreichen zwei Dritttheile des Schwanzes, die vierte Schwungfeder ist die längste, die dritte nur kaum merklich kürzer; Schwanz stark, abgerundet, die Federn schmal und ein wenig zugespitzt, die äußerste fünf und eine halbe Linie kürzer als die mittleren; Deckfedern des Schwanzes bis beinahe gegen die Mitte desselben vortretend; Beine mälsig hoch, Schenkel stark, Ferse mit sechs Tafeln belegt, ihre Sohle gestieft, kantig zusammen-

gedrückt; zwei äußere Vorderzehen nur wenig vereint,

Färbung: Iris im Auge schön hell ultramarinblau; Schnabel bläulich weißlich - grüngelb; Beine schwärzlich; der Körper dunkelschwarz, zuweilen mit etwas bouteillengrünem Glanze; mittlere große Flügeldeckfedern prächtig feurig gummiguttgelb, hierdurch entsteht ein starker Fleck auf dem Flügel, der ganze innere Flügel schwarz; Unterrücken, Steiß, obere und untere Schwanzdeckfedern und die Wurzel aller Schwanzfedern prächtig feurig gummiguttgelb, Spitzen der Schwanzfedern schwarz; die Zeichnung des Schwanzes ist folgende: an den beiden mittleren Federn ist mehr als die Spitzenhälfte schwarz, an den beiden nachfolgenden Federn jeder Seite nimmt das Gelbe zu und die schwarze Spitze ab, an der zweiten Feder von außen ist so viel Gelb als an der dritten, an der äußersten ist wieder mehr von der schwarzen Farbe als an der zweiten.

Ausmessung: Länge 10" 9 $\frac{1}{2}$ " — Breite 17" 6" — L. d. Schnabels 1" 4" — Br. d. Schn. 4" — Höhe d. Schn. 4 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Flügels 5" 10" — L. d. Schwanzes 4" — Höhe d. Ferse 1" $\frac{1}{2}$ " — sie ist von Federn entblößt auf 10" — L. d. Mittelhöhe 9 $\frac{1}{4}$ " — L. d. äu.

Äußeren Z. $6\frac{1}{2}'''$ — L. d. inneren Z. $6\frac{1}{2}'''$ — L. d. Hinterzehe $5\frac{1}{2}'''$ — L. d. Mittelnagels $4'''$ — L. d. Äußeren N. $8\frac{1}{2}'''$ — L. d. Hinternagels $4\frac{1}{2}'''$.

Weibchen: Kleiner als das Männchen, seine Farben etwas mehr matt, übrigens kein Unterschied; die Untertheile sind bräunlich-schwarz, am After einige weißse Federn. Nach *Sonnini* soll das Weibchen dicker seyn als das Männchen, allein ich habe dieses umgekehrt gefunden, indem es bedeutend kleiner ist.

Ausmessung: Länge $9'' 1'''$ — Breite $13'' 10'''$ — L. d. Schnabels $1'' 1\frac{1}{2}'''$ — L. d. Flügels $4'' 6\frac{1}{2}'''$ — Höhe d. Ferse $11'''$ — L. d. Mittelzehe $7\frac{1}{2}'''$. —

Junger Vogel: Mehr unansehnlich gefärbt, das Schwarze mehr bräunlich, das Gelbe blässer,

Der *Japuz* ist ein schöner Vogel, der mit seinem prächtig gelb und schwarzen Gefieder den Wald, wo er sein munteres Leben verbringt, im höchsten Grade ziert. Ich traf ihn nicht eher, bis ich an der Ostküste zum *Belmonte* gelangte, und dort den Fluß aufwärts in die großen Wälder reis'te. Am *Ilhéos* ist er häufig, dort sah ich den *haemorrhous* selten, diesen fand ich indessen an der *Cachoeira* im Sertong wieder, ein Beweis, daß diese Vö-

gel stellenweise und nicht überall gleichartig verbreitet sind. Am *Belmonte* war der *Japu* sehr gemein, seine Gesellschaften flogen von einem Ufer zu dem anderen über den Fluß hinüber, belebten die hohen Waldbäume, und überall hörte man ihre Stimme, so wie die der *Araras*, der Papagayen, der *Surukús* und anderer Vögel, besonders in der Kühle des Morgens, oder wenn die Abendsonne die mit großen schönen Blumen bedeckten Kronen der hohen Urwaldstämme, besonders der Bignonien, des *Urucu* (*Cucullaria excelsa*) u. s. w. zum letztenmal mit ihrem Feuerglänze erleuchtete. Die Lebensart und Manieren dieses Vogels in jenen erhabenen Waldungen sind die der vorhergehenden Arten, selbst in der Lockstimme ist sehr viel Aehnlichkeit, doch hat der *Japu* auch sehr viele von der Stimme des Quasch abweichende Töne. Er ahmt alle in der Nähe wohnende Vögel nach, den Bentavi, den *Pega*, die *Anacan* (*Psittacus severus*) und viele kleine Arten. *Sonnini* will die Worte *y-a-pu* oder *y-a-cú* in der Stimme unseres Vogels erkennen, welches ich jedoch nicht bestätigen kann. Im Monat August fand ich den *Japu* in Gesellschaften oder Banden vereint, welche oft einen großen Baum bedeckten. Hier war alsdann

mannichfaltiges Leben verbreitet, alles in Bewegung, und ihre Stimmen wurden vielfältig gehört. Sie sind lärmend, vielstimmig, gesellschaftlich, in steter Bewegung, und fliegen von einem Baume zu dem anderen ab und zu. Raubvögel kommen nicht ungeneckt bei ihnen vorüber. Sie ziehen außer der Paarzeit gesellschaftlich nach den Baumfrüchten umher, nähren sich aber ebenfalls von Insecten. In der Zeit der Reife der Orangen, Bananen, Mamonen u. s. w. kommen sie den Wohnungen sehr nahe und sind schädlich. Wo sie nisten, da sieht man gewöhnlich an den meisten Zweigen ein solches Nest, meist an den Flüssen über dem Wasser, z. B. auf kleinen Felseninseln im Flusse *Belmonte*, welche mit Bäumen bewachsen sind, doch öfters auch vom Wasser mehr entfernt, aber meistens hängt das Nest an der äußersten Spitze des Aestchens. Sie scheinen vorzüglich gern an trockene Bäume zu bauen. Dieses Nest ist ein kleinerer Beutel als der der vorhergehenden Arten, kaum einen Fuß lang, mehr kurz und breit, unten abgerundet, der Eingang oben an der Seite in dem dünnen Halse des Nestes nahe unter dem Zweige, welcher es trägt. Es ist aus Fäden von *Tillandsia*, *Gravatha* und dergleichen Fasern ineinander

gefilzt, und hat daher eine schwärzlich-graue Farbe. Am Ende December's fand ich in allen diesen Nestern zwei Junge, bekam daher die Eier nicht zu sehen. Die Fischer nehmen die jungen Vögel aus und beködern damit ihre Angeln. In dieser Zeit waren die Vögel sehr belebt, das weit größere und schönere Männchen breitete seine Flügel und den prächtig gelben Schwanz fächerförmig aus, stieg und kletterte an den hängenden Nestern, oder flog von Zweig zu Zweig, indem es seine Stimme hören lies. So wie der Tag erschien, erblickte man diese Vögel auf den hohen Zweigen, wie sie sich putzten und in den ersten Strahlen der Sonne vom nächtlichen Thau trockneten. Im Anfange September's fand ich sie noch nicht bei ihren Nestern, sie nisten in der heißen Jahreszeit.

Buffon irrt, wenn er glaubt, der *Japui* zeige Varietäten in seiner Species, unter einer großen Anzahl dieser Vögel ist mir nie die geringste Abweichung des Gefieders vorgekommen. *Sonnini* redet von einem unangenehmen Geruche seines Fleisches, wovon wir indessen nichts bemerkten, obgleich wir oft genöthigt waren, diese Vögel zu essen. Was ich weiter oben für die Aussprache des Wortes *Japui* ge-

sagt habe, gilt auch hier für den *Japuï*. — *Sonnini* tadelt *Marcgrave*, daß er in der Masse des *Japuï*-Nestes Haare gefunden haben wolle, allein dieses ist leicht zu erklären; denn wo der Vogel in der Nähe der Menschen wohnt, findet man allerdings Haare in sein Nest verwebt, übrigens kann sich *Marcgrave* auch leicht getäuscht haben, da manche schwarze Pflanzenfäden auf den ersten Anblick nicht von Pferdehaaren zu unterscheiden sind.

Buffon's Abbildung ist schlecht, obgleich sie in der Hauptsache wohl die Gestalt und Vertheilung der Farben dieses Vogels zeigt. Die Iris ist unrichtig colorirt, so wie die Beine und die Zunge.

4. *C. niger*, Licht.

Der schwarze Cassicke.

C. Körper schwarz, nach dem Lichte mit bläulichem, violettem und grünlichem Metallglanz; Männchen mit langen dichten Halsfedern.

Oriolus niger, Linn., Gmel., Lath.

Troupiale noir, Buff. Sonn. Vol. 9. pag. 149.

Pl. enl. No. 534.

Cacicus niger, Daud.

Grand Troupiale, d'Atara Vol. III. pag. 167.

Beschreibung des männlichen Vogels: Ein großer schöner Vogel, Gestalt mehr krähenar-

tig als bei den vorhergehenden Arten, Körper stark, Kopf ziemlich klein, Schwanz und Flügel stark. Schnabel mälsig lang, oben sanft gewölbt, das Stirnblatt weniger abgesetzt, als an den vorhergehenden Arten; Nasenloch in dem zugespitzten Nasenwinkel, die Federn treten sammtartig bis dahin vor; Dille vor dem Kinnwinkel abgeflächt, ziemlich stark bis zur Spitze des Unterkiefers aufsteigend; Unterkiefers an der Wurzel höher als der obere, sein Tomienrand etwas eingezogen; Nasen-, Zügel- und Seitenfedern der Stirn dicht, kurz und sammtartig; Federn des Halses äufserst dicht und lang, sie werden bei dem männlichen Vogel im Affecte aufgebläht; an Unterhals und Brust bildet die Lage der Federn eine Längsfurche oder Rinne; Flügel lang und stark, dabei sehr zugespitzt, sie reichen über die Mitte des Schwanzes hinaus, die zweite Schwungfeder ist die längste; Schwanz stark, abgerundet, die äufserste Feder sieben Linien kürzer als die mittleren; Beine stark, mälsig hoch, krähenartig; Ferse mit sieben Tafeln belegt, an der Sohle und Seite des Laufs bemerkt man zwei lange Tafeln; äufsere Zehen an der Wurzel ein wenig vereint; der Hinternagel gröfser und dicker als der mittlere Vordernagel.

Färbung: Iris im Auge gräulich-weiß, bei dem recht alten Vogel angenehm rosenroth; Schnabel und Beine schwarz; ganzes Gefieder schwarz, an den Flügeln mit bouteillengrünem, übrigens mit leichtem bläulichem, zuweilen auch violettem Metallschiller, der zuweilen auch in's Kupfergrüne abändert.

Ausmessung: Länge $12'' 9\frac{1}{2}'''$ — L. d. Schnabels $1'' 2\frac{1}{2}'''$ — Br. d. Schn. $4'''$ — Höhe d. Schn. $4\frac{1}{4}'''$ — L. d. Flügels $6'' 10'''$ — L. d. Schwanzes $5''$ — Höhe d. Ferse $1'' 5'''$ — L. d. Mittelzehe $1'' \frac{1}{3}'''$ — L. d. äußeren Z. $8\frac{1}{2}'''$ — L. d. inneren Z. $7\frac{1}{4}'''$ — L. d. Hinterzehe $7'''$ — L. d. Mittelnagels $4'''$ — L. d. äußeren N. $8\frac{1}{4}'''$ — L. d. Hinternagels $5'''$ —

Weibchen: Weit kleiner als das Männchen, die Halsfedern sind bei weitem nicht so dick und lang, Gefieder schwarz mit etwas bläulichem Schiller.

Ausmessung: Länge $11'' 1'''$ — L. d. Schnabels $1'' 1\frac{1}{2}'''$ — Höhe d. Ferse $1'' 2\frac{1}{3}'''$.

Dieser starke, schöne Vogel lebt überall mehr einzeln paarweise, als die vorhergehenden Arten. Am *Belmonte* und in anderen Urwäldern habe ich indessen kleine Flüge von ihnen der Nahrung nachgehen gesehen, sie saßen sehr häufig auf den Felsen am Ufer, und

flogen auf den benachbarten Bäumen ab und zu. Die Triften in der Nähe der großen Waldungen werden von ihnen besucht. Ihre Manieren gleichen schon sehr denen der Krähen (*Corvus*), sie schreiten gerne auf dem Boden umher, wie diese, und wenn wir auf den einsamen Inseln der Flüsse, oder am Rande der Wälder bivouakirten, so kamen diese großen, angenehmen Vögel nahe um uns her, und suchten die Reste unserer Mahlzeiten auf. Sie scheinen auch in dieser Hinsicht, wie unsere Krähen, Omnivoren zu seyn, Fleisch und Körner waren ihnen gleich willkommen. Sie gingen aufrecht mit stolzen Schritten, das Männchen bläht alsdann im Affecte seine dichten langen Halsfedern auf und breitet den Schwanz aus. Ihr Flug ist leicht und schnell. Das Nest dieses Vogels haben wir nicht gefunden, er soll aber häufig Besitz von anderen Nestern nehmen. Aufgezogen wird unser Vogel sehr zahm und ein angenehmes Hausthier. Seine Stimme soll nicht unangenehm seyn, ich habe aber bloß einen Lockton von ihm gehört. *Buffon* giebt ihn zu klein an, wahrscheinlich redet er von einem weiblichen Vogel. Er sagt, daß diesem der Metallglanz abgehe, allein alte weibliche Vögel haben ihn auch, obgleich in

geringerem Grade als die Männchen. *Buffon's* Abbildung ist schlecht; denn weder Bildung des Körpers und Schnabels, noch die Färbung sind richtig angegeben.

Unbestimmte Arten dieses Geschlechts.

2. *Cassicus leucurus*.

Der weifschwänzige Gassicke.

Wird *Joncongo* genannt. Er lebt, nach Aussage der *Camacan*-Indianer, häufig an den Ufern des *Rio Pardo* im Sertong. Der Vogel ist schwarz mit weißem Schwanze. Sein Nest hängt er gesellschaftlich, wie der *Japú*, *Guasch* und *Japú*, an den Bäumen über dem Wasser auf. Es hat die Gestalt wie bei obigen Arten. Ich habe diesen Vogel durch Zufall nicht zu sehen bekommen.

Die wahren Krähenarten oder Raben schei-
nen Südamerika abzugehen, dagegen finden sich
dieselbst Heherarten, mit abgestuftem Schwanz
und kürzerem, mehr geradem Schnabel, wel-
che, wie diese Vögel bei uns, in Wäldern und
Gebüsch leben.

Fam. XVIII. *Corvidae*, Leach.

Krähenartige Vögel.

Die wahren Krähenarten oder Raben schei-
nen Südamerika abzugehen, dagegen finden sich
dieselbst Heherarten, mit abgestuftem Schwanz
und kürzerem, mehr geradem Schnabel, wel-
che, wie diese Vögel bei uns, in Wäldern und
Gebüsch leben.

Gen. 47. *Corvus*, Linn.

K r ä h e.

Ich habe für dieses Geschlecht nur zwei
Arten zu beschreiben, obgleich Brasilien deren
noch mehrere zählt. Sie haben etwa einerlei
Gestalt und Lebensart mit unseren Hehern (*Cor-
vus glandarius*). Ihre Zunge ist hornigt und
vorn gespalten, ihr Schwanz mehr oder weni-
ger abgestuft. In ihren Mägen fand ich Insec-

ten, ob sie gleich wahrscheinlich auch Früchte verzehren. Ueber ihren Nestbau kann ich nichts beibringen.

A. Heher mit kurzen Flügeln und stark abgestuftem Schwanze.

1. *C. cyanopogon.*

Der graubraune Heher mit blauem Barte, Gang-Geng.

K. Federbusch, Gesicht, Unterhals und Oberbrust schwarz, Rücken graubraun, Schwanz schwarz mit weissen Federspitzen, Flügel schwärzbraun, Untertheile weiss, Wurzel des Unterkiefers und ein Fleck über und unter dem Auge ultramarinblau.

Meine Reise nach Bras. Bd. II. p. 137. 243. 345.

Pie-Geng, Temm. pl. col. 169.

Geng-Geng oder Piem-Piem im Sertong der Provinz Bahia.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt schlank und angenehm, Grösse unseres Hebers, Flügel kurz, Schwanz stark abgestuft, Fersen hoch. Schnabel etwa so lang als der Kopf, stark, gerade, an der Vorderhälfte mälsig zusammengedrückt, Tomien eingezogen, Oberkiefer länger als der untere, seine Firste etwas kantig, sanft gewölbt, mit kleinem Ausschnitte

hinter der ein wenig herabtretenden Kuppe; Dille vor dem Kinnwinkel ein wenig heraustretend, ziemlich stark gewölbt aufsteigend, an der Wurzel abgeflächt, vor der Spitze abgerundet; Nasenloch in einer starken Vertiefung an der Spitze der übergespannten Nasenhaut, rundlich, aber von den Nasenborsten beinahe gänzlich bedeckt; Kinnwinkel beinahe halb Schnabellänge, locker befiedert, die Federn in schwarze Borsten endigend; über dem Mundwinkel am Zügel stehen schwache, schwarze Bartborsten; Zunge vorn mit getheilter Hornspitze; von der Mitte des Scheitels beginnt ein Büsch von etwa einen Zoll langen Federn, welche frei über den Hinterkopf hinaustreten und im Affecte aufgerichtet werden; Federn des Vorderkopfs kurz und fest, die des Unterkiefers und der Umgebung des Auges kurz und wie geschoren; Flügel kurz und etwas abgerundet, sie erreichen nicht das erste Drittheil des Schwanzes, die fünfte und sechste Feder sind die längsten; Schwanz ziemlich lang und stark abgestuft, daher stark abgerundet, die äußerste der zwölf Federn über einen Zoll kürzer als die mittleren; Beine stark und hoch, wie an den Hehern, Ferse mit sieben beinahe verwachsenen und kaum zu unterscheidenden Tafeln

auf ihrem Rücken, ihre Sohle glatt gestieft und scharf zusammengedrückt; Zehen frei, auf ihrem Rücken getäfelt, die mittlere viel länger als die Nebenzehen; Hinter- und Mittelnagel groß.

Färbung: Iris lebhaft citrongelb; Schnabel schwarz; Beine schwärzlich-grau; an der Zehensohle etwas gelblich; Stirn und Federbusch, ganzes Gesicht, Seiten des Kopfs, Ohrgegend, Vorder- und Seitenhals, so wie die Oberbrust mit einem dunkel schwarzen Kragen bedeckt; Unterkieferwurzel, ein Fleck über und einer unter dem Auge schön glänzend ultramarinblau, eben so sind die Wimpern des Augnides; schließt man das untere, so ist dieses graubraun und nackt, die blauen Wimperfedern sind dadurch von den übrigen blauen Bartfedern getrennt; Nacken und Hinterhals bläulich-weiß, oder wasserbläulich; Brust, Bauch und Untertheile bis zum Schwanze rein weiß; der ganze Rücken bis zum Schwanze kaffeebraun, am Oberrücken heller, nach unten immer dunkler werdend; Unterrücken etwas grau gemischt, dadurch die grauen Wurzeln der langen, lockeren Federn durchblicken; Flügel schwarzbraun; Schwanz schwarz, alle Federn mit einer einen oder anderthalb Zoll

langen weissen Spitze; innere Flügeldeckfedern weils, am Flügelrande schwarz gefleckt, zuweilen stehen hier weilsliche, verloschen himmelblau gefleckte Federn.

Ausmessung: Länge 12" 9''' — Breite 16" 1''' — L. d. Schnabels 1" — Br. d. Schn. 4½''' — Höhe d. Schn. 4½''' — L. d. Flügels 5" 1½''' — L. d. Schwanzes 5" 8''' — Höhe d. Ferss 1" 6½''' — sie ist von Federn frei auf 1" 4''' — L. d. Mittelzehe 10''' — L. d. äusseren Z. 6½''' — L. d. inneren Z. 6½''' — L. d. Hinterzehe 6½''' — L. d. Mittelnagels 4''' — L. d. äusseren N. 3½''' — L. d. Hinternagels 5½'''.

Weibchen: Alle Theile gefärbt wie an dem männlichen Vogel, aber blässer, Hinterkopf und Oberhals beinahe weils, am Unterkiefer weniger blau, die schwarzen Federn mehr bräunlich. —

Junger Vogel: Iris graubraun, am Kopfe noch beinahe nichts Blaues, nur an der unteren Schnabelwurzel; die blauen Federn über dem Auge sind weils, nur ein wenig blau gemischt; der Federbusch ist klein, an Unterhals und Oberbrust sind zum Theil noch einige weisse Federsäume; Hinterkopf, Nacken und Oberhals rein weils, und ohne Beimischung von hellem Blau,

Der eben beschriebene Vogel ist mir in den grossen Urwäldern vorgekommen, welche die offenen Viehtriften des Sertong der Provinz *Bahia* von der Seeküste trennen. Hier fand ich ihn in dichten Gebüsch und belaubten Bäumen in kleinen Gesellschaften von vier bis sechs Stück, wo er seine aus ein Paar Tönen zusammengesetzte Stimme hören liess. Es scheint, dass er etwa die Lebensart unseres Hehers (*Corvus glandarius*) hat. In seinem Magen fand ich Ueberreste von Insecten. Er liebt die Maiskörner, soll aber dennoch den Pflanzungen keinen Schaden zufügen. Die Brasilianer in der Nähe des *Rio Pardo* und *Ilhéos* nennen ihn nach seiner Stimme — *Geng-Geng*, oder auch *Piom-Piom*.

Herr *Temminck*, dem ich diese Species mittheilte, hat sie auf seiner 69sten Tafel sehr treu abbilden lassen.

B. Heher mit mässig langen Flügeln, und nur wenig abgestuftem Schwanze.

2. *C. cristatellus*, Temm.

Der blau und weisse gehäubte Heher.

K. Ein rückwärts gekrümmter Federbusch auf der

Nase; Kopf, Hals und Oberbrust bräunlich-schwarz; Rücken, Flügel und Wurzelhälfte des Schwanzes indigoblau; Untertheile und Spitzenhälfte des letzteren rein weiß.

Corvus cyanoleucus, s. meine Reise nach Brasilien Bd. II. p. 190.

Pis. Houppas zu *Piom*, Temm. pl. col. 199.

Corvus tricolor, Natter. Mikan delect. faun. et flor. bras.

Meine Reise nach Bras. Bd. II. pag. 190.

Piom, *Piant* im Sertong von Bahia.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt unseres Hähners, aber dicker und kürzer; Schnabel etwas kürzer als der Kopf, dick, stark, die Firste etwa so viel hinabgewölbt, als die Dille aufsteigt; Oberkieferkuppe ein wenig überragend, mit höchst kleinem Ausschnitte; Tomien nur höchst wenig eingezogen; Firste abgerundet; Dille ründlich kantig; Nasenloch etwas eingesenkt, eiförmig, von den borstigen Nasenfedern bedeckt; Kinnwinkel ein wenig abgerundet und befiedert; am Zügel über dem Mundwinkel ziemlich kurze schwarze Bartborsten, die längsten vier Linien lang; Zunge halb so lang als der Schnabel, breit, hornartig, vorn gespalten; die vordersten Nasenfedern an jeder Seite des Schnabels sind in einen originellen rückwärts gekrümmten Busch verlängert, sie halten ausgestreckt dreizehn und eine halbe

Linie in der Länge, die übrigen Federn des Kopfs kurz, ganzes Gefieder zart und weich; Flügel stark, länger als an No. 1., sie erreichen beinahe die Mitte des Schwanzes, die vierte Feder ist die längste; Schwanz ziemlich stark, abgerundet und nur wenig abgestuft, die äußerste Feder etwa um acht Linien kürzer als die mittleren; Beine mälsig hoch, Fersenrücken mit acht glatten Tafeln belegt, ihre Sohle glatt gestieft und scharf zusammengedrückt; Zehen frei, ihr Rücken getäfelt; Hinternagel groß und gekrümmt.

Färbung: Iris graubraun; innerer und äußerer Schnabel schwarz; Beine glänzend schwarz; Federbusch, Kopf, Hals und Oberbrust schwarz, öfters bräunlich-schwarz, je älter der Vogel, desto schwärzer; Rücken, Flügel und Wurzelhälfte des Schwanzes schön lebhaft indigoblau; die hinteren Schwungfedern gänzlich blau, die übrigen blau an ihrer Vorderfahne, und schwarzbraun an der inneren Fahne; Brust, Bauch und alle Untertheile bis zum Schwanze, so wie die grössere Spitzenhälfte des letzteren sehr nett rein weiß; mittlere Schwanzfedern an ihren beiden Bahnen der Wurzelhälfte blau, die übrigen nur an der äusseren; die blauen Federn der Obertheile sind

an der Wurzel grau; innere Flügeldeckfedern weiß, bloß am Flügelrande indigoblau; die schwarze Farbe der Oberbrust setzt sich gegen die weiße der Untertheile nett bogenförmig ab.

Ausmessung: Länge 13" 5'" — L. des Schnabels, so weit er zwischen dem Federbusche auf der Firste entblößt ist, 1" $\frac{3}{4}$ " — Br. d. Schn. $5\frac{1}{2}$ " — Höhe d. Schn. $6\frac{1}{2}$ " — L. d. Flügels 7" 1'" — L. d. Schwanzes 5" — Höhe d. Ferse 1" 6'" — sie ist von Federn frei auf 1" $1\frac{1}{3}$ " — L. d. Mittelzehe $11\frac{1}{5}$ " — L. d. äußeren Z. $8\frac{1}{2}$ " — L. d. inneren Z. $6\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinterzehe 8" — L. d. Mittelnagels $4\frac{4}{5}$ " — L. d. äußeren N. $3\frac{4}{5}$ " — L. d. Hinternagels 6".

Weibchen: Federn des Stirnbusches nur neun Linien lang, alle Theile wie am Männchen, allein der schwarze Hals ist mehr bräunlich, besonders an der Oberseite; die weißen Untertheile in den Weichen und am Bauche etwas gelblich überlaufen.

Ausmessung: Länge 13" 4'" — Breite 22" 3'" — L. d. Schn. 1" — L. d. Flügels 6" 11'" — Höhe d. Ferse 1" 6'."

Junger Vogel: Der Kopf und Hals sind bräunlich; oft bräunlich gefleckt, Temminck scheint einen solchen Vogel abgebildet zu haben.

Diesen schönen Vogel erlegten meine Jäger in den mit Wald angefüllten Thälern des *Campo Geral*, oder der offenen inneren Gegenden an den Gränzen der Provinzen *Minas Geraes* und *Bahia*, wo er wie unser Heher lebte. Herr Professor *Mikan* sagt uns, daß ihn *Natterer* bei *Ypanema*, am *Rio Verde*, *Curitiba* und in anderen Gegenden der *Capitania* von *St. Paulo* fand, wo man ihn *Gralha branca* nennt. Da wir nur wenige Exemplare dieser schönen Species erhielten, so kann ich über ihre Lebensart nichts weiter hinzufügen. Die Brasilianer in der von mir bereis'ten Gegend nennen unseren Vogel *Piom-Piom*, wahrscheinlich nach seiner Stimme.

Außer der *Temminckischen* Abbildung, deren Schnabel und Iris unrichtig gefärbt sind, besitzt man eine andere in *Mikan's Delectus faunae et floriae brasiliensis*, hier ist ein älterer Vogel abgebildet, als bei *Temminck*, allein die Iris ist auch hier unrichtig angegeben.

Sect. 8. S e r r a t i

S ä g e s c h n ä b l e r.

Fam. XIX. M o m o t i d a e.

Momotartige Vögel.

Diese Familie habe ich von den übrigen Sitzfüßern getrennt, da sie ein sonderbares Gemische von Characteren zeigt. In der Gestalt haben diese Vögel Aehnlichkeit mit den Elstern (*Corvus Pica*), in ihrer Lebensart mehr mit *Bucco* oder *Capito*, *Vieill.*, besonders mit dem gewöhnlich unter der Benennung des *Cuculus tenebrosus* bekannten Vogel. Man hat sie zu den Tucanen gesetzt, allein sie haben keine Kletterfüße, und auch eine sehr verschiedene Lebensart.

Geh. 48: Prionites, Illig.

Taquara.

In der Gestalt haben diese Vögel Aehnlichkeit mit unseren Elstern (*Corvus Pica, Linn.*), in Lebensart und Manieren aber mehr mit *Bucco* und *Capito, Vieill.*, besonders mit dem kleinen, unter der Benennung des *Cuculus tenebrosus* bekannten Vogel. Sie sind einsam, still, leben von Insecten in den großen Waldungen und sollen ihr Nest in ein Erdloch bauen. Ich habe hier nur eine Species zu beschreiben, welche wir durch *Azara* schon kannten.

1. *P. ruficapillus, Illig.*

Die rostköpfige Taquara.

T. Scheitel und Oberhauch rothbraun; ein breites Feld durch das Auge, und ein Paar Fleckchen über der Brust schwarz; Körper grün; vordere Schwung- und Schwanzspitzen himmelblau; Schwanz lang.

Tutu, Azara Voy. Vol. III. pag. 145.

Taquara im östlichen Brasilien, oder

Bejafor do Sertão.

Beschreibung des männlichen Vogels: Gestalt schlank, Kopf dick, Schwanz lang und abgestuft, Beine kurz und schwach. Der Schna-

bel ist so lang als der Kopf, stark, krähenartig, rundlich gewölbt, beide Kiefer sanft gekrümmt, der obere etwas länger, Firste stark abgerundet, die Tomienränder beider Kiefer sägeförmig gezähnt, man zählt an jedem Kiefer etwa zehn Zähne, und bemerkt an der inneren Seite der Kiefer zuweilen gegen die Spitze hin viele erhöhte Queerlinien, die aber öfters gänzlich fehlen; Nasenloch hoch gestellt, schief eiförmig, am hinteren und oberen Rande von der Nasenhaut gebildet, die Federn treten bis dahin vor; Kinnwinkel etwa ein Dritttheil der Schnabellänge, befiedert, die Federn in lange aufgerichtete, schwarze Bartborsten endigend *); am Zügel ziemlich kurze schwarze Bartborsten, am Unterkiefer stehen längere, welche abwärts streben, und wovon die längsten sechs Linien in der Länge halten; unteres Augenlid nackt, am Rande mit Wimperfedern besetzt; ganzes Gefieder zart, weich und glatt; Flügel mälsig abgerundet und kurz, sie erreichen nicht völlig das erste Dritttheil des Schwanzes, die vierte Schwungfeder ist die längste; Schwanz länger als der Rumpf, die zehn Federn sehr stark ab-

*) Die Beschreibung der Zunge fehlt zufällig in meinen Notizen, allein *Azara* beschreibt sie.

gestuft, und an der Spitze immer abgenutzt, die äußerste um vier und einen halben Zoll kürzer als die mittleren; Beine ziemlich kurz und schwach, Ferse auf ihrem Rücken mit neun bis zehn Schildtafeln, ihre Sohle mit kleinen Schildschuppen bedeckt; Zehenrücken schildschuppig; zwei äußerste Vorderzehen über ihre halbe Länge hinaus mit einander verwachsen, beinahe gleich lang, die innere Zehe kurz, die hinterste die kürzeste; mittlerer Vordernagel der größte von allen, er hat an seiner inneren Seite eine Ausbreitung seines Randes, die an den übrigen Nägeln ebenfalls vorkommt, nur in geringerem Grade.

Färbung: Iris dunkel rothbraun; Schnabel schwarz; Beine blaß graulich-braun; obere Nasenfedern und der Scheitel bis über den Nacken hinab sind rothbraun; untere Nasenfedern, Einfassung des Auges, Zügel, Einfassung des Mundwinkels und ein breites Feld bis auf das Ohr hinab sind kohlschwarz; alle oberen Theile des Vogels, mit Flügeln und Schwanz; Unterbrust, Schenkeln und Steiß sind schön grün, die beiden letzteren himmelblau überlaufen; Rücken olivenbräunlich überlaufen; vordere große Flügeldeck- und Schwungfedern mit himmelblauer Vorderfahne; Schwanzfedern mit himmelblauer

Spitze, ihre ganze Unterfläche bräunlich aschgrau; Kehle und Kinn sehr gelbbraunlich; Unterhals olivengrün, bräunlich überlaufen, und mit einigen schwarzen, öfters himmelblau gerandeten isolirten Flecken; Unterbrust und Oberbauch rothbraun.

Ausmessung: Länge 16 $\frac{1}{2}$ " — Breite 18" 11 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Schnabels 1 $\frac{1}{2}$ " 5 $\frac{1}{2}$ " — Br. d. Schn. 5 $\frac{1}{2}$ " — Höhe d. Schn. 5 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Flügels 5 $\frac{1}{2}$ " 5 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Schwanzes 8" — Höhe d. Ferse 11 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Mittelzehe 8 $\frac{1}{2}$ " — L. d. äußeren Z. 7 $\frac{1}{2}$ " — sie sind vereint auf 8 $\frac{1}{2}$ " — L. d. inneren Z. 4 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinterzehe 4 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Mittelnagels 4 $\frac{1}{2}$ " — L. d. äußeren N. 3 $\frac{1}{2}$ " — L. d. inneren N. 2 $\frac{1}{2}$ " — L. d. Hinternagels 3 $\frac{1}{2}$ ".

Weibchen: Das Männchen hat oft einige blaue Federn neben dem schwarzen Backenstreifen, welche hier fehlen, auch ist der Backenstreifen kleiner und schmaler; Kehle und Unterhals sind hier weit mehr rostroth gefärbt, Hals und Oberrücken stärker mit Rostfarbe überlaufen, übrigens dem Männchen ganz ähnlich, nur ein wenig kleiner.

Dieser einsame stille Vogel ist mir in allen großen Urwäldern, von den menschlichen Wohnungen entfernt, einzeln oder paarweise vorgekommen. *Azara* beschreibt ihn für *Paraguay*,

und erwähnte zuerst dieser Species, welche also über einen großen Theil von Südamerica ausgebreitet ist. Seine Nachrichten sind mit den meinigen zu vereinigen. Gewöhnlich sahen wir die Taquara unbeweglich auf einem Aste sitzen, wie einen ächten *Capito*, *Viell.*, oder *Bucco*, und er ließ ohne Scheu den Jäger herankommen, um ihn zu erlegen. Besonders des Morgens und Abends läßt er seinen geradehin ausgehaltenen, sanften, flötenartigen Ruf hören, der dem unseres europäischen Wiedehopfs (*Upupa*) gleicht. Seine Nahrung besteht in Insecten. Im gezähmten Zustande frisst er, nach Azara, Früchte, Fleisch und dergleichen, hat also mit den Krähen und Tucanen viel Verwandtschaft. — Er sucht seine Nahrung meist auf der Erde, wovon auch seine Schwanzfedern an der Spitze gewöhnlich abgenutzt erscheinen, und man sieht ihn meistens auf der niederen Region der Zweige *).

Die Botocuden haben mir versichert, daß

*) Waterton bestätigt auch für Guiana von dem dortigen Houtou (*Prionites*) das von der Lebensart dieser Vögel Gesagte. Er soll, nach diesem Reisenden, Insecten und Bienen fressen, und seine Jungen ohne Nest in einem Erdloche in der Seite eines Hügels erziehen. Ich fand in den Mägen dieser Vögel bloß Insecten.

er meistens in ein Erdloch niste. Sie nennen ihn *Bururuk*, die Portugiesen hingegen *Taquara* oder *Bajafior* (Colibri) *do Sertão*. Sein Fleisch ist gut zu essen.

Dr. v. Spix (T. I. pag. 64) bildet auf seiner 60sten Tafel seinen *Prionites Martii* ab, der mit der hier beschriebenen Species so viel Aehnlichkeit hat, daß ich ihn für einen jungen Vogel derselben halte.

Nachträge und Berichtigungen

zu den

vorhergehenden Bänden dieses Werkes.

B a n d I.

Seite 69. zu „*Crocadilus sclerops*, Schn.“ *Spix Jacaretinga punctulatus* (*Spix lacert.* Tab. II. p. 2) scheint identisch mit dem von mir beschriebenen *Jacaré*.

Seite 104. zu „*Gekko armatus*.“ Hierhin gehört wahrscheinlich *Spix's Gekko aculeatus* (Tab. XVIII. Fig. 3. p. 16). Diese Figur ist unrichtig illuminirt.

Seite 120. zu „*Polychrus marmoratus*, Merr.“ *Spix* Tab. XIV. p. 14. Die Figur ist schlecht colorirt.

Seite 131. zu „*Agata catenata*.“ Obgleich ich in dem 2ten Bande meiner Beiträge (S. 606) zweifelte, ob *Spix's Lophyrus rhombifer* meine *Agama catenata* sey, so bin ich doch jetzt ziemlich davon überzeugt. *Spix's* Abbildung dieser Species (Tab. XI. p. 9) ist, so wie die aller seiner Reptilien, nach in Weingeist verblühten Exemplaren gemacht, hat deshalb in ihrer Färbung keine Aehnlichkeit mit der Natur, *Spix's Lophyrus albomaxillaris* (Tab. XIII. Fig. 2. p. 11) ist ohne Zweifel das von mir S. 134 des 1sten Theils meiner Beiträge beschriebene junge Thier.

Seite 139. zu „*Tropidurus torquatus*.“ *Agama hispida sive tuberculata*, *Spix*, Tab. XV. p. 12. — Die Figuren sind schlecht colorirt, die untere ist die bessere.

Seite 170. zu „*Feiis Ameiva*“, *Merr. Spix* Tab. XXIII. p. 21. Gute Abbildung, aber in den Farben nicht lebhaft genug.

Spix's Feiis lateristriga (Tab. XXIV. Fig. 1. p. 22) ist ein junges Thier derselben Species.

Seite 300. zu „*Coluber carinicaudus*.“ Hr. Prof. *Wagler* hat diese Species in seinem interessanten Wer-

ke „*Descriptiones et icones Amphibiorum*“ auf der 7ten Tafel unter der Benennung *Helicops carinicaudus* abgebildet.

Seite 305. zu „*Coluber Lichtensteinii*.“ *Wagler descript. et icones Amphib.* Tab. IV. Ist mir in der Natur in ihren Farben nie so dunkel vorgekommen.

Seite 428 und Band II. Seite 608. Auch der americanische Reisende *Say* hatte sich in den Daumen verwundet, das Gift einer getödteten Klapperschlange kam in die Wunde, und obgleich die Quantität höchst gering war, so verursachte sie dennoch viele Schmerzen und Taubheit. Siehe *Major Long's exped. to the sources of St. Peters River*, Vol. I. p. 270.

Seite 432. Das Bezaubern der Giftschlangen erklärt auch *Wilson* für Absurdität. *Amer. ornith.* Vol. II. p. 95.

Seite 433. zu „*Crotalus*.“ Mehrere neue Arten von Klapperschlangen beschreibt *Edw. James* in dem *Account of an exped. from Pittsburgh to the Rocky-Mount* 1819 und 1820.

Seite 446. zu „*Crot. horridus*, *Daud.*“ Auch die Indianer in Nordamerika schreiben der Klapperschlange Wirksamkeit in gewissen Krankheiten zu. *Major Long's exped. to the Rocky-Mount*. Vol. I. p. 215.

Seite 449. zu „*Lachesis rhombeata*.“ Im *Dictionnaire des sciences naturelles* (Vol. 49. p. 495) lies't man im Artikel *Sorrocucu* (der Name ist daselbst unrichtig geschrieben) Folgendes: „*Serpent du Brésil, non déterminé par les naturalistes, mais passant pour fort venimeux*.“ Dieser merkwürdige, erst vor Kurzem gedruckte, aber nicht in die gegenwärtige Zeit passende, Ausspruch ist bezeichnet mit: *H. C.*, und zeugt von der Unbekanntschaft des Verfassers mit der fremden Literatur, welche ganz unverzeihlich ist. Der Band des *Dictionnaire*, worin wir so vortrefflichen

Aufschluss über den *Curucucu* erhalten, erschien im Jahre 1827.

In Dr. v. *Martius* Reise nach Brasilien (Bd. II. S. 501) lies't man von einem nächtlichen Besuch des Surukuku, der die Feuerbrände auseinanderwarf und sich abentheuerlich gebehrdete. Mir ist nichts Aehnliches vorgekommen, doch war die Schlange wahrscheinlich zufällig in das Feuer gerathen.

Was Hr. *Moreau de Jonnés* von der gelben Vipser der westindischen Inseln sagt: „sie falle ungereizt an, und sey sehr schnell und gewandt,“ weicht gänzlich von allen über die Giftschlangen gemachten Erfahrungen ab, und hat das Gepräge der Aussage der Landesbewohner, welche den Fremden gern allerlei aufbürden. Diese Aussage ist im *Diction. des scienc. natur.* Vol. 55, p. 305 wiederholt.

B a n d II.

Seite 33. zu „*Ateles hypoxanthus*.“ Der Affe, welchen die Herrn *Quoy* und *Gaimard* (Zool. p. 21) *Ateles arachnoides* nennen, ist mein *hypoxanthus*. Von einem schwarzen *Ateles* im Orgelgebirge habe ich nie reden gehört, ich vermuthe daher, daß diese schwarze Species in ein anderes *Genus* gehört.

Im *Dict. des scienc. natur.* (Vol. 49. p. 274 und 280) lies't man im Artikel *Singe*, von den Atelen und Aluaten, allein bei dieser Abhandlung, welche *Desm.* (*Desmarest*) unterzeichnet ist, sind alle neueren Nachrichten über diese brasilianischen Thiere nicht benutzt, der Aufsatz ist daher unvollständig und hat manche Unrichtigkeiten. — *Ateles hypoxanthus* ist hier dargestellt, als sey er von *Kuhl* und *Desmarest* beschrieben, da doch die einzige zuverlässige Quelle über diese Species bisher im 2ten Bande meiner Beiträge gesucht werden muß, auch *Kuhl* ausdrücklich sagt, von wem

er die vorläufige Notiz dieser Species, so wie mehrerer anderen Arten erhalten habe.

Freireifs hat eine höchst sonderbare Idee (siehe dessen Beiträge zu der näheren Kenntniss des Kaiserthums Brasilien, S. 55 und 56) von einer allgemein angeborenen Trägheit der belebten brasilianischen Schöpfung, welche völlig ungegründet ist. Sind denn die dortigen Affen, Rehe, Schweine, Fledermäuse, Nager u. s. w. weniger lebhaft und beweglich, als die unseren? Auch die wilde Schweinsjagd in Europa giebt nur selten mehr Gefahr, als die in Brasilien, und die geringere Gefahr bei der letzteren liegt bloß in der verschiedenartigen Bildung der Zähne bei *Dicotyles*.

Seite 66. zu „*Mycetes niger*, Kuhl.“ Auch nach Dr. Rengger (Naturg. der Säugethiere von Paraguay, S. 21) brüllen die *Carayas* nur am Tage, überhaupt stimmen dessen Beobachtungen über diesen Gegenstand ganz mit den meinigen überein. Daß diese Affen nicht schwimmen, behauptet Rengger (S. 22).

Seite 73. zu „*Genus Cebus*.“ Es ist gewiß, daß einige Arten dieses Geschlechts schwer zu unterscheiden sind, jedoch bei eigener Beobachtung im Vaterlande lernt man sie gewiß unterscheiden. Die in meinen Beiträgen beschriebenen Arten sind gewiß verschieden. *Spix's* Affen sind größtentheils nicht neu, er hat eine traurige Confusion verursacht. *Cebus flavus* ist gewiß Species und nicht Varietät, hierüber siehe Rengger S. 36.

Seite 84. zu „*Cebus robustus*.“ Ueber den Fortsatz unter der Zunge siehe Dr. Rengger's Naturgesch. von Paraguay, S. 36. Nach ihm soll er beinahe bei allen Affen vorkommen, welches doch vielleicht zu viel gesagt ist. Ich habe diesen Zug nicht bei allen mir vorgekommenen Affen untersucht, oder die Notizen verloren.

Seite 107. zu „*Callithrix personatus*.“ Desmarest sagt im *Diction. des scienc. naturel.* (Vol. 47. p. 12): „Humboldt habe den *Callithrix personatus* am Itapapwana, Itapemirim, Espirito Santo, Rio Doce bis zum Flusse St. Matthaeus angetroffen.“ — Ich kann dergleichen Stellen nicht begreifen, da Hr. Desmarest doch wohl mit dem Gange der Humboldtischen Reise bekannt seyn, und wissen sollte, daß die genannte Gegend die von mir besuchte ist.

Seite 114. zu „*Callithrix melanochir*.“ Neueré Französische Zoologen (*Diction. d. sc. natur.* Vol. 47. p. 44) haben diese Affenart zu den Saki's (*Pithecia*) versetzt. Wenn sich in dem Gebisse kaum bemerkbare Abweichungen von dem Sauassu (*Callithrix personatus*) zeigen sollten, welche ich indessen an meinen Schädeln dieser beiden Thiere durchaus nicht bemerken kann; so sind diese beiden Affen einander doch übrigens so vollkommen ähnlich, sowohl in äußerer und innerer Bildung, als in ihrer Lebensart, daß es gewiß ein Fehlgriff seyn würde, wenn man sie in verschiedene Geschlechter vertheilen wollte. Ich rede hier bloß von den beiden genannten Affenarten, da ich die übrigen weniger kenne. Die Französischen Zoologen haben ja ihrem Geschlechte *Pithecia* einen langbehaarten Schwanz zugeschrieben, welchen auch alle ächte Saki's wirklich haben, und dieser geht dem Gilo (*Callithrix melanochir*) gänzlich ab. Dieser letztere Affe gleicht in jeder Hinsicht dem Sauassu (*Callithrix personatus*, Geoffr.), selbst in der Bildung der Luftröhre, ich finde daher, daß man ihn von dem letztern unmöglich trennen dürfe.

Seite 148. zu „*Hapale Rosalia*.“ Desmarest sagt im *Diction. d. sc. natur.* (p. 22): „une variété de la Guiane a le pelage etc.“ und „l'espèce s'étend entre la Guiane et le Brésil.“ Es ist jetzt bekannt, daß

diese Thierart nur im südlichen Brasilien, und nicht in *Guiana* lebt.

Seite 153. zu „*Hapale chrysomelas*.“ An der so eben angezogenen Stelle des *Dict. d. sc. natur.*, nennt Hr. *Desmarest* ferner den von dem Entdecker dieser Thierart gegebenen Namen gar nicht, sondern nur fremde Benennungen, die um nichts besser sind, versetzt auch, wie in seiner *Mammalogie*, das Vaterland des Thiers nach *Pard*, wo es nie gewesen ist. So unbekannt sind die Französischen Gelehrten zum Theil mit der fremden Literatur!

Seite 175. zu „*Genus Phyllostoma*.“ *Rengger* sagt (S. 67): die Blattnasen flögen des Abends am spätesten, allein diess ist nicht ohne Einschränkung; denn ich habe viele von ihnen beinahe noch am hellen Tage fliegen gesehen. Das Saugen dieser Thiere an Menschen ist Dr. *Rengger* ebenfalls nicht vorgekommen (S. 69).

Seite 179. zu „*Phyllostoma hastatum*.“ *Waterson* erzählt ein Beispiel (p. 176), wo ein Europäer von einem Vampyr in *Guiana* angegriffen wurde, mir ist dergleichen nie vorgekommen.

Seite 227. zu „*Dysopes perotis*.“ Hr. *Temminck* (*Monographies de Mammalogie*) hält diese Species für *Geoffroy's Molossus rufus*, ein Gegenstand, über welchen ich nicht entscheiden kann. *Temminck* scheint vollkommen richtig zu urtheilen, wenn er die *Nyctinomen* der alten Welt für völlig gleich gebildet mit *Dysopes* ansieht.

Seite 266. zu „*Vespertilio nigricans*.“ Nach *Rengger* gehört hierher als Synonym *Azara's Chauve-souris douzième*.

Seite 282. zu „*Nasua*.“ *Rengger* bestätigt die beiden von mir aufgestellten Cuatis (S. 98). Nach ihm soll das einsame Cuati nicht in der Farbe wechseln (S. 98).

Seite 310. zu „*Mustela barbara*.“ *Rengger* setzt die Hyrare in das Geschlecht *Gulo* (S. 119); allein hier kann sie nicht stehen, wenn das Gebiß abweicht.

Seite 320. zu „*Lutra brasiliensis Raii*.“ Dr. *Rengger's* Nachrichten zu Folge (S. 128), ist die Fischotter von *Paraguay* (*Lutra paranensis*, *Rengg.*) eine von der brasilianischen verschiedene Species, die aber auch den Character des an der Spitze abgeplatteten Schwanzes trägt.

Seite 332. Nach *Waterton* kommen in *Guiana* noch viele portugiesische Benennungen vor; obgleich die guianischen Völker dem Hunde zum Theil, wie in Brasilien, von ihnen selbst geschaffene Namen beilegen, so trägt er doch bei mehreren die portugiesische Benennung. Die Hundswuth soll zu *Pembina* am *Red-River* im nördlichen America nicht vorkommen (siehe *Keating's*, *Major Long's exped. to the sources of St. Peters-River*). Auch *Say* bestätigt, daß diese Krankheit bis jetzt wenigstens im inneren Nordamerica noch nicht vorkomme (siehe *Say, exped. of Major Long to the Rocky Mountains*, Vol. I. pag. 238).

Die Hunde der Indianer am *Mischigan* sollen sehr dem *Prairie-Wolf* gleichen (ibid. p. 150).

Seite 333. Nach Dr. *Rengger* giebt es in *Paraguay* wirklich wilde, d. h. verwilderte Hunde. Ich wage nicht zu entscheiden; allein in Brasilien giebt es deren gewiß nicht. Der Hund ist von den Europäern eingeführt, und war dort nirgends einheimisch. Ich kann mit Hrn. *Rengger* nicht übereinstimmen, wenn er glaubt, daß der kleine nackte Hund in Südamerica zu Hause sey (S. 152), in Brasilien sagt man von ihm, er stamme aus Asien. Das Wort *Yagua* scheint mir gar nichts zu beweisen.

Seite 338. Was Herr Dr. *Rengger* von diesem Fuchse sagt, kann man kurz geben, wenn man

sagt, er habe die Lebensart aller Füchse. Ich habe seinen Geruch durchaus nicht übler befunden, als bei *Vulpes*, mit dem er in der Lebensart die größte Aehnlichkeit hat.

Seite 334. zu „*Felis Onca*, Linn.“ Das, was Dr. Rengger (S. 160) von der Gröfse des Yaguar's sagt, stimmt nicht ganz mit *Azara's* und meinen Beobachtungen; denn ich habe weit gröfsere Felle gesehen. Fünf Fufs von der Nasenspitze bis zur Schwanzwurzel ist in Brasilien durchaus nicht selten bei diesen Thieren, es giebt aber weit gröfsere Individuen, und die von mir gemessenen Felle waren nicht ausgespannt, sondern frisch abgezogen. Dafs diese grossen Katzen in manchen Gegenden von Brasilien gewifs eben so häufig waren, als am *Parand*, *Paraguay* und *Uruguay*, kann man aus den Beschreibungen meiner (Bd. II. S. 238) und anderer Reisen ersehen. Rengger bestätigt, dafs der Yaguar den Neger oder Mulatten dem Weifsen vorziehe (S. 168); ich kann aber dessenungeachtet diese Sache nur als eine ungegründete Erzählung betrachten; denn wenn man der Aussage der Landesbewohner glauben will, so erhält man, wenigstens für Brasilien, eine artige Sammlung von Fabeln. In Brasilien, wo, wie es nach Hrn. Dr. Rengger scheint, die Yaguare gröfser werden, als in *Paraguay*, sind Fälle, wo sie Menschen angefallen, wohl zu selten, um dergleichen Sagen bestätigen zu können. Die Erzählung (S. 176), dafs man sich den Arm umwickle und den Yaguar mit dem Dolche erlege, ist, meiner Ansicht zu Folge, eine von den Indianern herrührende Erzählung und dem practischen Jäger jener Wälder schwer zu glauben.

Aeufserst komisch ist der Druckfehler oder Irrthum in einer Recension der Beschreibung meiner Reise nach Brasilien (*Allgem. Literatur-Zeitung*, Octbr. 1826. S. 305 und 313), dafs nämlich „die Neger die Schild-

kröte auf die Spitze stellen, und mit den Tatzen das Fleisch aus dem Panzer hervorziehen.“ — Hier ist nicht von den Negern, sondern von dem Yaguar die Rede, und wenn der Recensent fragt: „wer hat dieß wohl je gesehen?“ so muß ich antworten: „daß die Indianer die Thiere sehr oft im Walde beschleichen, und sie, wie unsere europäischen Jäger, ungesehen belauschen und beobachten; trafen doch meine Jäger am *Ilhéos* einen ruhenden Yaguar an, und schlichen sich zurück, ohne daß er sie im Geringsten gewahr wurde.“

Seite 358. zu „*Felis concolor*, Linn.“ Der Name *Felis concolor* ist nicht von *Fr. Cuvier*, sondern von *Linné* gegeben, eben so darf es nicht heißen „*Procyon cancrivorus*, *Géoffr.*“, sondern *Pr. cancrivorus*, *Illig.* —

Seite 361. zu „*Felis pardalis*, Linn.“ Herr Dr. *Rengger* hält *Felis mitis*, *Fr. Cuv.*, für identisch mit dem *Mbaracayd* (*Felis pardalis*), er hat vielleicht *Temminck's Monographies de Mammalogie* nicht benutzt, und ich verweise in dieser Hinsicht auf das von mir in den Nachträgen zum 2ten Bande meiner Beiträge (S. 613) Gesagte. *Felis tigrina*, Linn., gehört durchaus nicht zu *Felis pardalis*. Eine so große Abänderung in der Färbung der alten *Felis pardalis* ist mir in Brasilien nicht vorgekommen, als sie Herr *Rengger* vom *Chibi-guazu* angiebt.

Seite 406. zu „*Didelphis cinerea*.“ Im *Diction. des sc. natur.* Vol. 47. p. 394 ist die Benennung dieser Species als von *Temminck* gegeben aufgeführt, und alle in der *Temminck'schen* Beschreibung vorkommenden Unrichtigkeiten sind nachgeschrieben; hierüber siehe meine Beiträge Bd. II. S. 409.

Seite 454. zu „*Coelogenys fulvus*, *Fr. Cuv.*“ Dr. *Rengger* sagt (S. 251), die Haare des *Paca* seyen rauh anzufühlen, dieß kann man nicht wohl sagen. Sie

sind kurz und steif oder hart, liegen aber höchst glatt und glänzend auf. Er hat in *Paraguay* Farbenvarietäten des *Paca* gefunden, worauf, wie diess auch zu vermuthen war, die beiden Arten dieser Thiere sich gründen, welche Herr *Fr. Cuvier* annimmt. In Brasilien habe ich unter sehr vielen dieser Thiere, welche ich in Händen hatte, nie Abweichungen gefunden.

Seite 458. zu „*Dasyprocta Aguti*, *Illig.*“ Dr. *Rengger* giebt (S. 260) für seinen *Acuti* Farbenabweichungen und verschiedenes Winterkleid an, beides ist mir in Brasilien nicht vorgekommen. Von grossen Gesellschaften dieser Thiere ist mir in Brasilien ebenfalls nichts bekannt geworden.

Seite 462. zu „*Cavia Aperea*, *Linn.*“ Ueber den Aufenthalt des *Aperea* irrt Dr. *Rengger* (S. 276); denn ich habe dieses Thier am Flüschen *Catolé* im Inneren der grossen Waldungen häufig gefunden, es hält sich auch durchaus nicht bloß in den *Bromelien* auf. Den Schädel des *Preyd* hat Dr. *Rengger* mit dem des Meer-schweinchens (*Cavia Cobaya*, *Linn.*) verglichen und hält beide für verschiedene Species (S. 278).

Seite 466. zu „*Cavia rupestris*.“ Von diesem Thiere ist im *Diction. des sc. natur.* unter der Benennung *Kerodon Mokó*, eine sehr schlechte Abbildung gegeben, die in der Färbung gänzlich verfehlt ist.

Seite 475. zu „*Hydrochoerus Capibara*.“ In *v. Martius* und *Spix's* Reise nach Brasilien (Bd. II. pag. 449) wird der *Capibara* Sumpfschwein genannt, eine Benennung, die nicht auf diese Thierart paßt.

Seite 489. zu „*Bradypus torquatus*.“ *Waterton* hält das schwarznackige Faulthier fälschlich für das Männchen des dreizehigen, wie er sich ausdrückt (p. 166); man ersieht übrigens aus seiner Notiz, daß diese beiden Arten der Faulthiere in *Guiana* vorkommen.

Was *Waterton* a. a. O. vom gänzlichen Abfressen eines Baumes durch das Faulthier sagt, ist sehr ungegründet; denn dieses kann in jenen Wäldern nicht wohl vorkommen. Er erzählt (p. 168), daß er ein zweizehiges Faulthier auf dem Boden angetroffen, welches sich zur Gegenwehr auf den Rücken warf, eine Stellung, welche ich die brasilianischen Faulthiere nie annehmen gesehen habe. Sie blieben in einer solchen Lage immer ruhig sitzen. *Waterton* schildert ihre Geschwindigkeit im Klettern größer, als ich sie beobachtete.

Seite 520. zu „*Dasypus setosus*.“ Der Name *Dasypus sexcinctus*, Linn. (*Rengger*, S. 286) scheint mir auf mehrere Gürtelthierarten zu passen, deshalb wählte ich den Ausdruck *setosus*, welcher bei allen von mir in Brasilien beobachteten *Tatus* allein für diese Art charakteristisch ist. Ich begreife nicht, warum Hr. *Rengger* den Character der sechs Gürtel zur Benennung wählte, da er S. 288 selbst sagt, diese Species habe zuweilen sieben Gürtel.

Seite 531. zu „*Dasypus longicaudus*.“ Dr. *Rengger* wählt (S. 206) auch für diese Species den von der Zahl der Gürtel hergenommenen Namen, da doch, wie gesagt, diese Zahl nicht constant ist.

Seite 537. zu „*Myrmecophaga iubata*.“ *Waterton* irrt, wenn er (S. 171) von dem großen Ameisenbären sagt, er steige auf Bäume; denn diese Eigenschaft besitzen bloß die beiden anderen in *Guiana* vorkommenden Arten.

Seite 564. zu „*Dicotyles*.“ In mehreren naturhistorischen Werken werden die Eigenschaften der beiden brasilianischen Nabelschweine verwechselt; so sagt z. B. *Griffith* (Uebers. von *Cuvier*, *Règne Animal*, Vol. IX. p. 412): „die weißlippige Art fliehe bei dem ersten Angriffe und sey weniger kräftig und tapfer als

das andere,“ welches, wie schon *Azara* längst sehr richtig bemerkte, gerade umgekehrt ist; man hat aber eine ganz unrichtige Idee von allen diesen Thieren, wenn man glaubt, sie setzten sich gewöhnlich zur Wehr. Im *Diction. des sc. natur.* (Vol. 52. pag. 487) lies't man folgende Worte des Hrn. *Lesson*: „*Taytétú*, véritable nom brésilien, suivant le Pr. Maximilien de Neuwied, du Pécari à collier, *Dicotyles torquatus*, Fr. Cuvier, que les colons Portugais appellent porco à quechada branca. Le *Dicot. labiatus* est le *Caytetú* des Brésiliens.“

Man ersieht aus obigen Worten, daß das in der Beschreibung meiner Reise und in meinen Beiträgen Gesagte, gänzlich mißverstanden worden ist, und die Sache verhält sich wie folgt: *Dicotyles torquatus*, oder der *Taytétú* des *Azara* wird, in den von mir bereisten Gegenden von Brasilien, *Kaytetu* und nicht *Porco à quechada branca* (das à muls, als ein Druckfehler meiner Reisebeschreibung, in de verwandelt werden) genannt, sondern dieser letztere Name, *Porco de quechada branca*, kommt der andern Art, dem *Tagnicati* des *Azara* zu, oder dem *Dicotyles labiatus*, *Cuv.* —

Seite 580. zu „*Cervus paludosus*, *Desm.*“ Herr Dr. *Rengger* scheint (S. 348) das von mir Gesagte nicht verstanden zu haben; denn bloß den ausschließlichen Aufenthalt des *Guazupucu* in Sümpfen habe ich bezweifelt, nicht aber, daß er in gewissen Localitäten daselbst vorkomme. Wenn übrigens dieser Hirsch in hohen Gebirgsketten lebt, so kann er nicht ausschließlich den Sumpf bewohnen, deren es in den hohen brasilianischen Gebirgen wohl nicht viele geben dürfte. Herr Professor *Lichtenstein* hat uns nun eine Abbildung dieser Species geliefert.

Nachträge zum IIIten Bande dieser Beiträge.

Seite 190. zu „*Falco brasiliensis*, Linn.“ Dieser schöne Vogel lebt auch in *Mexico*; denn unter einer Sammlung dorthier gesandter Vögel fand ich ihn unter der Benennung des *Falco Cheriway*.

Zu Seite 438. *Genus Euphone*. Ueber die Abweichung des inneren Baues dieser Vögel siehe Dr. P. W. Lund de genere *Euphones praesertim de singulari canalis intestinalis structura in hocce avium genere*. Herr Dr. Lund erwähnt nicht des Characters des doppelten Zahnes am Schnabel, und giebt daselbst nur einen einfachen Ausschnitt an. Nach ihm leben diese Vögel von Sämereien.

Seite 439. zu „*Euphone violacea*.“ Hr. Dr. Lund giebt (l. cit.) eine umständliche Beschreibung der Abweichungen im Baue des Speisecanals dieses Vogels, welche sehr interessant ist. Ich habe diesen im südlichen Brasilien sehr gemeinen Vogel nie die Stimme anderer Vögel nachahmen gehört, wie Hr. Dr. Lund dieses von den Eingebornen vernahm. Er beschreibt das Nest in der Kürze, und es scheint sich dieses nicht von dem der meisten übrigen *Tangaras* zu unterscheiden. Nach ihm soll unser Vogel in *Guiana* häufiger vorkommen, als in Brasilien; allein wir haben ihn daselbst sehr häufig gefunden.

Seite 443. zu „*Euphone musica*, Licht.“ Herr Dr. Lund nennt diesen Vogel (p. 27) an den Obertheilen schwarz; allein dieses kann man doch nicht wohl sagen.

Seite 447. zu „*Euphone rufiventris*, Licht.“ Ist schon früher von *Latham Pipra pectoralis* benannt gewesen.

Seite 474. zu „*Tanagra cristata*, Linn., Gmel.“ Soll, nach *Wagler*, von der eigentlichen *cristata* verschieden seyn, und identisch mit *Lichtenstein's T. co-*

ryphaea. — *Tanagra brunea*, Spix (T. 49. Fig. 2.), ist die junge *cristata*.

Seite 518. zu „*Tanagra superciliaris*.“ Hierher soll, nach Wagler, Lichtenstein's *Tanagra decumana* gehören, ferner *Coracias guianensis*, Lath., welches aber wohl ein zu heftiger Mißgriff seyn würde, ferner *Saltator virescens* und *caerulescens*, Vieill., *le Habia à sourcils blancs d'Azara*, Spix Tab. 57. Fig. 1. (kaum kenntlich).

Seite 538. zu „*Tanagra auricapilla*.“ Soll nach Dr. Lund (*De genere Euphones etc.* p. 22), einen von dem der Tangara's abweichenden Schnabelbau, mit scharfer Firste und langen Bartborsten haben, auch sich von Ameisen ernähren. Letzteres ist gewiß unrichtig, und vielleicht hat Hr. Lund einen ganz andern Vogel vor sich gehabt. Ich fand in den Mägen dieser Vögel Insectenreste und Fruchtkerne.

Seite 552. zu „*Fringilla Gnatho*, Licht.“ Hierher gehört *Tanagra psittacina*, Spix Figur 57., eine durchaus schlechte Abbildung.

Seite 558. zu „*Fringilla jugularis*.“ *Tanagra atricollis*, Spix. — *Coccothraustes atricollis*, Vieill., *nouv. diction. d'hist. nat.* XIII. p. 547 im Jahr 1817.

Seite 600. zu „*Fringilla Manimbe*, Licht.“ Hierher gehört *Tanagra aurifrons*, Spix. T. 50. Fig. 2. (Abscheuliches Bild.)

Seite 614. zu „*Fringilla brasiliensis*.“ Hierher gehört Gmelin's *Fringilla flaveola*, von Edward gut abgebildet.

Seite 623. zu „*Fringilla matutina*, Licht.“ Nach Hrn. Prof. Wagler ist dieser Vogel von Buffon für einen capischen gehalten worden, und als *Bruant du cap de bonne espérance* pl. enl. V. t. 386. fig. 2. abgebildet. *Emberiza capensis*, Linn., Lath., Vieill. — *Emb. cap. var.*, Gmel. —

Seite 263. zu „*Strix perlata*, Licht.“ Herr Auguste de St. Hilaire hält diese Eule für *Strix flammia*, Linn. (s. dessen Reisebeschr. Vol. I. p. 282).

Seite 594. zu „*Fringilla dominicana*.“ Hr. Auguste de St. Hilaire fand diesen Vogel bloß in der Nähe des Rio S. Francisco in den Alagodiços, oder dem überschwemmten Lande (s. dessen Reise Vol. II. p. 421).

Seite 665. zu „*Opetiorynchus*, Temm.“ Hr. Auguste de St. Hilaire beschreibt in seiner Reise durch Minas das Nest des Fournier, und zwar (Vol. I. pag. 311) zwei Verschiedenheiten desselben; allein ich habe den Vogel nicht bei dem Neste erhalten, kann also darüber nicht urtheilen.

Seite 819. zu „*Muscicapa comata*, Licht.“ Hr. Auguste de St. Hilaire redet wahrscheinlich von unserm Vogel, Vol. I. seiner Reise in Minas, p. 128 und Vol. II. p. 348.

Seite 1191. zu „*Anabates rufifrons*.“ Hr. Auguste de St. Hilaire beschreibt in seiner Reise nach Minas (Vol. II. p. 70) das Nest unseres Vogels und setzt hinzu, er habe den Erbauer nicht kennen gelernt. Es scheint, daß dieser gelehrte Reisende die Stelle im 2ten Bande meiner Reise nach Brasilien, S. 423, nicht kannte.

Seite 1199. zu „*Icterus Jamacaii*, Daud.“ Dieser Vogel soll, nach Herrn Auguste de St. Hilaire (*Voyage dans l'intérieur du Brésil*, Vol. I. p. 282), nur im Sertong des Rio S. Francisco vorkommen, womit aber meine erhaltenen Nachrichten nicht übereinstimmen. Jener gelehrte Reisende nennt unsern Vogel *Oriolus aurantius*.

Erklärung

des Kupfers zum III. Bande.

- Figur 1.** Luftröhre des *Araponga* (*Casmorynchos nardicollis*). a. Luftröhrenkopf von vorn. b. Derselbe mit der Stimmritze schief von der Seite gesehen. c. Bronchial-Larynx desselben Vogels. e. Abschnitt der Luftröhre, d. Abschnitt der beiden Bronchienäste.
- Figur 2.** Schnabel des *Euscarthmus nidipendulus*; a. von der Seite gesehen, b. von oben.
- Figur 3.** Schnabel des *Euscarthmus orbitatus*; a. von der Seite, b. von oben.
- Figur 4.** Schnabel des *Dryocopus turdinus*; a. von der Seite, b. von oben.
- Figur 5.** Schnabel des *Tinactor fuscus*; a. von der Seite, b. von oben gesehen.
- Figur 6.** Schnabel des *Sphenorynchus ruficaudus*; a. von der Seite, b. von oben gesehen.
- Figur 7.** *Myiagrus lineatus*; a. Schnabel von der Seite, b. von oben.
-





